



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.


Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

Cec
B65
h



1/2 van

2

HORTUS THENENSIS

INDEX

DES

ESPÈCES BOTANIKQUES

CULTIVÉES

DANS LE JARDIN DE M. LÉON VAN DEN BOSSCHE

À TIRLEMONT

(Mai 1895)

BRUXELLES

IMPRIMERIE TYPO- ET LITHOGRAPHIQUE V^o MONNOM

32, RUE DE L'INDUSTRIE, 32

1895

a

HORTUS THENENSIS

INDEX

DES

ESPÈCES BOTANIKQUES

CULTIVÉES

dans le jardin de M. LÉON VAN DEN BOSSCHE

À TIRLEMONT

(MAI 1895)

CEC

B65

H

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ

I. — RANUNCULACEÆ

Trib. 1. — CLEMATIDÆ.

CLEMATIS. LIN. (1753)

1. *Flammula*. D.C.

C. Flammula. Lin. — Europ. austr., Oriens.

C. paniculata. Thunb. — Japon., China.

C. apiifolia. D.C. — Japon., China bor.

C. montana. Buch. (Hamilt.). — Reg. Himal.

C. vitalba. Lin. — Europ., As. occid., Afr. bor.

C. integrifolia. Lin. — Europ. austr., As. bor.

Var. : *Durandi pallida*.

C. orientalis. Lin. — Asia.

C. indivisa. Willd. — Nov. Zeland.

Var. : *Lobata*.

2. *Viticella*. D.C.

C. Viticella. Lin. — Europ. austr., Reg. Cauc., Oriens.

Var. : *Purpurea flore pleno*.

Kermesina.

Rubro violacea.

Venosa.

C. campaniflora. Brot. — Penin. Hispan.

C. patens. Morr. et Dene. — Japon.

Var. : *Rubra grandiflora*.

Odorata.

C. Hakonensis. Franch. et Sauv. — Japon.

(*C. Jackmani*. Hort. — Cf. Dippel. III. 174.)

C. lanuginosa. Lindl. — China bor.

C. florida. Thunb. — Japon.

C. Fortunei. Moore. — China, Japon.

C. Hendersonii. Chandl. — St. hybr.

(*C. viticella* × *C. integrifolia*)

et altræ variet. hort. et hybridæ plurimæ.

3. *Viorna.* K. Koch.

C. fusca. Turcz. — China bor., Siber. orient.

C. crispa. Lin. — Amer. bor. (pars merid.).

C. Viorna. Lin. — Amer. bor. (pars centr.).

Var. : *Coccinea.* (Asa Gray.)

(*C. Texensis.* Buckl.)

C. heracleifolia. D.C. — China, Japon.

Var. : *Davidiana.* (Franch.)

4. *Atragene.* D.C.

C. alpina. Mill. — Europ., Asia bor.

(*Atragene alpina.* Lin.)

Trib. 2. — ANEMONEÆ.

THALICTRUM. LIN. (1753)

T. saxatile. Schlcht. — Europ. centr.

ANEMONE. LIN. (1753)

1. *Pulsatilla.* Tourn.

A. caffa. Eckl et Zey. — Afr. austr.

2. *Anemone.* Tourn.

A. fulgens. J. Gay. — Reg. mediter.

A. japonica. Sieb et Zucc. — Japon.

Var. : *Alba.*

Elegans.

ADONIS. DILL. ex LIN.

A. pyrenaica. — Europa.

Trib. 4. — HELLEBOREÆ.

HELLEBORUS. (TOURN.) LIN. (1753)

H. niger. Lin. — Europa.

H. orientalis. Lamk. — Græcia, Asia min.

Var. : *Punctatus.*

H. odorus. Waldst. et Kit. — Hungaria.

H. antiquorum. A. Brong. — Bithynia.

H. guttatus. A. Brong. — Reg. Caucas.

H. caucasicus. A. Brong. — Reg. Caucas.

Var. : Punctatus.

Pallidus.

H. colchicus. Rgl. — Mingrelia.

Var. : Roseus.

Formosus.

AQUILEGIA. (TOURN.) LIN. (1753)

A. vulgaris. Lin. — Europ., Oriens.

Variet. hort.

A. glandulosa. Fisch. ex Link. — Siber. altaïc.

A. formosa. Fisch. ex D.C. — Siber. orient.

A. canadensis. Lin. — Am. bor.

A. cærulea. James. — Am. bor.-occid.

A. chrysantha. As. Gray. — Nov. Mexic.

DELPHINIUM. TOURN. EX LIN.

D. elatum. Lin. — Europ., Reg. Himal.

Variet. hort. plurimæ.

D. cardinale. Hook. — Am. bor.-occid.

D. nudicaule. Torr et Gray. — Am. bor.-occid.

ACONITUM. TOURN. EX LIN.

A. Lycoctonum. Lin. — Europ., As. bor.

A. Napellus. Lin. — Reg. bor. temp.

CIMICIFUGA. LIN. (1750)

C. fætida. Lin. — Europ. Siber.

(*Actæa cimicifuga*. Lin. éd. I)

C. japonica. Miq. — Japon.

(*Pityrosperma aceroides*. Sieb. et Zucc.)

XANTHORHIZA. MARSH. (1785)

X. apiifolia. L'Herit. — Am. bor.-occid.

(*Zanthorhiza*. L'Herit.)

Trib. 5. — PÆONIEÆ.

PÆONIA LIN. (1753)

1. *Moutan*. D.C.

P. arborea. Donn. — Japon, China.

Variet. hort.

2. *Pæon. D.C.***P. officinalis.** Retz. — Europa.*Variet. hort.***P. paradoxa.** Ander. — Europ. aust.**II. — DILLENACEÆ****Trib. 3. — HIBBERTIÆ.****HIBBERTIA. ANDR. (1800)**§ 4. — *Cyclandra. F. Müll.***H. volubilis.** Andr. — Australia.*(H. scandens. Dryandr.)***H. dentata.** R. Br. in D.C. — Australia (ad mont. cœrul.).**H. Cunninghamii.** Ait. — Australia.*(H. hastata. Stend.)***H. perfoliata.** Hueg. — Australia.**H. Readii.** Hort. — Hab.?**III. — CALYCANTHACEÆ****CALYCANTHUS. LIN. (1753)****C. floridus.** Lin. — Amer. bor. (pars merid.).**C. fertilis.** Walt. — Amer. bor. (pars merid.).*(C. lævigatus. Willd.)***C. occidentalis.** Hook et Arn. — Amer. bor.-occid.**CHIMONANTHUS. LINDL. (1819)****C. fragrans.** Lindl. — Japon.*(Calycanthus præcox. Lin.)***IV. — MAGNOLIACEÆ****Trib. 1. TROCHODENDREÆ.****EUPTELEA. SIEB. ET ZUCC. (1835)****E. polyandra.** Sieb. et Zucc. — Japon.

Trib. 2. WINTEREÆ.

DRIMYS. FORST. (1776)

D. Winteri. Forst. — Amer. austr.

D. aromatica. F. Müll. — Austr. merid.

(*Tasmania*. R. Br.)

ILLICIUM. LIN. (1753)

I. floridanum. Ellis. — Am. bor. (pars mer.).

I. anisatum. Gaertn. — China.

I. religiosum. Sieb. et Zucc. — Japonia.

(*I. Anisatum*. Lin.)

Trib. 3. — MAGNOLIEÆ.

MAGNOLIA. LIN. (1753)

1. *Magnoliastrum*. D.C.

M. tripetala. Lin. — Am. bor. (pars centr.).

M. glauca. Lin. — Am. bor.-orient.

M. macrophylla. Mchx. — Am. bor. (pars cent. et mer.).

M. cordata. Mchx. — Am. bor.-orient. (pars mer.).

M. acuminata. Lin. — Am. bor.-orient.

(*Tulipastrum americanum*. Spach.)

M. grandiflora. Lin. — Am. bor. (pars merid.).

2. *Guillimia*. D.C.

M. pumila. Andr. — China merid.

M. stellata. Maxim. — Japon.

(*Bürgeria*. Sieb. et Zucc. — *Talauma*. Miq.)

Var. : Flore pleno.

M. hybrida. Dippel. —

(*M. Yulan*. Desf. × *M. Obovata*. Thunb).

a) *Soulangeana*.

Var. : *Norbertiana*.

b) *Lennei*.

M. hypoleuca. Sieb. et Zucc. — Japon.

M. Watsoni. Hook. fil. — Japon.

MICHELIA. LIN. (1753)

M. fuscata. Blum. — China merid.

(*Magnolia*. Andr. — *Liriopsis*. Spach.)

LIRIODENDRON. LIN. (1753)

L. Tulipifera. Lin. — Am. bor.-orient.

Trib. 4. — SCHIZANDREÆ.

SCHIZANDRA. RICH IN MCHX. (1803)

S. chinensis. Lavallée. — China, Jap., Reg. Amur.

(*Kadsura*. Turcz. — *Maximowiczia*. Rupr.)

S. propinqua. ? — Reg. Himal.

(*Kadsura*. Wall.)

KADSURA. JUSS. (1810).

K. japonica. Dun. — Japon.

(*Uvaria*. Lin.)

V. — ANONACEÆ

Trib. 2. — UNONEÆ.

ARTABOTRYS. R. BR. (1820)

A. odoratissimus. R. Br. — Ind. orient., Malaya

ASIMINA. ADANS (1763)

A. triloba. Dunal. — Am. bor.-orient.

(*Anona*. Lin. — *Orchidacarpus arietinum*. Mchx. — *Porcelia triloba*. Pers.)

Trib. 4. — XYLOPIEÆ.

ANONA. LIN. (1753)

A. squamosa. Lin. — Ind. occid.

A. Cherimolia. Mill. — Amer. trop.

VI. — MENISPERMACEÆ

Trib. 2. — COCCULEÆ.

COCCULUS. D.C. (1818)

C. japonicus. D.C. — Japon.

(*Menispermum japonicum*. Thunb.)

- C. carolinus.** D.C. — Amer. bor. (pars merid.).
 (*Menispermum carolinum*. Lin. — *Cebatha*. Forsk. — *Baumgartia scandens*. Mönch. — *Androphylax*. Wendl. — *Wendlandia populifolia*. Willd).
C. Thunbergii. D.C. — Japon.
 (*Menispermum orbiculatum*. Thunb.)
C. laurifolius. D.C. — Reg. Himal.
 (*Menispermum laurifolium*. Roxb.)

MENISPERMUM. (TOURN.) LIN. (1753)

- M. canadense.** Lin. — Amer. bor.-orient.
M. dahuricum. D.C. — Siber. orient., Chin. bor.
 (*M. canadense*. Pall)

VII. — BERBERIDEÆ

Trib. 1. — LARDIZABALEÆ.

LARDIZABALA. R. ET PAV. (1794)

- L. biternata.** R. et Pav. — Chili.

STAUNTONIA. D.C. (1818)

- S. hexaphylla.** Dcne. — China, Japon.

HOLLBCELLIA. WALL. (1824)

- H. latifolia.** Wall. — Reg. Himal
 (*Stauntonia*. Wall.)

AKEBIA. DCNE. (1839)

- A. quinata.** Dcne. — China et Japon.
 (*Rajania*. Thunb.)

Trib. 2. — BERBEREÆ.

BERBERIDOPSIS. HOOK. FIL.

- B. corallina.** Hook. fil. — Chili.

BERBERIS. LIN. (1753)

1. *Mahonia*. Endl.
B. aquifolium. Pursh. — Amer. bor.-occ.
 (*Mahonia diversifolia*. Sweet.)

- B. repens.** Lindl. — Amer. bor.-occid.
Var. : *Rotundifolia* Herveyi.
- B. pinnata.** Lagasc. — Calif., Mexic. sept.
(B. fascicularis. Sims.)
- B. Fremonti.** Torr. — Calif., Texas.
- B. Tenuifolia.** Lindl. — Mexico.
- B. Fortunei.** Lindl. — China bor.
- B. nervosa.** Pursh. — Amer. bor.-occid.
(Mahonia glumacea. D.C.)
- B. japonica.** Spreng. — Asia orient.
(Mahonia. D.C. — *Ilex.* Thunb.)
- B. nepalensis.** Spreng. — Reg. Himal.
(B. Miccia. Hamilt. — *B. Pinnata.* Roxb. — *Mahonia.* D.C.)
- B. trifurca.** Fort. — China bor.
2. Berberis. Endl.
- B. vulgaris.** Lin. — Europ., Asia temp.
Var. : *Atropurpurea.*
- B. sinensis.** Desf. — Eur. aust., Oriens, Asia or., Amer.
Subsp. : *Spathulata.* (Schrad.)
Cretica. (Lin.)
- B. caroliniana.** Loud. — Amer. bor. (pars cent.).
(B. Vulgaris. Walt. — *B. Canadensis.* Pursh. — *B. provincialis.* Audib.)
- B. heteropoda.** Schrenk. — Turkest., Dsungar.
(B. sphaerocarpa. Karol et Kiril.)
- B. Thunbergii.** D.C. — Japon.
(B. eretica. Thunb.)
- B. Darwini.** Hook. — Amer. austr.
- B. stenophylla.** Moore. — St. hyb.
(B. Darwini \times *B. empetrifolia.*)
- B. aristata.** D.C. — Reg. Himal.
(B. Angustifolia. Roxb.)
- B. Jamesonii.** Ch. Lem. — Ecuad.
- B. ilicifolia.** Forst. — Reg. Magellan.
(B. lagenaria. Poir.)
- B. Wallichiana.** D.C. — Reg. Himal.
(B. atrovirens. Wall.)
- B. Hookerii.** Ch. Lem. — Chili.
- B. congestiflora.** C. Gay. — Chili.
- B. microphylla.** Forst. — Reg. Magell.
Subsp. : *Nana.*
- B. buxifolia.** Poir. — Amer. aust.
B. dulcis. Sweet.
- B. empetrifolia.** Lamk. — Amer. aust.

NANDINA. THUNB. (1784)

N. domestica. Thunb. — Japon.

VANCOUVERIA. DCNE.

V. hexandra. Dene. — Amer. bor.-occid.

EPIMEDIUM. (TOURN.) LIN. (1753)

E. alpinum. Lin. — Europa.

JEFFERSONIA. BART. (1793)

S. binata. Bart. — Am. bor.

(*J. Bartonis.* Mchx. — *Podophyllum diphyllum.* Lin.)

PODOPHYLLUM. LIN. (1753)

P. Emodi. Wall. — Reg. Himal.

VIII. — SARRACENIACEÆ

SARRACENIA. LIN. (1753)

S. purpurea. Lin. — Am. bor.

IX. — PAPAVERACEÆ

§ 2. — *Eupapavereæ.*

MECONOPSIS. VIG. EX D.C.

M. Wallichii. Hook. — Reg. Himal.

EOMECON. HANCE. (1884)

E. chionantha. Hance. — China.

BOCCONIA. PLUM. EX LIN.

B. cordata. Willd. — China ; Japon.

X. — FUMARIACEÆ

DICENTRA. BERNH. (1833)

D. formosa. Walp. — Amer. bor.-orient.
(*Dielytra eximia.* Hook.)

CORYDALIS. VENT. (1803)

C. lutea. D.C. — Europa.

XI. — CRUCIFERÆ

Trib. 1. — ARABIDEÆ.

CHEIRANTHUS. LIN. (1753.)

C. Cheiri. Lin. — Europa.

Variet. hortens.

C. mutabilis. L'Herit. — Ins. Madeir. et Canar.

ARABIS. LIN. (1753)

3. *Arabidium.* Spach.

A. alpina. Lin. — Eur. alp.; Amer. bor.

CARDAMINE. (TOURN.) LIN.

C. Trifoliolata. Hook fil. et Thoms. — Reg. Himal.

Trib. 2. — ALYSSINEÆ.

AUBRIETIA. ADANS. (1763)

A. deltoidea. D.C. — Ital.; Græcia; Asia min.

Var. : Leichtlini.

DRABA. DILL. ex LIN.

D. Aizoon. Wahlenb. — Europa (Mont. Carpat.)

Trib. 3. SISYMBRYEÆ.

ERYSIMUM (TOURN.) LIN.

E. rupestre. D.C. — Asia minor.

Trib. 6. — **LEPIDINEÆ.**

IONOPSIDIUM. RCHB. (1829)

I. acaule. Rehb. — Europ. austr., Afric. bor.
(*Cochlearia*. Desf.)

LEPIDIUM. LIN. (1753)

7. *Lepidiastrum*. D.C.**L. latifolium.** Lin. — Europ.; As. bor.; Oriens.Trib. 7. — **THLASPIDEÆ.**

IBERIS. DILL. EX LIN.

I. gibraltarica. Lin. — Hispan.; Moroc.
(*I. dentata*. Mönch)**XII. — CAPPARIDEÆ.**Trib. 1. — **CLEOMEÆ.**

ISOMERIS. NUTT. (1838)

I. arborea. Nutt. — Am. bor.-occid.Trib. 2. — **CAPPAREÆ.**

CAPPARIS. (TOURN.) LIN.

C. spinosa. Lin. — Europ. austr.; Oriens.
(*C. rupestris*. Sibth. et Sm.)**XIII. — RESEDACEÆ.**

RESEDA. LIN (1753)

R. odoranta. Lin. — Reg. mediterr.Var. : *Grandiflora* superba.

Nana compacta.

XIV. — CISTINEÆ.

CISTUS. (TOURN.) LIN. (PARTIM.)

1. *Erythrocistus*. Dun.

C. villosus. L. Mant. — Reg. mediter.

(*C. incanus*, *C. crispus*, *C. albidus*. Lin.)

C. parviflorus. Lamk. — Reg. mediter.-orient.

(*C. Cymosus*. Dun.)

2. *Ledonia*.

C. salviæfolius. Lin. — Reg. mediter.

(*Ledonia peduncularis*. Spach.)

C. monspeliensis. Lin. — Reg. mediter.-occid.

(*Stephanocarpus*. Spach.)

C. ladaniferus. Lin. — Reg. mediter.-occid.

HELIANTHEMUM. (TOURN.) MILL. (1759)

1. *Euhelianthemum*. Dun.

H. Chamæcistus. Mill. (extens.) — Eur. austr.; Afr. bor.

(*Cistus Helianthemum*. Lin.)

H. leptophyllum. Dun. — Hispania.

(*Cistus angustifolius*. Lagasc.)

2. *Halimium*. Dun.

H. alyssoides. Vent. — Hispania.

(*Cistus formosus*. Curt.)

3. *Fumana*. Dun.

H. thymifolium. Pers. — Eur. austr.-occid.

(*Cistus thymifolius*. Lin.)

H. Libanotis. Willd. — Lusit; Afric. bor.

(*H. rosmarinifolium*. Lagasc.)

XV. — VIOLARIEÆ.

Trib. 1. — VIOLEÆ.

VIOLA. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Nominium*. Ging.

V. odorata. Lin. — Europ.; As. bor.

4. *Melanium*. D.C.

V. tricolor. Lin. — Europ.; Asia et Am. bor.

Variet. hortens. plurim.

Trib. 3. — **ALSODEREÆ.**

HYMENANTHERA. R. BR. (1816)

H. crassifolia. Hook. fl. — Nov. Zeland.**XVI. — BIXINEÆ**Trib. 1. — **BIXEÆ.**

BIXA. LIN. (1753)

B. Orellana. Lin. — Am. austr.Trib. 2. — **FLACOURTIEÆ.**

AZARA. R. ET PAV. (1794)

A. dentata. R. et Pav. — Chili.**A. serrata.** R. et Pav. — Chili.**A. Gilliesii.** Hook. et Arn. — Chili.*(Quillaja petiolaris. Don.)***A. lanceolata.** Hook. fl. — Chili.**A. microphylla.** Hook. fl. Chili.

IDESIA. MAXIM. (1866)

I. polycarpa. Maxim. — Japon merid.

ABERIA. HOCHST. (1844)

A. caffra. Hook. fl. et Harv. — Cafreria.*(Dovyalis zizyphioides. E. Mey?)***XVII. — PITTOSPOREÆ**

PITTOSPORUM. BANKS. (1788)

P. ferrugineum. Dryand. — Malaya ; Nov. Guin**P. coriaceum.** Dryand. — Ins. Madeira.**P. Tobira.** Dryand. — China et Japon*(Econymus Tobira. Thunb.)*

Var. : foliis variegatis.

- P. undulatum.** Vent. — Australia.
P. crassifolium. Soland. — Nov. Zeland.
P. tenuifolium. Gærtn. — Nov. Zeland.
 (*Trichilia monophylla*. A. Rich.)
P. eugenioïdes. A. Cunn. — Nov. Zeland.
P. Mayi. Hort. ex Reg. — Hab.?

HYMENOSPORUM. R. BR. ex F. MUELL. (1860)

- H. flavum.** F. Muell. — Australia orient.
 (*Pittosporum*. Hook.)

BURSARIA. CAV. (1797)

- B. spinosa.** Cav. — Tasmania.
 (*Itea*. Anders.)

BILLARDIERA. SM. (1793)

- B. scandens.** Sm. — Austral. orient.
B. longiflora. Labill. — Tasmania.
B. mutabilis. Salisb. — Austral.

SOLLYA. LINDL.

- S. heterophylla.** Lindl. — Austr.
 (*Billardiera fusiformis*. Labill.)
 Var : Drummondi.
 salicifolia.

XVIII. — TREMANDREÆ

TETRATHECA. SM.

- T. ericæfolia.** Sm. — Austral. extratrop.

PLATHYTECA. STEETZ. IN LEHM. (1845)

- P. galioides.** Steetz. — Austral. austro-occid.
 (*P. verticillata*. Baill.)

TREMANDRA. R. BR.

- T. hirsuta.** — Australia austro-occid.

XIX. — POLYGALEÆ

POLYGALA. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Psychantus*. Raf.

P. oppositifolia. Lin. — Afr. austr.

Var. : *Cordata*.

(*P. attenuata*. Lodd.)

P. myrtifolia. Lin. — Afr. austr.

Var. : *Amœna*.

(*P. grandiflora*. Lodd.)

P. brachypoda. Todd. — Hab. ?

P. virgata. Thunb. — Afr. austr.

(*P. speciosa*. Sims.)

P. Dalmaisia. — (Stirps. hybr.)

(*P. myrtifolia*. Lin. \times *P. oppositifolia*. Lin.)

7. *Chamæbuxus*. Dill.

P. Chamæbuxus. Lin. — Europ. centr.

(*Chamæbuxus alpestris*. Spach.)

MURALTIA. NECK. (1790)

M. pauciflora. D.C. — Afric. austr.

(*Polygala*. Thunb.)

MONNINA. R. ET PAV. (1793)

M. obtusifolia. H. B. et K. — Nov. Granat.

XX. — CARYOPHYLLÆ

Trib. 1. — SILENEÆ.

DIANTHUS. LIN. (1753)

1. *Armeriastrum*. Ser.

D. barbatus. Lin. — Europa.

D. carthusianorum. Lin. — Europa; As. minor.

D. atrorubens. All. — Eur. austr.

2. *Caryophyllum*. Ser.

D. Caryophyllum. Lin. — Europ.; Asia occid.

D. deltoides. Lin. — Europ.; Thib. occid.

D. glacialis. Hænk. — Europa alpest.

D. cruentus. Grieseb. — Græcia.

GYPSOPHILA. LIN. (1753)

1. *Struthium.* Ser.

G. paniculata. Lin. — Europ.; Asia bor.

SAPONARIA. LIN. (1753)

2. *Bootia.* Neck.

S. ocymoides. Lin. — Europa.

SILENE. LIN. (1753)

6. *Rupifraga.* Otth. in D.C.

S. alpestris. Jacq. — Austria.

LYCHNIS. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Viscaria.* D.C.

L. viscaria. Lin. — Europa.

Var. : Flore albo pleno.

Flore roseo pleno.

2. *Eulychnis.* D.C.

L. flos Jovis. Lin. — Europa centr

L. grandiflora. Jacq. — China; Japon.

L. Bungeana. Fissch, — Sibir.; Mongol.

3. *Agrostema.* D.C.

L. lapponica. Lin. — Europ. bor.; Sibir.

Trib. 2. — **ALSINEÆ.**

CERASTIUM. (DILL.) LIN. (1753)

2. *Orthodon.* Ser.

C. tomentosum. Lin. — Europa; As. minor.

ARENARIA. RUPR. ex LIN. (1753)

2. *Mæhringia.* Lin.

A. muscosa. Medik. — Europa.

4. *Alsine.* Wahlb.

A. verna. Lin. — Europ.; Am. bor.

Var. : Cæspitosa.

6. *Cherleria.* Hall.

A. Cherleria. Hook. fil. — Europa.

(*Cherleria sedoides.* Lin.)

SPERGULA. LIN. (1753)

S. pilifera. D.C. — Ins. Corsica.

XXI. — PORTULACEÆ

PORTULACA. LIN. (1753)

P. grandiflora. Cambess. — Brazil.

(*P. megalantha*. Steud.)

PORTULACARIA. JACQ. (1786)

P. afra. Jacq. — Afr. austr.

(*Crassula portulacastrum*. Lin. — *Claytonia portulaca*. Lin.
Mant. — *Portulaca fruticosa*. Thumb.)

ANACAMPSEROS. LIN. (1753)

A. filamentosa. Sims. — Afr. austr.

(*Portulaca*. Haw. — *Rulingea*. Haw. — *Talinum*. Ait.)

TALINUM. ADANS. (1763)

T. crassifolium. Willd. — Ind. occid.

(*Portulaca*. Jacq.)

Var. : *Fruticosa*.

XXII. — TAMARISCINEÆ

§ 1. — *Tamarisceæ*.

TAMARIX. LIN. (1753)

1. *Vernales*. Bnge.

T. tetrandra. Pall. — Europ. austr.-orient. ; Oriens.

2. *Æstivales*. Bnge.

T. gallica. Lin. — Eur. austr. ; Afr. bor. ; Oriens.

(*Tamariscus pentandra*. Lamk.)

T. sinensis. Lour. — China ; Japon.

T. hispida. Willd. — Dsungaria.

T. caspica. Hort. — (An spec. ?)

MYRICARIA. DESV. (1815)

- M. germanica.** Desv. — Europ. centr. et austr.; Oriens.
(Tamarix, Lin. — Tamariscus decandrus, Lamk. — Tamariscus germanicus, Scop.)
-

XXIII. — HYPERICINEÆ

Trib. 1. — HYPERICEÆ.

HYPERICUM. TOURN. EX LIN. (1753)

1. *Euhypericum*. Boiss.
 - H. floribundum.** Ait. — Ins. Canar. et Madeira.
(Webbia, Spach.)
 2. *Androsæmum*. All.
 - H. elatum.** Ait. — Europ. austr.; Ins. Canar. et Mad.
(Androsæmum pyramidale, Spach. — Andros. foliosum, Ait.)
 3. *Myriandra*. Spach.
 - H. fasciculatum.** Desrouss. in Lamk. — Am. bor. (pars merid.)
(H. aspalathoides, Willd. — Myriandra brathydis, Spach.)
 5. *Eremauthe*. Spach.
 - H. calycinum.** L. Mant. — Græcia; Bythin.; Reg. Caucas.
(Eremauthe, Spach. — Norysca, Blume.)
 - H. patulum.** Thunb. — India, China.
(H. Gumbletoni, Lavall. — Norysca patula, Blme.)
 - H. uralum.** Hamilt. in Don. — Reg. Himal.
(Norysca urala, Ders.)
 - H. Ascyron.** Lin. — Sibiria.; Japon.; Am. boreal.
(Ascyron tetragonum, Mœnch. ?)
-

XXIV. — GUTTIFERÆ

Trib. 1. — CLUSIÆ.

CLUSIA. LIN. (1753)

1. *Euclusia*. Pl. et Ir.
- C. elliptica.** H.B. et K. — Peruv. andin.

Trib. 3. — GARCINIEÆ.

RHEEDIA. LIN (1753).

R. lateriflora. Lin. — India orient.

XXV. — TERNSTRÆMIACEÆ

Trib. 3. — TERNSTRÆMIEÆ.

VISNEA. LIN. FIL.

V. Mocanera. Lin. fil. — Ins. Canar. et Madeira.

CLEYERA. D.C. (1822)

C. ochracea. D.C. — Reg Himal.; China; Japon.*(C. japonica. Sieb et Zucc.)***C. Fortunei.** Hook. fil. — Japon.; China.*Var. : foliis variegatis.**(Cf. Dippel, III, p. 21 et 22, sub Eurya japonica. Thunb. et Gard. Chron., XVII, p. 10.)*

EURYA. THUNB. (1784)

E. acuminata. D.C. — Reg. Himal.; Malaya.*(E. angustifolia. Wall.)*

Trib. 4. — SAURAUJEÆ.

ACTINIDIA. LINDL. (1835)

A. Kolomikta. Maxim. — Sibir. orient. ; China bor. ; Japon.*(Trochostigma: Rupr. — Kolomikta mandshurica. Regl.)***A. arguta.** Planch. — Japon.*(Trochostigma. Sieb. et Zucc.)*

STACHYURUS. SIEB. ET ZUCC. (1826)

S. præcox. Sieb. et Zucc. — Japon.

Trib. 5. — GORDONIEÆ.

STUARTIA. CATESB. EX LIN.

2. *Malacodendron. Cav.***S. pentagyna.** L'Herit. — Am. bor. (pars centr.)*(Malacodendron ovatum. Cav.)*

GORDONIA. ELLIS. (1790)

1. *Eugordonia B et H.***G. grandis.** Ed. André. — Hab. ?

CAMELLIA. LIN. (1753)

C. japonica. Lin. — Japon.*Variet. hortens.***C. Sassanqua.** Thunb. — China; Japon.**C. Thea.** Link. — China; Assam.*(Thea sinensis Lin.)**Var. : Bohea.**Var. : viridis.*

XXVI. — MALVACEÆ

Trib. 1. — MALVEÆ.

ALTHÆA. (TOURN.) LIN. (1753)

A. rosea. Cav. — Oriens.*(Alcea. Lin.)*

LAVATERA. LIN. (1753)

L. arborea. Lin. — Europ. austr.; Afr. bor.*Var. : fol. variegatis.*

SIDALCEA. AS. GRAY.

S. candida. As. Gray. — Amer. bor.

MALVASTRUM. AS. GRAY. (1849)

M. tricuspidatum. As. Gray. — Cosmop. trop.*(Malva. Ait. — Malva carpinifolia. Desrous. in Lamk. — Sida jamaicensis. Mill.)*

SIDA. CAV. (1786)

S. rombifolia. Lin. — Ind. occid.; Afr. austr.*(S. capensis. E. Mey.)***S. retusa.** Lin. — Arch. Molucc.

ABUTILON. TOURN. ex ADANS (1763)

A. graveolens. Wight et Arn. — Geront. trop.*(Sida. Roxb.)*

- A. vitifolium.** Presl. — Chili.
(*Sida*. Cav.)
- A. indicum.** G. Don. — Africa.
(*Sida indica*. Lin. — *Sida populifolia*. Lamk. — *Anoda holosericea*. E. Mey.)
- A. Bedfordianum.** A. St.-Hil. — Brazil.
- A. striatum.** Dicks. — Brazil.
(*Sida picta*. Gill.)
- A. venosum.** Lem. — Mexico.
- A. insigne.** Planch. — Nov. Granat.
- A. Darwinii.** Hook. fl. — Brazil.
Var. : tessellatum.
- A. megapotamicum.** A. St.-Hil. et Maud. — Amer. trop.
Var. : variegatum.
- A. Sellowianum.** Rgl. — Brazil.
Var. : marmoratum
et altræ hybridæ plurimæ.

SPHÆRALCEA, A ST.-HIL. (1842)

- S. vitifolia.** Spach. — Mexico
(*Malva umbellata*. Cav.)

Trib. 2. — URENEÆ.

PAVONIA, CAV. (1786)

- P. hastata.** Cav. — Brazil.
(*Greevesia cleisocalyx*. F. Müll.)

GOETHEA, NEES. (1821)

- G. Makoyana.** Hook. — Brazil.
(*Pavonia*. E. Morr.)

MALVAVISCUS, DILL. ex ADANS (1763)

- M. arboreus.** Cav. — Am. tropic.
(*Achania Malvaviscus*. Sw.)
- M. concinnus.** H. B. et K. — Peruv.

Trib. 3. — HIBISCEÆ.

HIBISCUS, LIN. (1753)

1. *Cremontia*. Comm. in D.C.
- H. pedunculatus.** Lin. fl. — Africa austr
- H. californicus.** Kell. — California.

4. *Ketmia*. D.C.**H. calycinus**. Willd. — Africa austr.*(H. calyphyllus*. Cav.)**H. ricinifolius**. E. Mey. — Africa austr.**H. Rosa-sinensis**. Lin. — Geront. trop.Var.: *carmineus*.*subviolaceus*.**H. Collierii**. Hort. — Polynesia.**H. Syriacus**. Lin. — Oriens.Varict. *hortens. plurimæ*.6. *Abelmoschus*. Medik.**H. moscheutos**. Lin.-Amer. bor.Var.: *roseus*.10. *Lagunæa*. Car.**H. Solandra**. L'Herit. — Asia et Afric. trop.*(Lagunæa lobata*. Meed.)**H. intermedius**. A. Rich. — Ind. orient.; Afric. trop.

LAGUNARIA. G. DON. (1831)

L. Patersonii. G. Don. — Ins. Norfolk.*(Lagunæa squamea*. Vent. — *Hibiscus Patersonii*. R. Br.)

Trib. 4. — BOMBACEÆ.

PACHIRA. AUBL. (1775)

P. macrocarpa. Walp. — Mexico.*(Carolinea*. Cham. et Schlecht.)

XXVII. — STERCULIACEÆ

Trib. 1. — STERCULIÆÆ.

STERCULIA. LIN. (1753)

1. *Sterculia*. Cav.**S. platanifolia**. Lin. — China.*(Firmiana sinensis*. Medik. — *Culhamia hadensis*. S. F. Gmel.)2. *Carpophyllum*. Miq.**S.***(Carpophyllum cafferum ?)*4. *Brachychiton*. Schott.**S. acerifolia**. A. Cunn. — Australia.*(Brachychiton*. F. MuH.)

S. diversifolia. Seem. — Australia.

(*Brachychiton populneum*. R. Br.)

S. Bidwilli. Hook. — Austr. orient.

(*Brachychiton*. Hook.)

Trib. 2. — **HELICTEREÆ.**

PTEROSPERMUM. SCHREB.

P. acerifolium. Willd. — Ind. orient.

(*Pentapetes*. Lin. — *Velaga xylocarpa*. Gærtn.)

Trib. 5. — **DOMBEYEÆ.**

MELHANIA. FORSK. (1775)

M. Erythroylon. R. Br. — Ins. St. Helen.

(*Pentapetes*. Ait.)

Trib. 6. — **HERMANNIEÆ.**

HERMANNIA. LIN. (1753)

H. Presliana. Turcz. — Africa austr.

(*Hermania patula*. Harvey. — *Mahernia odorata*. Eckl et Zey.)

MAHERNIA. L. MANT. (1767)

M. glabrata. Cav. — Afric. aust.

(*Hermannia*. Lin. fil.)

Trib. 8. — **LASIOPEALEÆ.**

THOMASIA. S. GAY.

T. solanacea. J. Gay. — Australia occident.

(*Lasiopetalum*. Sims.)

T. quercifolia. J. Gay. — Australia occident.

(*Lasiopetalum*. Andr.)

XXVIII. — TILIACEÆ

Trib. 2. — **GREWIEÆ.**

GREWIA. LIN. (1753)

G. occidentalis. Lin. — Africa austr.

G. orientalis. Lin. — Asia et Austr. tropic.

Trib. 3. — **TILIEÆ.****ENTELEA.** R. BR. (1824)

- E. arborescens.** R. Br. — Nova Zeland.
(*E. australis*. Wölp.)

SPARMANNIA. THUNB. (1786)

- S. africana.** Lin. fl. — Afric. austr.

TILIA. LIN. (1753).

- T. platyphyllos.** Scop. — Europ. med.-orient.
(*T. europæa*. Mill. — *T. grandiflora*. Ehrb.)
Subsp. : vitifolia.
 asplenifolia.
- T. vulgaris.** Hayn. — Europ. bor. et temp.
(*T. europæa*. Sm. — *T. intermedia*. D C.)
- T. rubra.** Steven. — Reg. Caucas. ; Persic.
Var. : euchlora.
(*T. dasystyla*. Loud.)
- T. cordata.** Mill. — Europa ; Asia bor.
(*T. parvifolia*. Ehrb. — *T. microphylla*. Vent.)
- T. americana.** Lin. — Am. bor.-orient.
(*T. glabra*. Vent. — *T. canadensis*. Mehx.)
Var. : laxiflora.
(*T. Mississipiensis*. Bosc.)
- T. heterophylla.** Vent. — Amer. bor. (pars cent. et mer.)
- T. tomentosa.** Mönch. — Eur. austro-orient.
(*T. argentea*. Desf.)
- T. alba.** Mehx. — Amer. bor. (pars cent.)
- T. mandshurica.** Max. — Mandsh. ; Reg. Amur.

Trib. 7. — **ELÆOCARPEÆ.****ARISTOTELIA.** L'HERIT. (1786)

- A. Macqui.** L'Herit. — Peruv. et Chili andin.
(*A. glandulosa*. R. et Pav. — *Beaumariv Macqui*. Deless.)
Var. : variegata.

ELÆOCARPUS. BURM. EX LIN. (1753)

- E. cyaneus.** Sims. — Austral.
(*E. reticulatus*. Sm. — *Eriostemum dentatum*. Colla. — *Mono-cera cyanea* Hassk. — *Perinka reticulata*. Raf.)

XXIX. — LINEÆ

Trib. 1. — EULINEÆ.

REINWARDTIA. DMRT

R. trigyna. — Ind. orient.

(*Linum*. Roxb.)

R. tetragyna. Dmrt. — Ind. orient.

(*Linum*. Colebr. ex Wall.)

Trib. 3. — ERYTHROXYLEÆ.

ERYTHROXYLON. P. BR. (1756)

E. Coca. Lamk. — Peruvia.

XXX. — MALPIGHIACEÆ

Trib. 2. — BANISTERIEÆ.

STIGMAPHYLLON. A. JUSS.

S. ciliatum. A. Juss. — Brazil.

(*Banisteria*. Lamk.)

XXXI. — ZYGOPHYLLEÆ

PORLIERIA. R. ET PAV. (1794)

P. hygrometra. R. et Pav. — Peruv.; Chili.

XXXII. — GERANIACEÆ

Trib. 1. — GERANIEÆ.

GERANIUM. (TOURN.) LIN. (1753)

G. rivulare. Vill. — Europa.

(*G. aconitifolium*. L'Herit.)

G. armenium. Boiss. — Armenia.

ERODIUM. L'HERIT. (1787)

E. Manescavi. Coss. — Mont. Pyren.

Trib. 2. — PELARGONIEÆ.

PELARGONIUM. L'HERIT. (1787)

3. *Polyactum*. Eckl et Zey.
P. quinquevulnerum. Willd. — Afric. aus.
 5. *Ligularia*. Eckl et Zey.
P. athamanthoides. L'Herit. — Afric. aus.
 7. *Myrrhidium*. Eckl et Zey.
P. canariense. Willd. — Ins. Canar.
 9. *Campylia*. Sweet.
P. coronopifolium. Jacq. — Afr. austr.
 10. *Dibrachya*. Eckl et Zey.
P. peltatum. Ait. — Afr. aust.
Variet. hort.
P. lateripes. L'Herit. — Afr. aust.
Variet. hort.
 11. *Eumorpha*. Eckl et Zey.
P. malvæfolium. Jacq. — Afr. austr.
 13. *Ciconium*. Sweet.
P. zonale. Willd. — Afr. austr.
Variet. hortens. plurimæ.
P. inquinans. Soland. — Afric. aust.
Variet. hortens. plurimæ.
 14. *Cortusina*. Eckl et Zey.
P. echinatum. Curt. — Afric. austr.
P. odoratissimum. Ait. — Afric. austr.
 15. *Pelargium*. Harv.
P. ribifolium. Jacq. — Afric. aust.
P. tomentosum. Jacq. — Afric. austr.
P. quercifolium. Ait. — Afric. austr.
Var. : minus.
P. glutinosum. Ait. — Afric. austr.
(Geranium viscosum, Cav.)
P. Radula. Ait. Afric. austr.
(P. revolutum, Jacq.)
P. denticulatum. Jacq. — Afric. aust.

TROPÆOLUM. LIN. (1753)

T. speciosum. Endl. — Ins. Chiloë.

T. azureum. Bot. Mag. — Chili.

T. tricolor. Sweet. — Peruvia.

Trib. 6. — OXALIDEÆ.

OXALIS. LIN. (1753)

O. hirta. Lin. — Afric. austr.

Var.: *carnea maculata.*
alba grandiflora.

O. corniculata. Lin. — Amphig. temp. et trop.

Var.: *atropurpurea.*

O. tetraphylla. Cav. — Mexico.

O. bifurca. Lodd. — Afric. aust.

Trib. 7. — BALSAMINEÆ.

IMPATIENS. RIV. EX LIN.

I. Sultani. Hook. fil. — Afric. trop.

XXXIII. — RUTACEÆ

Trib. 2. — RUTEÆ.

RUTA. (TOURN.) LIN. (1753)

R. graveolens. Lin. — Europ. austr.

Var.: *foliis variegat.*

DICTAMNUS. LIN. (1753)

D. albus. Lin. — Eur. austr. ; Asia.

(*Fraxinella*, Tourn. — *Dictamnus Fraxinella*, Pers.)

Var.: *Flore pleno.*

Trib. 3 — DIOSMEÆ.

CALODENDRON. THUNB (1782)

C. capense. Thunb. — Afric. austr.

(*Pallasia capensis*, Houtt. — *Dictamnus*, Lin. fil.)

DIOSMA. LIN. (1753)

D. ericoïdes. Lin. — Afric. aust.

(*D. recurva*, Cham. et Schl. — *D. thyrsophora*, Eckl et Zey.)

D. aspalathoides. Lamk. — Afric. aust.

(*D. ambigua*, *D. acmæophylla*, Eckl et Zey.)

COLEONEMA. BARTL. ET WENDL. (1824)

C. album. Bartl. et Wendl. — Afric. austr.

(*Diosma* Thunb. — *Adenandra*. Rœm. et Schult.)

C. pulchrum. Hook. — Africa austr.

(*C. Dregeanum*, Presl. — *C. filiforme*, A Juss. — *C. gracile*, Eckl et Zey. — *Diosma calycina*, Steud. — *Diosma tenuifolia*, Presl.)

ADENANDRA. WILLD. (1809)

A. umbellata. Willd. — Afric. austr.

Var. : *speciosa*

(*A. Wendlandiana*, Eckl et Zey. — *A. rugosa*, Otto. — *A. speciosa*, Link. — *A. rugosa*, Don. — *Glandulifolia umbellata*, Wendl. — *Diosma speciosa*, Bot. Mag.)

A. uniflora. Willd. — Afric. austr.

(*Diosma*, Lin. — *D. cistoides*, Lamk. — *D. acuminata*, Lodd. — *Eriostemon capense*, Pers. — *Glandulifolia*, Wendl.)

A. fragrans. Rœm. et Schult. — Afric. austr.

(*Diosma*, Bot. Mag.)

BAROSMA. WILLD. (1809)

B. pulchella. Bartl. et Wendl. — Afric. austr.

(*Diosma*, Lin. — *Hartogia*, Berg. — *Bucco*, Rœm. et Sch.)

B. lanceolata. Sond. — Afric. austr.

(*Diosma*, Thunb.)

AGATHOSMA. WILLD. (1809)

A. imbricata. Willd. — Afric. austr.

Var. : *reflexa*.

(*Hartogia imbricata*, Lin. — *H. ciliata*, Bey. — *Diosma reflexa*, Soland. — *D. imbricata*, Thunb. — *Bucco*, Wendl.

Var. : *acuminata*.

(*A. acuminata*, Willd. — *Bucco amminata*, Wendl. — *Diosma cordata*, Mart.)

A. ciliata. Link. — Afric. austr.

(*Diosma*, Lin. — *D. myrsinites*, Lamk.)

A. Ventenatiana. Bartl. et Wendl. — Afric. austr.

(*Bucco*, Rœm et Schult. — *Diosma hirta*, Vent. — *Diosma purpurea*, Desf.)

Trib. 4. — BORONIEÆ.

ZIERIA. SM. (1798)

Z. Smithii. Andr. — Austr. orient.

(*Z. lanceolata*, R. Br.)

BORONIA. SM. (1798)

- B. pinnata.** Sm. — Austr. orient.
(B. citriodora. Gunn. — B. Gunnii Hook.)
- B. tetrandra.** Labill. — Austral.
- B. serrulata.** Sm. — Austral. orient.
- B. polygalæfolia.** Sm. — Austral. orient.
(B. hyssopifolia. Sieber. — B. nana. Hook.)
- B. anemonæfolia.** A. Cunn. — Austral.
(B. variabilis. Hook. — B. detigera. F. Muell. — Cyanothamnus tridactylites. Baill.)
- B. viminea.** Lindl. — Austral.
- B. crassipes.** Bartl. — Austral.
- B. elatior.** Bartl. — Austral. occid.
- B. megastigma.** Nees. — Austral. austro-occid.
(B. tristis. Turcz.)
- B. heterophylla.** F. Muell. — Austr.
- B. pulchella.** Turcz. — Austr.
(B. Drummondi. Planch.)

ERIOSTEMON. SM. (1798)

- E. buxifolium.** Sm. — Austral. orient.
- E. myoporoides.** D.C. — Austral. orient.
(E. cuspidatum. All. Cunn. — E. neriiifolium. Sieber.)
- E. scaber.** Paxt. — Hab. ?

PHEBALIUM. VENT. (1804)

- P. ovalifolium.** F. Muell. — Austral. orient.
(Eriostemon. F. Muell.)

CROWEA. SM. (1798)

- C. saligna.** Andr. — Austr. orient.
(Eriostemon Croiset. F. Muell.)

CORREA. SM. (1798)

- C. alba.** Andr. — Australia.
- C. speciosa.** Act. — Austr. orient.
(C. rubra. Sm. — C. cardinalis. F. Muell.)
Var. : rosea.
picta superba.

Trib. 5. — ZANTHOXYLÆ.

CHOISYA. KUNTH. (1820)

- C. ternata.** Kunth. — Mexico.

ZANTHOXYLUM. LIN. (1739)

- Z. americanum.** Mill. — Amer. boreal.
 (*Z. fraxineum*. Willd. — *Z. ramiflorum*. Mehx. — *Z. Clava Herculis*. Lin.)
- Z. planispinum.** Sieb. et Zucc. — Japon.

GEIJERA. SCHOTT. (1836)

- G. parviflora.** Lindl. — Austr. tropic.
 (*Eriostemon linearifolium*. D.C.)

PILOCARPUS. VAHL. (1798)

- P. pennatifolius.** Lem. — Brazil.

ORIXA. THUNB. (1784)

- O. japonica.** Thunb. — Japonia.
 (*Othera Orixia*. Lamk. — *Ilex Orixia*. Spreng. — *Celastrus Orixia*. Sieb. et Zucc.)

Trib. 6. — TODDALIEÆ.

PHELLODENDRON. RUPR. (1850)

- P. amurense.** Rupr. — China bor.; Japon.

PTELEA. LIN. (1753)

- P. trifoliata.** Lin. — Amer. bor.-orient.
 Var.: *aurea*.

SKIMMIA. THUNB. (1784)

- S. japonica.** Thunb. — Japon.
 (*S. fragrans*. Carr. — *Ilex Skimmia*. Spreng.)
 Var.: *oblata* Veitchi.
- S. Fortunei.** Mast. — China.
 (*S. japonica*. Lindl.)
- S. Foremanni.** (St. hybrida.)
 (*S. japonica* × *S. Fortunei*.)
- S. Laureola.** Hook. fil. — Reg. Himal.
 (*Limonia Laureola*. Wall. — *Laureola fragrans*. Rœm.)

Trib. 7. — AURANTIEÆ.

MURRAYA. KOEN. ex LIN. (1771)

- M. exotica.** L. Mant. — Ind. orient.
 (*Chalcas japonensis*. Lour. — *Marsana buxifolia*. Sonner.)

CITRUS. LIN. (1753)

- C. vulgaris.** Risso. — China merid.
 (*C. Bigaradia*. Duham. — *C. chinensis*. Pers.)
 Var. : myrtifolia.
- C. Aurantium.** Lin. — Asia subtrop.
 Var. : Buddha fingered.
- C. medica.** Lin. — Asia subtrop.
 Var. : monstrosa.
 (*C. Lima*. Macfad.)
- C. Limonium.** Risso. — China merid.
- C. deliciosa.** Tenor. — Asia subtrop.
- C. decumana.** Murr. — Asia subtrop.
 (*C. pomellos*. Port. et Risso.)
- C. japonica.** Thunb. — Japonia.
- C. trifoliata.** Lin. — Japon.
 (*C. triptera*. Desf. — *Aegle sepiaria*. D C. — *Pseudægle*. Miq.)
-

XXXIV. — SIMARUBACEÆ

Trib. 1. — SIMARUBEÆ.

SIMARUBA. AUBL.

- S. excelsa.** D.C. — Ins. Jamaïca.

AILANTHUS. DESF. (1786)

- A. glandulosus.** Desf. — China ; Japon.
 (*A. procera*. Salisb.)

CNEORUM. LIN. (1753)

- C. tricoccum.** Lin. — Europ. austro-occid.
-

XXXV. — OCHNACEÆ

Trib. 1. — OCHNEÆ.

OCHNA. SCHREB. (1789)

- O. atropurpurea.** D.C. — Afric. austr.
 (*Diporidium*. Wendl.)

XXXVI. — MELIACEÆ

Trib. 1. — MELIÆ.

TURRÆA. L. MANT. (1767)

T. heterophylla. Sm. — Africa austr.

MELIA. LIN. (1753)

M. Azedarach. Lin. — Oriens; Asia orient.
(*Azedarach deleteria*, Mœnch.)

M. japonica. G. Don. — Japon.

M. uniflora. Hort. Lemoine?

M. floribunda. Carr. — Hab. ?

Trib. 2. — TRICHILIÆ.

TRICHILIA. LIN. (1753)

T. hirta. Lin. — Ins. Jamaïca.

Trib. 4. — CEDRELEÆ.

CEDRELA. LIN. (1753) ET P. BR. (1756)

C. odorata. Lin. — Amer. austr.

C. sinensis. A. Juss. — China.

(*Ailanthus flavescens*, Carr.)

XXXVII. — OLACINÆ

Trib. 3. — ICACINEÆ.

VILLAREZIA. R. ET PAV (1794)

V. grandiflora. Fisch. — Amer. austr.

XXXVIII. — ILICINEÆ

ILEX. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Aquifolium*. Tourn.

I. aquifolium. Lin. — Eur. med. et austr.; Oriens.

Var. : *calamistrata* (crispa).

Var. : Doningtoniensis.
 echinata (ferox).
 nigricans.
 obliqua (marginata aurea).
 myrtifolia (flava marginata).
 Scotica (rubricaulis).
 undulata (aurea picta).

I. dipyrena. Wall. — Reg. Himal.

I. quercifolia. Meerb. — Amer. bor. orient.

(*I. opaca*. Ait.)

I. latifolia. Thunb. — Japon.

(*I. Tarajo*. Sieb. — *I. macrophylla*. Bl.)

I. Cassine. Lin. — Amer. bor. orient. (pars merid.).

(*I. Duhoon*. Walt. — *I. caroliniana*. Mill. — *I. cassinoides*.
 Link. — *I. laurifolia*. Nutt.)

I. Othera. Spreng. — Japon.

(*Othera japonica*. Thunb.)

Cf. : Index Kewens. fasc. II, p. 1206 et fasc. III, p. 383.)

I. Perado. Soland. — Ins. Madeira.

I. Madeirensis. Lamk.)

2. *Prinos*. Asa Gray.

I. glabra. Asa Gray. — Amer. bor. orient.

(*Prinos*. Lin. — *Wintertia*. Mœnch.)

I. verticillata. Asa Gray. — Amer. bor. orient. (pars sept.).

(*Prinos*. Lin. — *Prinos conferta*. Mœnch.)

I. lævigata. Asa Gray. — Amer. bor. orient. (pars centr.).

(*Prinos*. Pursh.)

XXXIX. — CELASTRINEÆ

EVONYMUS. (TOURN.) LIN. (1753)

E. europæa. Lin. Europ.; Asia temp.

Var. : variegata.

fructis atropurpureis.

E. Hamiltoniana. Wall. — Reg. Himal.; Mongol.; Japon.

E. Thunbergianus. Blum. — China; Japon.

(*Celastrus alatus*. Thunb.)

E. atropurpurea. Jacq. — Amer. bor.

E. verrucosa. Scop. — Europ. austro-orient.; Reg. Caucas.

E. latifolia. Scop. — Europa austro-orient.

(*E. europæa*, var. *latifolia*. Lin.)

E. americana. Lin. — Amer. bor.-orient.

E. japonica. Thunb. — Japon.

Var. : *macrophylla*.
microphylla.
radicans (foliis pictis).

E. gracilis. Sieb. — Japon.

Var. : fol. *argenteis*.
 fol. *roseo-marginatis*.

E. fimbriata. Wall. — Reg. Himal.

CELASTRUS. LIN. (1753)

C. scandens. Lin. — Amer. bor.-orient.

(*Evonymoides*. Mœnch.)

C. orbiculata. Thunb. — China.; Japon.

C. dependens. Wall. — Reg. Himal.

ELÆODENDRON. JACQ. FIL. (1787)

E. australe. Vent. — Australia.

(*Rubentia*. Dum. Cours. — *Portenschlagia*. Tratt.)

E. orientale. Jacq. — Ins. Maurit.; Madagasc.

(*E. indicum*. Gærtn.)

E. croceum. D.C. — Afric. austr.

(*E. verrucosum*. Kunth. — *Ilex crocea*. Thunb. — *Crocoxylon*
excelsum. Eckl. et Zey. — *Rhamnus capensis*. Spreng. —
Cassine parvifolia. E. Mey.)

XL. — RHAMNACEÆ

Trib. 2. — ZIZYPHEÆ.

PALIURUS. JUSS. (1789)

P. australis. Gærtn. — Europ. aust.; Oriens.

(*Rhamnus Paliurus*. Lin. — *Zizyphus Paliurus*. Willd.)

ZIZYPHUS. (TOURN.) JUSS. (1789)

Z. vulgaris. Lamk. — Oriens.; China bor.

(*Rhamnus Zizyphus*. Lin. — *Zizyphus Jujuba*. Mill.)

BERCHEMIA. NECK. (1790)

B. volubilis. D.C. — Amer. bor.-orient. (pars merid.).

(*Rhamnus*. L. fl. — *R. scandens*. Hib. — *Zizyphus volubilis*.
 Willd. — *Ænoplia*. Schult.)

B. racemosa. Sieb. et Zucc. — China.

Trib. 3. — RHAMNEÆ.

RHAMNUS. LAMK. (1788)

1. *Eurhamnus*. Dipp.**R. utilis**. Dene. — China bor.; Japon.**R. cathartica**. Lin. — Europa; Asia bor. et occid.**R. saxatilis**. Lin. — Europ. alp.**R. Erythroxylon**. Pall. — Reg. Caucas.; Sibir. or.; Mongol.**R. alpina**. Lin. — Europ. alp.; Reg. Caucas.*(Frangula latifolia*. Mill. — *Alaternus alpina*. Moench.)Var. : *grandifolia*.**R. alnifolia**. L'Herit. — Am. bor. (pars sept.).**R. californica**. Eschsch. — Amer. bor.-occid.**R. Alaternus**. Lin. — Europ. aust.*(Alaternus Phyllica*. Mill.)2. *Frangula*. Mill.**R. Frangula**. Lin. — Europ.; Oriens; Sibiria.*(Frangula Alnus*. Mill.)**R. Purshiana**. D.C. — Amer. bor.-occid.*(R. alnifolia*. Pursh.)

HOVENIA. THUNB. (1784)

H. dulcis. Thunb. — Japon; China bor.

CEANOTHUS. LIN. (1753)

1. *Euceanothus*. Ser. Wats.**C. americanus**. Lin.. — Amer. bor.-orient**C. azureus**. Desf. — Mexico.Var. : *maximus*.*albidus*.*grandiflorus roseus*.*et altæ hybridæ plurimæ*.**C. thyrsiflorus**. Eschsch. — Californ. sept.**C. dentatus**. Nutt. — Californ. sept.; Oregon.**C. divaricatus**. Nutt. — Californ. sept.; Oregon.**C. floribundus**. Hook. — California.**C. Veitchianus**. Hook. — (An stirps hybrida ?).2. *Cerastes*. Ser. Wats.**C. rigidus**. Nutt. — Californ. septent.

PHYLLICA. LIN. (1753)

3. *Tylanthus*. Reissek.**P. ericoides**. Lin. — Afric. austr.*(Tylanthus eriophorus*. Presl.)

4. *Soulangia*. Brongn.**P. paniculata**. Willd. — Afric. austr.(P. *myrtifolia*. Poir. — *Soulangia paniculata*. Brogn. — *Soulangia arborescens*. Eckl. et Zey.)

NOLTIA. REICHB. (1828)

N. africana. Reichb. — Africa aust.(Ceanothus *africanus*. Lin. — *Willemetia*. Brogn. — *Vitmannia*. Wight. et Arn.)

POMADERRIS. LABILL. (1804)

P. apetala. Labill. — Tasmania.(P. *aspera*. Sieber.)

Trib. 4. — COLLETIEÆ.

COLLETIA. COMM. EX JUSS. (1789)

C. spinosa. Lamk. — Amer. austr.(C. *horrida*. Willd. — C. *armata*. Miers. — C. *polyacantha*. Humb. et Bonpl. — C. *spinosissima*. J. F. Gmel.)**C. cruciata**. Gill. et Hook. — Chili.(C. *bictoniensis*. Lindl.)

DISCARIA. HOOK. (1830)

D. serratifolia. Hook. fil. — Chili; Patagon.(Colletia. Vent. — *Colletia Chacaye*. G. Don. — *Notophaena serratifolia*. Miers.)

XLI. — AMPELIDACEÆ

Trib. 1. — AMPELIDEÆ.

VITIS. (LIN.) PLANCH. (1887)

1. *Euvitis*. Planch.**V. Labrusca**. Lin. — Amer. bor.-orient. (pars centr.).**V. riparia**. Mchx. — Amer. bor.-orient.(V. *vulpina*. Lin. — V. *incisa*. Jacq. — V. *odoratissima*. J. Donn.)Var. : *palmata* (Planch.)(V. *palmata*. Vahl. — V. *rubra*. Mchx.)

V. vinifera. Lin. — Asia occid.

Var. : *sativa*.

2. *Muscadinia.* Planch.

V. rotundifolia. Mchx. — Amer. bor. (pars merid.).

(*V. Muscadina.* Raf. — *V. vulpina.* Torr. et Gray.)

CLEMATICISSUS. PLANCH. (1887)

C. antartica. Planch. — Austr. occid.

(*Cissus.* Vent. — *Cissus glandulosa.* Poir.)

PARTHENOCISSUS. PLANCH. (1887)

P. tricuspidata. Planch. — Japon.

(*Ampelopsis.* Sieb. et Zucc. — *Vitis inconstans.* Miq.)

P. quinquefolia. Planch. — Amer. bor.-orient.

(*Ampelopsis.* Mchx. — *Ampelopsis hederacea.* D C. — *Vitis hederacea.* Ehrb. — *Cissus hederacea.* Pers. — *Hedera quinquefolia.* Lin.)

Var. : *hirsuta.*

(*Ampelopsis hirsuta.* Donn.)

Var. : *latifolia.*

(*Ampelopsis latifolia.* Tausch.)

AMPELOPSIS. MCHX. (1803)

A. heterophylla. Sieb. et Zucc. — Asia orient.

Var. : *Bungei* (Planch.)

(*A. humulifolia.* Bnge. — *Vitis heterophylla.* Thunb. — *Cissus bryoniaefolia.* Rgl. — *Cissus Davidiana.* Carr.)

A. orientalis. Planch. — Asia minor.

(*Cissus.* Lamk. — *Cissus pinnata.* Russ. — *Vitis orientalis.* Boiss.)

RHOÏCISSUS. PLANCH. (1887)

R. capensis. Planch. — Afric. aust.

(*Vitis.* Thunb. — *Cissus.* Willd.)

CISSUS. LIN. PART. (1753)

1. *Eucissus.* Planch.

C. striata. R. et Pav. — Brazil austr.; Chili mont.

(*Vitis.* Baker. — *Cissus deficiens.* Hook. et Arn. — *Adenopetalum palmatum.* Turcz.)

C. acida. Lin. — Ind. occid.

(*Sicyos angulata.* Lin.)

XLII. — SAPINDACEÆ

Trib. 1. — PAULLINIEÆ

PAULLINIA. (LIN. P. PART.) SCHUM. (1792)

P. thalictrifolia. Juss. — Amer. trop.*(P. fluminensis. Vell.)*

URVILLEA. H. B. ET K. (1817)

U. ferruginea. Lindl. — Brazil.

Trib. 3. — SAPINDEÆ.

SAPINDUS. LIN. (1753)

S. Saponarius. Pluk ex Lin. — Am. trop.

Trib. 8. — NEPHELIEÆ.

NEPHELIUM. L. MANT. (1767)

N. Lit-Chi. Cambess. — China.*(Dimocarpus. Low. — Euphonia. Juss. — Litchi sinensis. Sonner. — Nephelium Dimocarpus. Hook.)*

Trib. 9. — CUPANIEÆ.

DIPLOGLOTTIS. HOOK. FIL. (1862)

D. Cunninghami. Hook. fil. — Austr. orient.*(Cupania. Hook. — Stadmania australis. G. Don.)*

Trib. 10. — KÆLREUTERIEÆ.

KÆLREUTERIA. LAXM. (1772)

K. paniculata. Laxm. — China.*(Sapindus chinensis. Lin.)***K. bipinnata.** Franchet. — China occid.

Trib. 12. — DODONÆEÆ.

DODONÆA. LIN. (1753)

D. Thunberghiana. Eckl. et Zey. — Af. aust.*(D. angustifolia. Thunb.)*

Trib. 14. — HARPULLIÆ.

XANTHOCERAS. BNGE (1831)

X. sorbifolia Bnge. — China bor.

UNGNADIA. ENDL. (1833)

U. speciosa Endl. — Texas.

XLIII. — HIPPOCASTANACEÆ

AESCULUS. LIN. (1753)

1. *Hippocastanum*. Gærtn.**Æ. Hippocastanum**. Lin. — Græcia; As. occid.*(Hippocastanum vulgare*. Gærtn.)Var. : *variegata*.**Æ. carnea**. Hayne. — (an species ?)*(Æ. rubicunda*. Loisel — *Pavia rubicunda*. Lodd.)**Æ. chinensis**. Bnge. — China bor.; Japon.**Æ. glabra**. Willd. — Amer. bor.-orient.*(Æ. Ohioënsis*. Mchx. — *Pavia glabra*. Spach)2. *Pavia*. Boerh.**Æ. lutea**. Wangenh. — Amer. bor. (pars centr.).*(Æ. flava*. Ait. — *Pavia flava*. Mœnch.)**Æ. Pavia**. Lin. — Amer. bor. (pars cent. et merid.).*(Pavia octandra*. Mill. — *Pavia rubra*. Poir.)3. *Calothyrsus*. Spach.**Æ. Californica**. Nutt. — California.*(Calothyrsus californica*. Spach.)4. *Macrothyrsus*. Spach.**Æ. parviflora**. Walt. — Amer. bor.-orient. (pars merid.).*(Pavia alba*. Poir. — *Macrothyrsus discolor*. Spach.)

XLIV. — ACERACEÆ

ACER. (TOURN.) LIN. (1753)

3. *Lithocarpa*. Pax.**A. argutum**. Maxim. — Japon.4. *Macrantha*. Pax.**A. rufinerve**. Sieb. et Zucc. — Japon.

5. *Spicata. Pax.***A. Ginnala.** Maxim. — Mongol.; Mandsch.*(A. tataricum, var. laciniatum. Rgl.)***A. Pseudo-Platanus.** Lin. — Europ. med. et austr.; Oriens.*Var. : coloratum (purpurescens).*" *(luteo-virescens).*" *(albo variegatum).*6. *Rubra. Pax.***A. rubrum.** Lin. — Amer. bor.*(A. carolinianum. Walt.)*8. *Saccharina. Pax.***A. saccharinum.** Wangenh. — Amer. bor.9. *Campestris. Pax.***A. campestre.** Lin. — Europ.; Asia occid.**A. italum.** Lauth. — Europa austr.; Oriens.*(A. opulifolium. Vill. — A. Opalus. Ait.)*10. *Platanoïdea. Pax.***A. platanoïdes.** Lin. — Europ. centr.; Reg. Caucas**A. Lobelii.** Ten. — Italia merid.**A. lætum.** C.A. Mey. — Asia occid.; Reg. Caucas.*(A. cultratum. Wall.)*11. *Palmata. Pax.***A. Sieboldianum.** Miq. — Japon.*(A. japonicum. Franch et Sauv.)***A. circinatum.** Pursh. — Amer. bor.-occid.**A. palmatum.** Thunb. — Japon.*(A. polymorphum. Sieb. et Zucc.)**Var. : crispum.*

dissectum (roseo-pictum).

" (rhodophyllum).

linearilobum.

NEGUNDO. MÖNCH. (1794)

N. aceroïdes. Mœnch. — Amer. bor.-orient.*(Acer negundo. Lin.)**Var. : variegatum (fol. albo variegatis).*

" (fol. aureo variegatis).

N. californicum. Torr. et Gray. — Amer. bor. occid.

XLV. — MELIANTHACEÆ

MELIANTHUS. (TOURN). LIN. (1753)

M. major. Lin. — Africa aust.

M. minor. Lin. — Africa aust.
(*Diplerisma minus*. Planch.)

GREYA. HOOK. ET HARV. (1859)

G. Sutherlandi. — Africa aust.

XLVI. — STAPHYLEACEÆ

STAPHYLEA. LIN. (1753)

S. pinnata. Lin. — Europ. mer.; Asia min.; Reg. Caucas.
(*Staphylodendron*. Scop.)

S. colchica. Stev. — Reg. Caucas.

S. tubiflora ? (Hort. Cutbush.)

XLVII. — SABIACEÆ

MELIOSMA. BLUM. (1828)

M. myriantha. Sieb. et Zucc. — Japon.

XLVIII. — ANACARDIACEÆ

Trib. 2. — SPONDIEÆ.

PISTACIA. LIN. (1753)

1. *Terebinthus*. Tourn.

P. atlantica. Desf. — Reg. mediter.; Asia occid.

P. Terebinthus. Lin. — Europ. aust.; Afric. bor.; Oriens.
(*P. vera*. Mill.)

P. vera. Lin. — Asia occident.

2. *Lentiscus*. Tourn.

P. Lentiscus. Lin. — Europ. austr.; Afr. bor.; Oriens.

CORYNOCARPUS. FORST. (1776)

C. lævigatus. Forst. — Nov. Zelandia.

SCHINUS. LIN. (1753)

1. *Duvaua*. L. March.
- S. Huingan.** Molina. — Chili.
(*Duvaua dependens* et *D. dentata*. D.C. — *Amyris polygama*. Cav.)
- S. latifolius.** Gill. — Chili.
(*Duvaua molle*. Bert. — *Lithræa molle*. C. Gay)
2. *Euschinus*. L. March.
- S. molle.** Lin. — Peruvia.

COTINUS. SCOP. (1772)

- C. Coggygia.** Scop. — Europ. austr.; Reg. Cauc.; Siber.
(*Rhus cotinus*. Lin.)
- C. americanus.** Nutt. — Arkansas.
(*Rhus cotinoides*. Nutt.)

RHUS. LIN. (1753)

1. *Trichocarpeæ*. Engl.
- R. typhina.** Lin. — Amer. bor.-orient.
- R. glabra.** Lin. — Amer. bor.-orient.
Var. : *elegans* (laciniata).
- R. copallina.** Lin. — Amer. bor.-orient.
- R. Osbeckii.** Dipp. — China.; Japon.
(*R. Javanica*. Lin. — *R. semialata*. Murr., var. *Osbeckii*)
2. *Toxicodendron*. Tourn.
- R. Toxicodendron.** Lin. — Amer. bor.; Asia bor.; Japon.
(*Toxicodendron pubescens*. Mill.)
Var. : *Radicans*.
(*R. radicans*. Lin.)
- R. diversiloba.** Torr. et Gray. — Amer. bor.-occid.
(*R. lobata*. Hook.)
- R. Vernix.** Lin. — Japon.
(*R. juglandifolium*. Wall.)
- R. succedanea.** L. Mant. — China, Japon, India.
(*Toxicodendron altissimum*. Mill.)
3. *Gerontogeæ*. Engl.
- R. viminale.** Vahl — Afric. austr.
- R. tomentosa.** Lin. — Afric. austr.
(*R. Ecklonis* Schrad. — *R. elliptica*. E. Mey.)
- R. glauca.** Desf. — Afric. austr.
(*R. Thunbergiana*. Ræm. et Schult. — *R. lucida*. E. Mey.)
- R. lucida.** Lin. — Afric. aust.
- R. lævigata.** Lin. — Afric. aust.
(*R. acuminata*. E. Mey. — *R. crassinervia*. Presl.)

XLIX. — CORIARIEÆ

CORIARIA. NISS. EX LIN. (1753)

- C. myrtifolia.** Lin. — Europ. aust.; Afric. bor.
C. japonica. As. Gray. — Japon.
-

L. — LEGUMINOSÆ

Subord. 1. — PAPILIONACEÆ.

Trib 1. — PODALYRIEÆ.

ANAGYRIS. (TOURN.) LIN. (1753)

- A. fætida.** Lin. — Europ. aust.

PIPTANTHUS. SWEET. (1828)

- P. nepalensis.** Sweet. — Reg. Himal. temp.
 (*Anagyris indica.* Lindl. — *Thermopsis nepalensis.* D.C. —
Baptisia nepalensis. Hook.)

BAPTISIA. VENT. (1808)

- B. perfoliata.** R. Br. — Amer. bor.-occid. (Carolin.).
 (*Crotalaria.* Lin. — *Rafnia.* Willd. — *Sophora.* Walt. —
Podalyria. Mehx. — *Thermopsis caroliniana.* Curt.)

BRACHYSEMA. R. BR. (1811)

- B. latifolium.** R. Br. — Australia austr.-occid.
B. undulatum. Ker.-Gawl. — Australia occid.
 (*Oxylobium sericeum.* Bak.)
B. acuminatum. Truff. — Hab. ?

OXYLOBIUM. ANDR. (1809)

- O. ellipticum.** R. Br. — Tasmania.
 (*Gompholobium.* Labill. — *Callistachys.* Vent. — *Chorizema.*
 F. Müll.)
O. Callistachys. Benth. — Austr. orient.
 (*Callistachys lanceolata.* Vent. — *Chorizema.* F. Müll. —
Chorizema. ovata. Sims.)
O. capitatum. Benth. — Australia.
 (*Callistachys oxylobioides.* Meissn.)

O. cuneatum. Benth. — Austral. merid.

(*Podolobium obovatum*. A. Gray.)

CHORIZEMA. LABILL. (1793)

C. ilicifolium. Labill. — Austral. aust.-occid.

(*C. nanum*. Sims.)

C. diversifolium. A.D.C. — Australia.

(*C. rhombeum*. Lodd. — *C. spectabile*. Lindl.)

Var. : *Lowii*.

C. Henckmanni. R. Br. — Austr. oriental.

(*C. Baueri*. Meissn. — *C. Rhyncotropis*. Meissn. — *Podolobium aciculare*. D.C.)

C. cordatum. Lindl. — Australia.

(*C. flavum*. Henfrey.)

GOMPHOLOBIUM. SM. (1798)

G. polymorphum. R. Br. — Austr. austro.-occid.

(*G. grandiflorum*. Anders. — *G. venulosum*. Lindl.)

BURTONIA. R. BR. (1811)

B. conferta. D.C. — Austral. merid.

(*Gompholobium ericæfolium*. A. Cunn.)

AOTUS. SM. (1805)

A. gracillima. Meissn. — Australia.

(*A. intermedia*. Meissn.)

GASTROLOBIUM. R. BR. (1811)

G. Brownii. Meissn. — Australia.

G. oxylobioides. Benth. — Austr. merid.

(*G. Drummondii*. Meissn.)

PULTENÆA. SM. (1805)

1. *Hymenota*. D.C.

P. stricta. Sims. — Tasmania.

P. rosea. F. Muell. — Austral. merid.

(*Burtonia subalpina*. F. Müll.)

EUTAXIA. R. BR. (1811)

E. myrtifolia. R. Br. — Australia.

(*Dillwynia*. Sm. — *Dillwynia obovata* Labill.)

DILLWYNIA. SM. (1805)

D. ericæfolia. Sm. — Austr. orient.

(*D. parvifolia*. R. Br. — *B. glaberrima*. Sm. — *D. filifolia*.
Endl. — *Pultenea retorta*. Wendl.)

D. lanceolata. Loisel. — Australia.

D. pungens. Mackay. — Australia.

(*Eutaxia* Sweet. — *Daviesia condensata*. Turcz.)

Trib. 2. — GENISTEÆ.

TEMPLETONIA. R. BR. (1812)

T. retusa. R. Br. — Austr. occid.

(*Rafnia*. Vent.)

T. glauca. Sims. — Austr. occid.

HOVEA. R. BR. (1812)

H. Celsii. Bompl. — Australia

(*Platyphilum*. Delaux. — *Poiretia elliptica*. Sm.)

CROTALARIA. DILL. EX LIN

C. longirostrata. Hook. et Arn. — Mexico.

LUPINUS. (TOURN.) LIN. (1753)

L. perennis. Lin. — Amer. bor.

L. versicolor. Sweet. — Mexico.

Variet hort.

L. polyphyllus. Lindl. — California.

ADENOCARPUS. D.C. (1815)

A. decorticans. Boiss. — Hispania.

(*A. Boissieri*. Webb.)

LABURNUM. GRISEB. (1843)

L. vulgare. Griseb. — Europ. orient.

(*Cytisus Laburnum*. Lin.)

Var. : autumnale (bifera).

L. Adami. Petz. et Kirchn. — (Stirp hybrida.)

(*L. vulgare* × *Cytisus purpureus*.)

PETTERIA. PRESL. (1844)

P. ramentacea. Presl. — Dalmatia.

(*Laburnum fragrans*. Griseb. — *Cytisus ramentaceus*. Sieber. —

Cytisus Weldenii. Vis. — *Cytisus fragrans*. Welden.)

GENISTA. LIN. (1753)

1. *Asterospartum*. Spach.**G. radiata**. Scop. — Europ. alpest. et austr.

(*Asterocytisus*. Schur. — *Enantiosparton*. K. Koch. — *Spartium*. Lin. — *Telinaria*. Presl.)

2. *Corniola*. Medik.**G. tinctoria**. Lin. — Europa; Asia occid.

(*G. humifusa*. Dicks. — *G. inermis*. Gilib. — *Corniola tinctoria*. Medik. — *Genistoides tinctorius*. Mönch. — *Spartium tinctorius*. Roth. — *Cytisus tinctorius*. Vis.)

Var. : *Sibirica*.

(*Genista sibirica*. Lin.)

4. *Spartocarpus*. Spach.**G. germanica**. Lin. — Europ. centr.

(*G. villosa*. Lamk. — *Scorpius spinosus*. Mönch. — *Voglera spinosa*. Fl. d. Wetter. — *Cytisus germanicus*. Vis.)

G. sagittalis. Lin. — Europa.

(*Cytisus*. Kit. — *Spartium*. Rott.)

G. hispanica. Lin. — Penins. Hispan.6. *Stenocarpus*. Benth.**G. florida**. Lin. — Reg. mediter.

(*G. Bourgari*. Spach. — *G. leptoclada*. J. Gay.)

G. triquetra. L'Herit. — Corsica.

ULEX. LIN. (1753)

U. europæus. Lin. — Europ. med. et aust.

Var. : flore pleno.

CYTISUS. LIN. (1753)

1. *Sarothamnus*. Wimm.**C. scoparius**. Link. — Europ. med.

(*Spartium*. Lin. — *Genista*. Lamk. — *G. glabra*. Spach. — *G. hirsuta*. Mönch. — *Sarothamnus scoparius* Wimm.)

Var. : *Andreanus*.

2. *Spartocytisus*. Benth.**C. albus**. Link. — Penins. Hisp.; Africa bor.

(*Genista*. Lamk. — *Genista disperma*. Spach. — *Spartocytisus albus*. Webb. — *Spartothamnus albus*. Presl. — *Spartium dispermum*. Willd.)

C. purgans. Willk. — Europa austr.-occid.

(*Genista*. Lin. — *Sarothamnus*. Gren. et God. — *Dendrospartium*. Spach. — *Drymospartium*. Presl.)

3. *Lembotropis*. Grieseb.**C. nigricans**. Lin. — Eur. med.

(*Lembotropis*. Grieseb.)

Var. : *Carlieri*.

- C. sessilifolius.** Lin. — Eur. med. et aust.
(Spartocytisus. Webb. — Spartothamnus. Presl.)
5. ***Tubocytisus.*** D.C.
- C. purpureus.** Scop. — Austria occid.; Italia sept.
(Viborgia. Mœnch. — Chamæcytissus. Link.)
- C. ratisbonensis.** Schæf. — Eur. centr. et austr.; Oriens
(C. supinus. Jacq. — C. biflorus. L'Herit. — Chamæcytissus. Link.)
- C. hirsutus.** Lin. — Eur. med. et aust.; Oriens.
(C. Triflorus. Lamk. — Viborgia. Mœnch. — Chamæcytissus. Link.)
- C. capitatus.** Scop. — Eur. med.; Italia.
(C. supinus. Lin. — C. hirsutus. Lamk.)
6. ***Teline.*** Benth.
- C. filipes.** Webb. et Bertr. — Reg. medit.
- C. canariensis.** Steud. — Ins. Canar.
(Genista. Lin. — Acornela. Raf.)
- C. racemosus.** Marnock. — Europ. aust.; Ins. Mad.
Var. : Everstianus (forsé : St. hybrida).

Trib. 3. — TRIFOLIEÆ.

ONONIS. LIN. (1753)

- O. fruticosa.** Lin. — Gallia. merid.

MEDICAGO. TOURN. EX LIN

2. *Lupularia.* Ser.

- M. arborea.** Lin. — Italia ; Græcia.

Trib. 4. — LOTEÆ.

ANTHYLLIS. RIV. EX LIN

1. *Vulneraria.* D.C.

- A. Barba Jovis.** D.C. — Reg. mediterr.
(Vulneraria argentea. Lamk.)

LOTUS. (TOURN.) LIN. (1753)

4. *Eulotus.* Ser.

- L. peliorhynchus.** Bak. — Ins. Canar.

Trib. 5. — GALEGEÆ.

PSORALEA. LIN. (1753)

- P. dentata.** D.C. — Ins. Madeira.

AMORPHA. LIN. (1753)

A. fruticosa. Lin. — Am. bor. (pars centr.).

(*A. glabra*. Desf. — *A. fragrans*. Sweet. — *A. paniculata*. Torr. et Gray.)

A. canescens. Nutt. — Amer. bor.

INDIGOFERA. LIN. (1753)

3. *Euindigofera*. Benth.

I. Gerardiana. Wall. — Reg. Himal.

(*I. Dosua*. Buch.-Hamilt.)

I. decora. Lindl. — China.

Var. : *alba*.

WISTARIA. NUTT. (1818)

W. Chinensis. D.C. — China; Mongolia.

(*Glycine floribunda*. Willd. — *Dolichos polystachios*. Thunb.)

Var. : *nivea*.

multijuga. Sieb.

W. brachybotrys. Sieb. et Zucc. — Japon.

ROBINIA. LIN. (1753)

R. hispida. Lin. fl. — Amer. bor. (pars centr.).

(*Pseudo-acacia*. Mönch. — *Robinia roseo*. Loisel.)

R. neo-mexicana. Asa Gray. — Colorado; Nov. Mexico.

R. pseudo-acacia. Lin. — Amer. bor. (pars centr.).

(*Pseudo-Acacia odorata*. Mönch.)

R. viscosa. Vent. — Amer. bor. (pars centr.).

(*R. glutinosa*. Sims.)

NOTOSPARTIUM. HOOK. FIL. (1857)

N. Carmichaeli. Hook. fl. — Nov. Zelandia.

CLIANTHUS. BANKS ET SOLAND (EX G. DON) (1834)

C. puniceus. Banks et Soland. — Nov. Zelandia.

(*Donia*. G. Don.)

Var. : *magnificus*.

SUTHERLANDIA. R. BR. (1812)

S. frutescens. R. Br. — Africa austr.

(*Colutea*. Lin.)

SWAINSONIA. SALISB. (1798)

S. coronillæfolia. Salisb. — Austral. austro-orient.

S. galegifolia. R. Br. — Austral. austro-orient.

(*Vicia*. Andr — *Colutea*. Sims.)

S. Osbornii. T. Moore. — Austral. orient.

COLUTEA. (TOURN.) LIN. (1753)

C. arborescens. Lin. — Europ. med.-austr.; Oriens.

C. orientalis. Mill. — Europ. austr.; Oriens.; Tartar.

(*C. sanguinea*. Pall. — *C. aperta*. Mönch.)

C. melanocalyx. Boiss. et Held. — Asia minor.

HALIMODENDRON. FISCH. (IN D.C.) (1825)

H. argenteum. Fisch. — Sibir.; Tartaria.

(*Robinia halodendron*. Lin. fl. — *Sophora argentea*. Pall. — *Caragana* Lamk. — *Pseudo-Acacia*. Mönch.)

CARAGANA. LAMK. (1783)

C. arborescens. Lamk. — Sibiria.

(*C. inermis*. Mönch. — *Robinia Caragana*. Lin.)

Var. : pendula.

C. microphylla. Lamk. — Sibiria; Mongol.; Dahur.

(*C. Altagana*. Poir. — *Robinia Altagana*. L'Herit.)

C. frutescens. D.C. — Russia; Reg. Caucas.; Sibir

(*C. digitata*. Lamk. — *Robinia frutex*. Lin.)

C. jubata. Poir. — Sibiria.

(*Robinia*. Pall.)

C. Gerardiana. Royle. — Reg. Himal.

(*Astragalus*. Grah.)

C. spinosa. D.C. — Sibiria.

(*C. ferox*. Lamk. — *Robinia spinosa*. L. Mant. — *Robinia spinosissima*. Laxm.)

C. Chamlagu. Lamk. — China. bor.

(*Robinia*. L'Herit. — *Robinia chinensis*. Pers.)

C. pygmæa. D.C. — Reg. Caucas.; Sibir.; Tartar.

(*Robinia*. Lin. — *Genista versicolor*. Wall.)

C. arenaria. Dipp. — Asia centr.

(*C. pygmæa*, var. : *arenaria*. Fisch.)

CALOPHACA. FISCH. (1825)

C. wolgarica. Fisch. — Russia merid.; Turkest.

(*Cytisus*. Lin. fl. — *Cytisus pinnatus* Pall. — *Colutea wolgarica*. Lamk. — *Adenocarpus wolgensis*. Sprgl.)

GLYCYRRHIZA. TOURN. EX LIN. (1753)

G. glabra. Lin. — Reg. medit.; Oriens.

Trib. 6. — **HEDYSAREÆ.****CORONILLA. TOURN. EX LIN. (1753)**

1. *Emerus. Desv. (Tourn.).*
C. Emerus. Lin. — Eur. med. et austr.
 (*C. pauciflora. Lamk. — Emerus Major. Mill.*)
 2. *Eucoronilla. Benth.*
C. varia. Lin. — Europa.
 (*C. hirta. Bnge. — Astragalus glaucoïdes. Gmel.*)

HEDYSARUM. (TOURN.) LIN. (1753)

- H. multijugum.** Maxim. — Mongolia.

DESMODIUM. DESV. (1813)

7. *Dollinera. Benth.*
D. elegans. D.C. — Reg. Himal.
 (*D. Tiliacifolium. G. Don.*)
 9. *Chalarium. Benth.*
D. Dillenii. Darl. — Amer. bor.
 (*Hedysarum. Dill.*)

LESPEDEZA. MCHX. (1803)

- L. bicolor.** Purcz. — China bor.; Japon.
L. racemosa. Dipp. — Japon; Corea.
 (*L. Sieboldii. Miq. — Desmodium penduliflorum. Oudem. —*
Desmodium racemosum. Sieb. et Zucc.)

VICIA. (TOURN.) JUSS.

- V. aurantiaca.** Boiss. — Penins. Taur.
 (*Orob. Stev. ex Bieber.*)

Trib. 7. — **VICIEÆ.****LATHYRUS. LIN. (1753)**

- L. grandiflorus.** Sims. — Sicilia.
 (*Pisum biflorum. Rafn.*)

Trib. 8. — **PHASEOLEÆ.****CENTROSEMA. BENTH. (1838)**

- C. grandiflorum.** Benth. — Brazil.

HARDENBERGIA. BENTH. (1837)

- H. monophylla.** Benth. — Austral. orient.
 (*Kennedya*. Vent. — *Kennedya ovata*. Sims. — *Glycine bimaculata*. Curt.)
 Var. : alba.

KENNEDYA. VENT. (1804)

- K. coccinea.** Vent. — Australia austro-occid.
 (*Zichya*. Benth.)
K. nigricans. Lindl. — Australia.
K. prostrata. R. Br. — Australia orient.
 (*Glycine coccinea*. Curt.)
K. macrophylla. Benth. — Austral. orient.
 (*Physolobium*. Meissn. — *Zichya longiracemosa*. Hueg.)

ERYTHRINA. LIN. (1753)

1. *Micropteryx*. Walp.
E. Corallodendron. Lin. — Ind. occid.
 (*Corallodendron aculeatum*. (Tourn.) Medik.)
E. crista-galli. Lin. — Brazil.
 (*E. fasciculata*. Benth. — *E. laurifolia*. Jacq. — *Micropteryx crista-galli*. Walp.)
E. speciosa. Andr. — Ind. occid.
E. suberosa. Roxb. — Ind. orient.
 (*E. indica*. Lamk., var. *alba*. — *Micropteryx sulobata*. Walp.)
 2. *Duchassaingia*. Walp.
E. acanthocarpa. E. Mey. — Africa austr.
 (*E. Humeana*. Eckl et Zeyl.)

APIOS. (BOERH.) MCENCH. (1794)

- A. tuberosa.** Mönch. — Amer. bor. (pars med.).
 (*Glycine Apios*. Lin.)

DIOCLEA. H. B. ET KUNTH. (1824)

- D. glycinioïdes.** Pasq. — Reg. Argentina.

PUERARIA. D.C. (1825)

- P. Thunbergiana.** Benth. — Asia austr.-orient.
 (*Pachyrrhizus*. Sieb. et Zucc.)

DOLICHOS. LIN. (1753) PART.

- D. lignosus.** Lin. — Ind. orient.
 (*D. Lablab*. Lin.)

FAGELIA. NECK. (1790)

F. bituminosa. D.C. — Africa austr.*(Glycine. Lin. — Glycine viscosa. Mönch. — Crotalaria glycinea. Lamk.)*

Trib. 9. — DALBERGIEÆ.

MACHÆRIUM. PERS. (1807)

M. firmum. Benth. — Brazil.

Trib. 10. — SOPHOREÆ.

CLADRASTIS. RAF. (1825)

C. tinctoria. Raf. — Amer. bor. (pars med.).*(Virgilia lutea. Mchx.)***C. amurensis.** K. Koch — Reg. Amur.; Japon.*(Maackia. Rupr. et Maxim.)*

SOPHORA. LIN. (1753)

1. *Eusophora.* D.C.**S. japonica.** Lin. fil. — Japon; China.*(Styphnolobium. Schott.)*Var.: *pendula.***S. secundiflora.** Lag. — Mexico.*(Virgilia. Cav.)*2. *Pseudosophora.* D.C.**S. alopecurioides.** Lin. — Reg. Caucas.; Sibir.; Pers.3. *Edwardsia.* Salisb.**S. tetraptera.** Ait. — Nov. Zelandia.*(Edwardsia grandiflora. Salisb. — E. Mac Nabiana. R. Grah.)*Var.: *microphylla.**(Edwardsia microphylla, Salisb.)*

CASTANOSPERMUM. A. CUNN.

C. australe. A. Cunn. et Fras. — Austr. subtrop.

Subord. II. — CÆSALPINIÆ.

Trib. 13. — EUCÆSALPINIÆ.

CÆSALPINIA LIN. (1753)

2. *Guilandina.* Benth.**C. echinata.** Lamk. — Brazil.*(Guilandina. Spreng.)*

4. *Cæsalpinaria*. Benth.

- C. japonica**. Sieb. et Zucc. — Japon.
(*C. crista*. Thumb. — *C. sepiaria*. Miq.)
C. Gilliesii. Wall. — Amer. austr.
(*Poinciana*. Hook.)

GYMNOCLADUS. LAMK. (1783)

- G. canadensis**. Lamk. — Amer. bor.-orient.
(*Guilandina dioica*. Lin. — *Guilandina inermis*. Salisb. — *Hyperantherac anadensis*. Vahl.)

GLEDITSCHIA. LIN. (1753)

- G. triacanthos**. Lin. — Amer. bor.-orient.
(*G. spinosa*. Marsh. — *G. melitoba*. Walt.)
G. caspica. Desf. — Persia ; Reg. Casp.
G. macracantha. Desf. — China.

PARKINSONIA. PLUM. EX LIN. (1753)

- P. aculeata**. Lin. — Amer. trop.

Trib. 14. — CASSIÆ.

CASSIA. TOURN. EX LIN. (1753)

1. *Fistula*. D.C.
C. Fistula. Lin. — Ægypt.; Ind. orient.
(*C. excelsa*. H. B. et K. — *C. rhombifolia*. Roxb.)
2. *Chamæfistula*. D.C.
C. lævigata. Willd. — Cosmop. trop.
(*C. grandiflora*. Desf. — *C. floribunda*. Cav. — *C. elegans*.
H. B. et K. — *C. Herbertiana*. Lindl.)
3. *Senna*. Benth.
C. Sophera. Lin. — Ægypt.; China.
(*C. schimifolia*. A.D.C.)
C. marylandica. Lin. — Amer. bor.
(*C. reflexa*. Salisb.)
C. bicapsularis. Lin. — Amer. trop.
(*C. chinensis*. Lamk. — *C. Alcaparilla*. H. B. et K. — *C. Collæ*.
G. Don. — *C. flexuosa*. A.D.C. — *C. frondosa*. Hook. et Arn.
— *C. grandiflora*. Pers. — *C. inflata*. Spreng. — *C. Quebracho*. Steud.)
4. *Psilorhegma*. Vogel.
C. eremophylla. A. Cunn. — Australia.
(*C. nemophylla*. Walp.)

CERATONIA. LIN. (1753)

C. Siliqua. Lin. — Eur. austr.; Oriens.

Trib. 15. — BAUHINIEÆ.

BAUHINIA. PLUM EX LIN.

4. *Planera*. Benth.

B. Galpini. R. Br. — Africa australis.

CERCIS. LIN. (1753)

C. Siliquastrum. Lin. — Europ. austr.; Asia occid.
(*Siliquastrum orbiculatum*. March.)

C. occidentalis. Torr. et As. Gray. — Amer. bor.-occid.

C. chinensis. Bnge. — China bor. et med.
(*C. japonica*. Sieb.)

Trib. 16. — AMHERSTIEÆ.

TAMARINDUS. LIN. (1753)

T. indicus. Lin. — Africa calid.; Arabia; Ind. orient.

Subord. III. — MIMOSEÆ.

Trib. 21. — ADENANTHEREÆ.

DICHROSTACHYS. WIGHT. ET ARN. (1834)

D. nutans. Benth. — Afr. tropic. et subtrop.

(*Caillea Dichrostachys*. Guill. et Pers. — *Desmanthus nutans*,
D. divergens, *D. leptostachys* et *D. trichostachys*. D.C. —
Dichrostachys caffra. Meissn. — *Acacia spinosa*. E. Mey.)

Trib. 22. — EUMIMOSEÆ.

MIMOSA. LIN. PR. PAR. (1753)

M. pudica. Lin. — Brazil.

Trib. 23. — ACACIEÆ.

ACACIA. (TOURN.) WILLD. (1805)

1. *Phyllodineæ*. Benth.

A. alata. R. Br. — Austr. occid.
(*A. platyptera*. Lindl.)

A. aspera. Lindl. — Australia.
(*A. densifolia*. Benth.)

- A. armata.** R. Br. — Austral. austro-orient.
 (*A. furcifera*. Lindl. — *A. hydrida*. Lodd. — *A. micracantha*.
 A. Dietr. — *A. ornitophora*. Sw. — *A. tristis*. R. Grah.)
 Var. : *paradoxa*.
 (*A. paradoxa* D.C.)
- A. decipiens.** R. Br. — Austral. austro-occid.
 (*A. dolabriformis*. Colla. — *A. incrassata*. Hook. — *Mimosa*
decipiens. Kön. — *Adiantum truncatum*. Burm.)
- A. cuneata.** Benth. — Austral. occid.
- A. diffusa.** Sims. — Austral. et Tasmania.
 (*A. prostrata*. Lodd.)
- A. verticillata.** Willd. — Austr. merid.; Tasmania.
 (*A. ruscifolia*. A. Cunn. — *A. maesta*. Lindl. — *A. ovoidea*.
 Benth.)
- A. Oxycedrus.** Sieber. — Austr. orient.
- A. rigens.** A. Cunn. — Austral. austro-orient.
- A. vestita.** Ker. Gawl. — Australia.
 (*A. conspicua*. A. Cunn.)
- A. cultriformis.** A. Cunn. — Austr. orient.
 (*A. scapuliformis*. A. Cunn.)
- A. lunata.** Sieber. — Austral. orient. et merid.
 (*A. olarofolia* et *A. dealbata*. A. Cunn. — *A. brevifolia*. Lodd.
 — *A. furfuracea*. G. Don.)
- A. pycnantha.** Benth. — Austr. merid.
 (*A. petiolaris*. Lehm. — *A. falcinella*. Meissn.)
- A. cyanophylla.** Lindl. — Austr. orient.
- A. melanoxylon.** R. Br. — Austr. merid.; Tasmania.
 (*A. arcuata*. Sieber. — *A. brevipes*. A. Cunn. — *A. latifolia*.
 Desf.)
- A. verniciflua.** A. Cunn. — Austral. orient.
 (*A. exsudans*. Lindl.)
- A. linearis.** Sims. — Austr. orient.
 (*A. longissima*. Wendl.)
- A. longifolia.** Willd. — Austr. orient.
 (*A. dependens*, *A. intermedia* et *A. obtusifolia*. A. Cunn. —
A. dissitiflora. Benth. — *A. floribunda*. Willd. — *A. inter-*
texta. Sieber. — *A. mucronata*. Willd. — *A. plebophylla*.
 F. Muell. — *A. Sophoræ*. R. Br. — *Mimosa longifolia*. Andr.)
 Var. : *magnifica*.
- A. montana.** Benth. — Australia.
 (*A. clavata*. Schlecht.)
- A. cordata.** Steud. — (An species?).
 2. *Botriocephalæ*. Benth.
- A. dealbata.** Link. — Austr. merid.; Tasmania.
 (*A. affinis*. Sm.)

3. *Pulchellæ. Benth.***A. Drummondii.** Benth. — Austr. occid.(A. *Candolleana*. Meissn.)4. *Gummiferæ. Benth.***A. Farnesiana.** Willd. — Amer. trop.(A. *aromatica*. Poepp. — A. *edulis*. Humb. et Boyl. — A. *adenopa*. Hook. et Arn. — A. *leptophylla*. D.C. — A. *pedunculata*. Willd. — A. *lenticellata*. F. Muell. — *Mimosa Farnesiana*. Lin.)**A. Cavenia.** Hook. et Arn. — Chili; Reg. Arg.**A. eburnea.** Willd. — Oriens.; Ind. orient.**A. horrida.** Willd. — Africa austr.; Arabia.(A. *capensis*. Burch.)**A. lanata.** Mart. et Gall. — Mexico.5. *Vulgares. Benth.***A. trinervis.** Sieber. — Australia.

?

A. coccinea. Link. — Nova Zelandia.

TriB. 24. — INGEÆ.

ALBIZZIA. DURAZZINI. (1772)

A. Gul. Ibrischim. (rectè). — Oriens; India; Japon; China(A. *Julibrissim.* Durazz. — *Acacia*. Willd. — *Mimosa*. Scop. — *Mimosa arborea*. Forst. — *Albizzia Nemu*. Willd. — *Acacia kalthora*. G. Don.)**A. saligna.** (Ind. Kew. I. p. 9). — Australia.(Acacia *leiophylla*. Benth.)**A. lophanta.** Benth. — Austr. occid.(Acacia. Willd. — *Acacia insignis*. Hoffmsg.)

PITHECOLOBIUM. MART. (1837)

1. *Unguis Cati. Benth.***P. Unguis Cati.** Benth. — Amer. trop.

(Inga. Willd.)

LI. — ROSACEÆ

Trib. 2. — PRUNEÆ.

PRUNUS. (TOURN.) LIN. EXTENS. (1753)

1. *Amygdalus. Lin.***P. Amygdalus.** Stokes. — Asia centr.(Amygdalus *communis*. Lin.)Var. : *fragilis*.(Amygdalus *dulcis*. Mill.)

- P. nana.** Dipp. — Europ. orient. ; Reg. Caucas. ; As. bor.
(*Amygdalus nana*. Lin.)
Var. : flore pleno.
- P. Persica.** Sieb. et Zucc. — China.
A) *Vulgaris. Maxim.*
(*Amygdalus Persica*. Lin. — *Persica vulgaris*. Mill.)
Var. : foliis atropurpureis.
et altræ variet. hortens. plurimæ.
B) *Davidiana. Maxim.*
(*Persica Davidiana*. Carr.)
C) *Nucipersica. Dipp.*
(*Amygdalus Persica* var. *Nucipersica*. Lin. — *A. nectarina*. Ait.
— *Persica lævis*. D.C. — *Persica nucipersica*. Borkh.)
Variet. hortens.
- P. triloba.** Lindl. — Asia med. et orient.
(*Amygdalus pedunculata*. Bnge. — *Amygdalus Lindleyi*. Carr.)
3. *Microcerasus. Webb.*
- P. prostrata.** Labill. — Europ. austr. ; Reg. Cauc. ; Oriens.
(*Cerasus*. Loisel.)
4. *Cerasus. Juss.*
- P. Cerasus.** Lin. — Asia minor.
(*P. acida*. Gärtn. — *P. austera*. Ehrb. — *Cerasus vulgaris*.
Mill. — *Cerasus caproniana*. D.C.)
Var. hortens.
- P. Avium.** Lin. — Europ. ; Asia occid.
(*Cerasus nigra*. Mill. — *Cerasus Avium*. Mœnch.)
A) *Juliana.*
B) *Duracina.*
(*P. Cerasus* var. *Bigarella*. Lin. — *Cerasus duracina*. D.C.)
Var. : flore pleno.
et altræ hortens plur.
- P. fruticosa.** Pall. — Eur. med. et orient. ; Sibir.
(*P. Chamæcerasus*. Jacq. — *Cerasus Chamæcerasus*. Loisel. —
Chamæcerasus fruticosa. D.C.)
- P. pumila.** L. Mant. — Amer. bor.
(*Cerasus glauca*. Mœnch.)
- P. Pseudocerasus.** Lindl. — China ; Japon.
(*Pr. Cerasus*. Thunb.)
Var. : Sieboldii (fl. pleno).
(*C. Sieboldii*. Carr.)
- P. Mahaleb.** Lin. — Europ. med. et austr. ; Reg. Caucas. ;
Oriens.
(*Cerasus*. Mill. — *Padus*. Borkh.)
5. *Pseudoprunus. Dipp.*
- P. americana.** Marsh. — Amer. bor.-orient. ; Mexico.
(*Cerasus nigra*. Hook.)

6. *Prunophora*. Neck.**P. Armeniaca**. Lin. — Chin. bor.; Turk.; Reg. Caucas.a) *Vulgaris*.

(Armeniaca vulgaris. Lamk.)

Variet. hortens.

P. cerasifera. Ehrb. — Eur. austro-orient.; Oriens.; Turk.

(P. Mirobolana. Loisel. — P. divaricata. Ledeb.)

Var. : atropurpurea

P. Cocumilio. Ten. — Calabria.**P. domestica**. Lin. — Asia?

Var. hortens plur.

P. spinosa. Lin. — Europ. med. et austr.; Reg. Caucas.;

Afr. bor.

P. syriaca. Borkh. — Asia occid.7. *Padus*. Lin.**P. virginiana**. Lin. — Amer. bor. orient.

(Cerasus. Mchx.)

P. Grayana. Maxim. — Japon.**P. Capuli**. Cav. — Mexico; Peruvia.

(Cerasus Capulin. D.C.)

P. Padus. Lin. — Europa; Asia bor. et med.

(Padus Avium. Mill. — Cerasus Padus. D.C.)

P. Laurocerasus. Lin. — Europ. austro-orient.; Reg.

Cauc.; Oriens.

(Padus. Mill. — Cerasus. Loisel.)

Var. : caucasica.

colchica.

P. lusitanica. Lin. — Penin. Hispan.; Ins. Canar.

(Padus. Mill. — Cerasus. Loisel.)

NUTTALIA. TORR. ET GRAY. (1838)

N. cerasiformis. Torr. et Gray. — California.

Trib. 3 — SPIRÆEÆ.

SPIRÆA. LIN. (1753)

1. *Euspiræa*.**S. Thunbergi**. Sieb. — China; Japon.

(S. crenata. Thunb. — Sp. japonica. Raf.)

S. prunifolia. Sieb. et Zucc. — China; Japon.**S. hypericifolia**. Lin. — Eur. austro-orient.; Asia med.**S. trilobata**. L. Mant. — Asia med.; China bor.**S. Blumei**. G. Don. — Japon.

(S. chamædryfolia. Blm.)

- S. cantoniensis.** Lour. — China ; Japon.
(*S. chamædryfolia*. Thunb. — *S. Reevesiana*. Lindl.)
- S. chamædryfolia.** Lin. — Eur. orient.; Asia med. et orient.
- S. media.** Schmidt. — Eur. orient.; Asia med. et orient.
(*S. confusa*. Rgl. et Kørn.)
- S. canescens.** D. Don. — Reg. Himal.
(*S. cuneifolia*. Wall.)
- S. flexuosa.** Rchb. — Carniola ; Venetia.
- S. betulifolia.** Pall. — Asia bor.-orient.; Amer. bor.
Var. : *rosea*.
- S. albiflora.** Zbl. — Japon.
- S. Bumalda ?** — (Stirps hybr.).
(*S. albiflora*. × *S. japonica*.)
- S. superba ?** — (Stirps hybr.).
(*S. albiflora*. × *S. corymbosa*.)
- S. margaritæ.** Zbl. — (Stirps hybr.).
(*S. japonica*. × *S. superba*.)
- S. bullata.** Maxim. — Japon.
4. *Spiraria*. Ser.
- S. alba.** Du Roi. — Amer. bor.
- S. salicifolia.** Lin. — Eur. orient.; As. et Amer. bor.
(*S. sibirica*. Raf.)
- S. Douglasii.** Hook. — Amer. bor.-occid.
(*S. tomentosa*. Raf.)
5. *Sibiræa*. Maxim.
- S. lævigata.** L. Mant. — Sibiria.
- S. astilboïdes.** Maxim. — Sibiria ; China bor.; Japon.
6. *Sorbaria*. (Ser.) Alex. Braun.
- S. sorbifolia.** Lin. — Asia bor.-orient.
(*Basilima*. Raf — *S. pinnata*. Mœnch.)
- S. Lindleyana.** Wall. — Reg. Himal.
(*Schizonotus tomentosus*. Lindl. — *Sorbaria*. Maxim.)
- S. grandiflora.** Sweet. — Sib. orient.
(*S. Pallasii*. G. Don. — *Sorbaria alpina* Dipp. — *Basilima pygmæa*. Raf.)
8. *Hollodiscus*. Maxim.
- S. ariæfolia.** Sm. — Amer. bor. occid.
(*S. discolor*. Pursh. — *Hololodiscus*. Maxim. — *Schizonotus*. Raf.)

NEILLIA. D. DON. (1825)

- N. thyrsiflora.** D. Don. — Reg. Himal.
- N. opulifolia.** S. Wats. — Amer. bor.
(*Spiræa*. Lin. — *Physocarpus*. Rafin.)
Var. : *lutea*.

N. Torreyi. S. Wats. — Amer. bor.-occid.
(*Spiræa monogyna*. Torr. — *Physocarpus Torreyi*. Maxim.)

STEPHANANDRA. SIEB. ET ZUCC. (1843)

S. flexuosa. Sieb. et Zucc. — Japon ; Corea.
(*Spiræa incisa*. Thunb.)

EXOCHORDA. LINDL. (1858)

E. grandiflora. Lindl. — China bor.
(*Spiræa*. Hook. — *Amelanchier racemosa*. Fortune.)

E. Alberti. Rgl. — Turkestan.
(*Albertia simplicifolia*. Ders.)

GILLENIA. MÖNCH (1794)

G. trifoliata. Moench. — Amer. bor.
(*Spiræa*. Lin.)

G. stipulacea. Nutt. — Amer. bor. (pars med.).
(*Spiræa stipulata*. Willd.)

KERRIA. D.C. (1817)

K. japonica. D.C. — China ; Japon.
(*Rubus*. L. Mant. — *Corchorus*. Thunb. — *Spiræa*. Cambess.)
Var. : fol. argenteo-marginatis.

RHODOTYPUS. SIEB. ET ZUCC. (1835)

R. kerrioides. Sieb. et Zucc. — Japon.

NEVIUSIA. ASA GRAY. (1859)

N. alabamensis. As. Gray. — Alabama.

Trib. 4. — QUILLAJEÆ.

QUILLAJA. JUSS.

Q. Saponaria. Molin. — Chili.
(*Q. Molinæ*. D.C.)

EUCRYPHIA. CAV. (1797)

E. pinnatifolia. C. Gay. — Chili.

Trib. 5. — RUBEÆ.

RUBUS. LIN. (1753)

1. *Idæi*. Dipp.

R. odoratus. Lin. — Amer. bor.-orient.

- R. nutkanus.** Moc. in D.C. — Amer. bor. occid.
R. cratægifolius. Bge. — Reg. Amur.; China bor.; Japon.
 (*R. palmatus.* Sieb.)
R. spectabilis. Pursh. — Amer. bor. occid.
R. rosæfolius. Sm. — Ind. orient.
R. australis. Forst. — Nova Zelandia.
R. Idæus. Lin. — Europ. et As. med.
Variet. hort.
R. leucodermis. Dougl. — Amer. bor. occid.
 (*R. Douglasii.* Steud.)
R. phœnicolasius. Maxim. — Japon.
 (*R. occidentalis.* Thunb.)
R. Greggii?

Trib. 6. — **POTENTILLEÆ.**

PURSHIA. D.C. (1825)

- P. tridentata.** D.C. — Nov. Mexic.; Californ.
 (*Tigarea.* Pursh. — *Kunzia.* Spreng.)

DRYAS. LIN. (1753)

- D. octopetala.** Lin. — Europ.; Sibir.; Am. bor. (pars sept.)

GEUM. LIN. (1753)

1. *Caryophyllastrum.* Ser.
G. coccineum. Sibth. et Sm. — Græcia; Asia min.

FRAGARIA. (TOURN.) LIN. (1753)

- F. vesca.** Lin. — Reg. temp.
Variet. hort.

POTENTILLA. LIN. (1753) **EXTENS.**

1. *Potentillastrum.* Ser.
P. argyrophylla. Wall. — Reg. Himal.
 (*P. atrosanguinea.* Lodd. — *P. Candolleana.* Royb.)
P. nepalensis. Hook. — Reg. Himal.
 (*P. formosa.* Don.)
P. fruticosa. Lin. — Europ. med.; Asia et Amer. bor.
 (*P. floribunda.* Wats.)
P. Dahurica. Nestl. — Sibiria; Mongolia; Dahur.
 (*P. glabra.* Willd.)

3. *Fragariastrum*. Ser.**P. nitida**. Lin. — Europ.; Sibir.Trib. 7. — **POTERIEÆ.**

ACÆNA. LIN. FIL. (1771)

A. microphylla. Hook. fil. — Nova Zelandia.

CLIFFORTIA. LIN. (1753)

C. ilicifolia. Lin. — Afric. austr.(C. *rubricaulis*, Presl.)Trib. 8. — **ROSEÆ.**

ROSA. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Synstylæ*. D.C.**R. sempervirens**. Lin. — Europ. austr.; Afr. bor.(R. *scandens*. Mill. — R. *fusia*. Mönch. — R. *prostrata*. D.C.)**R. arvensis**. Huds. — Europa.(R. *repens*. Scop. — R. *scandens*. Mönch. — R. *Herporrhodon*. Ehrb.)Var. : *capreolata*.(R. *capreolata*. Neill.)**R. multiflora**. Thunb. — China; Japon.(R. *polyantha*. Sieb. et Zucc.)Var. *hort. et hybrid. plurimar.***R. Wichuraiana**. Crep. — Japon.(R. *sempervirens*. Sieb. et Zucc.)3. *Indicæ*. Thory.**R. chinensis**. Jacq. — China.(R. *Indica*. Thory.)A) *Semperflorens*. Curt.(R. *diversifolia*. Vent. — R. *bengalensis*. Pers.)B) *Indica*. Lindl.(R. *semperflorens*. Loisel.)I) *Fragrans*. Redouté.(R. *odoratissima*. Sw. — R. *Thea*. Hort.)II) *Borbonica*. Rgl.Variet. *hort. plur.***R. Noisettiana**. Redouté. — (Stirp. hybr.).(R. *sinensis* × R. *moschata*.)4. *Banksiæ*. Crep.**R. Banksiæ**. R. Br. — China.Var. *hort.*

5. *Gallicæ. Crep.*

R. gallica. Lin. — Eur. med. et austr.; Oriens.; Reg. Cauc.

(*R. austriaca*, Crantz. — *R. pumila*, Lin. fl.)

A) *Centifolia.*

(*R. centifolia*, Lin.)

I) *Provincialis.*

(*R. provincialis*, Mill. — *R. Pomponia*, D.C. — *R. Burgundiana*, Pers.)

II) *Muscosa.*

(*R. muscosa*, Ait.)

III) *Cristata.*

et altræ variet. hort. et hybrid. plur.

R. damascena. Mill. — (Stirp. hybrid.).

(*R. gallica* × *R. canina*.)

Var. : Kazanlik (triginto-petala.)

R. alba. Lin. — (Stirp. hybrida).

R. gallica × *R. canina*.)

6. *Caninæ. Crep.*

R. canina. Lin. — Europ.; Asia occid.; Af. bor.

R. rubrifolia. Vill. — Europ. medit.

(*R. glauca*, Desf. — *R. Ilseana*, Crep.)

R. villosa. Lin. — Europ. Reg. Cauc.; Oriens.

(*R. pomifera domestica*, Herm.)

8. *Cinnamomeæ. Crep.*

R. alpina. Lin. — Eur. med.; Asia occid.

(*R. pendulina*, Lin. — *R. inermis*, Mill. — *R. rupestris*, Krantz.)

R. virginiana. Mill. — Am. bor. (pars med. et orient.).

(*R. blanda*, Ait.)

Var. : arkansana.

R. rugosa. Thunb. — China bor.; Reg. Amur.

Var. : flore roseo pleno.

flore albo.

9. *Pimpinellifoliæ. D.C.*

R. pimpinellifolia. Lin. — Europ.; Asia temp.

(*R. altatca*, Willd. — *R. ochroleuca*, Guimp.)

10. *Luteæ. Crep.*

R. lutea. Mill. — Asia min.; Armen.; Persia.

(*R. eglanteria*, Lin. — *R. foetida*, Herrm. — *R. chlorophylla*, Ehrb.)

Variet. hort.

R. sulphurea. Ait. — Asia min.; Persia.

(*R. hemisphærica*, Herrm. — *R. glaucophylla*, Ehrb. — *R. hispida*, Seem. — *R. lutescens*, Pursh.)

15. *Microphyllæ. Crep.*

R. microphylla. Roxb. — China; Japon.

Trib. 10. — POMEÆ.

CYDONIA. TOURN. EX MILL. (1752)

- C. vulgaris.** Pers. — Eur. austro-orient.; Oriens.; Asia med.
(*Pyrus Cydonia*. Lin. — *Sorbus*. Crantz.)
Var. : lusitanica.
- C. japonica.** Pers. — Japon; China.
(*Pyrus*. Thunb. — *Malus*. Andr. — *Chornomeles*. Lindl.)
Var. : umbilicata.
et *altæ hort. plur.*
- C. Maulei.** Gard. Chron. — Japon.
- C. chinensis.** Thouin. — China.
(*Pyrus*. Poir. in Lamk.)

PYRUS. LIN. (1753) EXTENS.

1. *Malus*. (Tourn.) Hook. fl.
- P. Malus.** Lin. — Europ.; Asia med.
(*Malus communis*. D.C.)
Variet. hort. plur.
- P. spectabilis.** Ait. — China; Japon.
(*Malus*. Borkh. — *Malus sinensis*. Dum. Cours.)
Var. : flore albo pleno.
- P. Toringo.** Sieb. — Japon.
(*Malus Sieboldi*. Regl. — *Malus rivularis*. Dougl. var. *Toringo*.)
- P. Niedzwetzkiæ.** Hort. Lem. — Turkest.
2. *Eupyrus*. Hook. fl.
- P. communis.** Lin. — Europ. med. et austr.; Asia orient.
B) *Sativa*.
Variet hortens.
- P. heterophylla.** Rgl. et Schml. — Turkestan.
- P. elæagnifolia.** Pall. — Reg. Caucas.; Russ. merid.
- P. salicifolia.** Lin. fl. — Reg. Caucas.; Oriens.
3. *Aria*. (Pers.) Hook. fl.
- P. Aria.** Ehrh. — Eur. med. et austr.; Oriens.; Reg. Cauc.;
Sibir. occid.
(*Cratægus*. Lin. — *Sorbus*. Crantz. — *Mespilus*. Scop. —
Hahnia. Medik. — *Aria nivea*. Hort.)
Var. : lutescens.
- P. lanata.** Don. — Reg. Himal.
- P. Chamæmespilus.** Pall. — Europ. med. et austr.
(*Sorbus*. Crantz. — *Azarolus*. Borkh. — *Aronia*. Pers. —
Aria. Host. — *Hahnia*. Medik. — *Mespilus*. Lin. — *Cratægus*
alpina. Mill.)

4. *Sorbus. Hook. fil.***P. Aucuparia.** Gärtn. — Eur.; Reg. Cauc.; Asia bor.-orient.(Sorbus. Lin. — *Mespilus*. All. — *Aucuparia sylvestris*. Medik.
— *Pirenia Aucuparia*. Clairv.)**P. pinnatifida.** Ehrb. — Europ. bor.(Sorbus hybrida. Lin. — *Azarolus pinnatifida*. Borkh. — *Aria suecica* × *Sorbus aucuparia*. Dipp. — *P. fennica*. Babingr.)**P. torminalis.** Ehrb. — Europ. med. et austr.; Reg. Cauc.; Oriens.(Cratægus. Lin. — Sorbus. Crantz. — *Mespilus*. All. — *Pirenia*. Clair. — *Torminaria Clusii*. Rœm.)5. *Adenorachis.***P. arbutifolia.** Lin. fil. — Amer. bor.(Aronia. Pers. — *Cratægus*. Lamk. — *Azarolus*. Borkh.)Var. : *erythrocarpa*.(P. *erythrocarpa*. Mchx.).

MESPILUS. (TOURN.) LIN. (1753)

M. germanica. Lin. — Eur. med. et austr.; Reg. Cauc.; Oriens.

CRATÆGUS. TOURN. ex LIN.

C. flava. Ait. — Amer. bor. orient. (pars merid.)

(Mespilus caroliniana. Poir.)

C. Douglasii. Lindl. — Amer. bor.-occid.**C. tomentosa.** Du Roi. — Amer. bor.-orient. (p. media).(C. leucophloæos. Mönch. — *Mespilus calpodendron*. Ehrb.)**C. coccinea.** Lin. — Amer. bor.

(Mespilus. Mill.)

Subsp. : *macracantha*.**C. Crus-Galli.** Lin. — Amer. bor.(C. lucida. Mill. — *Mespilus lucida*. Du Roi.Subsp. : *linearis*.(C. linearis. Pers. — *Mespilus linearis*. Desf.)**C. tanacetifolia.** Pers. — Europ. austro-orient; Oriens;
Reg. Caucas.

(Mespilus. Poir.)

Subsp. : *orientalis*.

(C. orientalis. Pall.)

C. pinnatifida. Bge. — Sibir. orient.; China bor.**C. chlorosarca.** Maxim. — Mandsch.; Ussuri.**C. nigra.** Waldst. et Kit. — Ungaria.**C. pyracantha.** Pers. — Europ. austro-orient; Oriens;
Reg. Caucas.(Mespilus. Lin. — *Cotoneaster*. Sp. — *Pyracantha coccinea*. Rœm.)Var. : *Lalandii*.

- C. Azarolus.** Lin. — Reg. Caucas.; Oriens.
 (*C. marocana*, Pers. — *C. Aronia*, Ser. in D.C. — *Mespilus*
Azarolus, Poir. — *Azarolus crataegeoides*, Bork.)
- C. Oxyacantha.** Lin. — Europ. bor. et med.
 (*Mespilus*, Willd.
Var. hortens)
- C. monogyna.** Jacq. — Europ. bor. et med.
 (*Cr. oxyacantha*, Scop. — *Mespilus monogyna*, Willd.)
Var. : *splendens*, (Gumperi bicolor).
et altæ variet. hort.

COTONEASTER. MEDIK. (1789)

- C. uniflora.** Bge. — Sibiria.
- C. acutifolia.** Lindl. — Sibiria orient.
- C. acuminata.** Lindl. — Reg. Himal.
 (*Mespilus*, Lodd.)
Var. : *Simonsii*.
 " *prostrata*.
- C. frigida.** Wall. — Reg. Himal.
 (*Pyrus Nussia*, Buch-Hamil.)
- C. rotundifolia.** Wall. — Reg. Himal.
- C. microphylla.** Wall. — Reg. Himal.
Var. : *glacialis* (Hook. fil.).
 (*C. congesta*, Baker.)

PHOTINIA. LINDL. (1821)

- P. serrulata.** Lindl. — China; Japon.
 (*Crataegus glabra*, Thunb.)
Var. : *rotundifolia*.
 " *dentata* (multicolor.)
- P. villosa.** D.C. — China; Japon.
 (*Crataegus*, Thunb. — *Pourthiæa*, Dene. — *Stranvesia digyna*,
 Sieb. et Zucc.)

POURTHIÆA. DCNE. (1874)

- P. arguta.** Dene. — Reg. Himal.

ERIOBOTRYA. LINDL. (1822)

- E. japonica.** Lindl. — China; Japon.
 (*Mespilus*, Thunb. — *Crataegus Bibas*, Lour.)

RAPHIOLEPIS. LINDL. (1822)

- R. japonica.** Sieb. et Zucc. — China; Japon.
 (*Crataegus*, Lin. — *Mespilus Sieboldi*, Blm.)

STRANVÆSIA. LINDL. (1822)

- S. glaucescens.** Lindl. — Reg. Himal.
(*Cratægus glauca*. Wall.)

AMELANCHIER. MEDIK. (1789)

- A. canadensis.** Medik. — Amer. boreal.
(*A. Botryapium* Borkh. — *Pyrus Botryapium*. Lin. fil. —
Aronia Botryapium. Pers. — *Mespilus canadensis*. Lin.)

OSTEOMELES. LINDL. (1821)

- O. anthyllidifolia.** Lindl. — Ins Pacific.; Asia orient.
(*O. subrotunda*. C. Koch. — *Pyrus anthyllidifolia*. Sm.)

PERAPHYLLUM. NUTT. (1840)

- P. ramosissimum.** Nutt. — Oregon.

LII. — SAXIFRAGACEÆ

Trib. 1. — SAXIFRAGÆÆ.

ASTILBE. BUCH.-HAM. (1825)

- A. Thunbergii.** Miq. — Japon.

RODGERSIA. A. GRAY.

- R. podophylla.** A. Gray. — Japon; China.

SAXIFRAGA. LIN. (1753)

1. *Bergenia*. Benth. et Hook.
S. crassifolia. Lin. — Sibiria.
(*Megasea*. Haw.)
S. ligulata. Wall. — Reg. Himal.
(*Megasea ciliata*. Haw.)
2. *Porphyron*. Sternb.
S. oppositifolia. Lin. — Europ. alp.
3. *Aizoonia*. Sternb.
S. notata. Schott. — Europ. alp.
4. *Dactyloides*. Sternb.
S. cæspitosa. Lin. — Europ. alp.
5. *Arabidia*. Sternb.
S. stellaris. Lin. — Europ. alp.

9. *Hydaticea*. Sternb.

S. sarmentosa. Lin. — China; Japon.
(*S. stolonifera* Jacq.)

BOYKINIA. NUTT. (1834)

B. major. As. Gray. — California.

TIARELLA. LIN. (1753)

T. purpurea. Hort. Lemoine?

HEUCHERA. LIN. (1753)

H. sanguinea. Engelm. — Nov. Mexic.

Trib. 2. — **FRANCOEÆ**.

FRANCOA. CAV. (1801)

F. appendiculata. Cav. — Chili.

F. ramosa. D. Don. — Chili.

Trib. 3. — **HYDRANGEÆ**.

HYDRANGEA. GRONOV. ex LIN.

1. *Euhydrangea*. Maxim.

H. arborescens. Lin. — Amer. bor.-orient.

(*H. frutescens*. Mönch. — *H. vulgaris*. Mchx.)

H. radiata. Walt. — Amer. bor.-orient. (pars merid.).

(*H. nivea*. Mchx.)

H. quercifolia. Bartr. — Amer. bor. (pars merid.).

(*H. radiata*. Sm.)

H. paniculata. Sieb. — Japon.

Var. : grandiflora.

H. involucrata. Sieb. — Japon.

H. japonica. Sieb. — China; Japon.

(*H. opuloides*. Lamk.)

Var. : Hortensia.

(*Hortensia opuloides*. Lamk. — *Hortensia rosea*. Desf.)

Var. : Belzonii (cærulescens.)

" Otaksa.

(*H. Otaksa*. Sieb. et Zucc.)

Var. : cyanoclada (ramis pictis.)

" acuminata (roseo-alba.)

" stellata (fimbriata.)

(*H. stellata*. Sieb. et Zucc.)

Var. : tricolor.

2. *Calyptranthe*. Maxim.**H. scandens**. Poepp. — Japon.

(Cornidia integerrima. Hook. et Arn.)

SCHIZOPHRAGMA. SIEB. ET ZUCC. (1835)

S. hydrangeoides. Sieb. et Zucc. — Japonia.

DICHROA. LOUR. (1790)

D. febrifuga. Lour. — Reg. Himal; Malaya; China.

(Adamia cyanea. Wall.)

DEUTZIA. THUNB. (1781)

D. gracilis. Sieb. et Zucc. — Japon.

Var. : fol. varieg.

D. Sieboldiana. Maxim. — Japon.

(D. scabra. Sieb. et Zucc.)

D. crenata. Sieb. et Zucc. — Japon.

(D. scabra. Lindl.)

Var. : flore albo pleno.

flore purpureo pleno.

DECUMARIA. LIN. (1753)

D. barbara. Lin. — Amer. bor.-orient. (pars merid.).

(D. radicans. Mœnch. — D. sarmentosa. Bosc. — Forsythia scandens. Walt.)

PHILADELPHUS. LIN. (1762)

P. inodorus. Lin. — Amer. bor. (pars merid.).

(P. laxus. Lindl. — Syringa inodora. Mœnch.)

Var. : speciosissimus plenus.

P. mexicanus. Schldl. — Mexico.**P. coronarius**. Lin. — Reg. Cauc.; China; Japon; Reg. Him.

(Syringa suaveolens. Mœnch.)

Var. : primulaefolius.

" Satzumi.

(P. Satzumi. Sieb.)

P. microphyllus. As. Gray. — Nov. Mexic.; Colorado.**P. Gordonianus**. Lindl. — Amer. bor.-occid.

(P. oregonus. Nutt.)

P. Lewisii. Pursh. — Amer. bor.-occid.

(P. californicus. Benth.)

P. hirsutus. Nutt. — Amer. bor. (pars merid.).

(P. trinervius. Schrad. — P. gracilis. Lodd.)

CARDIANDRA. SIEB. ET ZUCC. (1835)

C. alternifolia. Sieb. et Zucc. — Japon.

JAMESIA. TORR. ET A. GRAY. (1840)

J. americana. Torr. et Gray. — Amer. bor.-occ. (p. merid.).

FENDLERIA. ENGELM. ET A. GRAY (1852)

F. rupicola. Englm. et Gray. — Amer. bor.-occ. (p. merid.).

CARPENTERIA. TORR. (1853)

C. californica. Torr. — California (Sierra Nevada.)

Trib. 4. — ESCALLONIEÆ.

ESCALLONIA. LIN. FIL. (1781)

E. rubra. Pers. — Chili alp.

(*E. mollis* Phill. — *E. glandulosa*, Lodd. — *Steroxylon rubrum*, R. et Pav.)

E. macrantha. Hook et Arn. — Chili austr. alpin.

E. illinita. Presl. — Chili alpin.

(*E. cupularis*, Gill. — *E. Mertensiana*, Rupr.)

E. pterocladon. Hook. — Patagonia occid.

E. Organensis. Gardn. — Brazil austr.

E. montevidensis. D.C. — Reg. arg.; Braz. aust.

(*E. bifida*, Link. — *E. floribunda*, Schlecht.)

E. virgata. Pers. — Amer. austr.

(*E. Phillipiana*, Englm.)

E. viscosa. Forbes. — Chili.

E. resinosa. Pers. — Peruvia.

(*E. multiflora*, Presl.)

BREXIA. NORONHA. EX THOU. (1806)

B. madagascariensis. Thon. — Madagascar.

(*Venana*, Lamk.)

CARPODETUS. FORST. (1776)

C. serratus. Forst. — Nova Zelandia.

ITEA. GRONOV. EX LIN. (1762)

I. virginica. Lin. — Amer. bor.-orient.

ANOPTERUS. LABILL. (1804)

A. glandulosa. Labill. — Tasmania.

Trib. 5. — CUNONIEÆ.

CALLICOMA. ANDR. (1809)

C. serratifolia. Andr. — Austr. orient.

ACROPHYLLUM. BENTH. (1840) IN MAUND

A. venosum. Benth. — Australia.

(*Calycomis verticillatum*. D. Don.)

Trib. 6. — RIBESIEÆ.

RIBES. LIN. (1753).

1. *Robsonia*. Berland.

R. speciosum. Pursh. — California; Columb. merid.

(*R. stamineum*. Sm. — *R. fuchsioïdes*. Moç. et Sess. — *Robsonia speciosa*. Spach.)

2. *Grossularia*. D.C.

R. subvestitum. Hook et Arn. — California.

R. Grossularia. Lin. — Europ.; Asia occid.; Afr. bor.

(*R. spinosum*. Lamk. — *R. caucasicum*. Adams. — *R. Uva crispa*. D.C. — *Grossularia hirsuta*. Mill.)

Var. : *Uva Crispa*.

(*Ribes Uva Crispa*. Lin.)

Var. : *reclinatum*.

(*Ribes reclinatum*. Mill.)

3. *Ribesia*. D.C.

R. bracteosum. Dougl. — Oregon.

R. nigrum. Lin. — Europ. med. et bor.-orient; Asia bor.

(*R. olitum*. Mœnch. — *Botryocarpum nigrum*. Rich.)

Var. : *albo-punctatum*.

R. sanguineum. Pursh. — Amer. bor. occid.

(*R. malvaceum*. Sm. — *R. glutinosum*. Benth. — *R. tubulosum*. Eschsch. — *Calobotrya*. Spach. — *Coreosma sanguinea*. Spach.)

Var. : *albidum*,

atro-rubens.

R. Gordonianum. Lem. — (Stirp. hybrida).

(*R. aureum*. × *R. sanguineum*.)

R. americanum. Mill. — Amer. bor.-orient. (p. sept. et med.).

(*R. floridum*. L'Herit. — *R. Dillenii*. Medik. — *R. pensylvanicum*. Lamk. — *Coreosma florida*. Spach.)

- R. lacustre.** Poir. — Amer. bor. (pars sept.).
 (*R. oxyacanthoides*. Mehx. — *R. echinatum*. Dougl.)
- R. prostratum.** L'Herit. — Amer. bor. (pars sept. et med.);
 Asia bor.-orient.
 (*R. glandulosum*. Ait. — *R. trifidum*. Mehx.)
- R. rubrum.** Lin. — Europ. bor. et med.; Reg. Caucas;
 Asia et Amer. bor.
 (*R. officinarum*. Dum. Cours.
 Var. : album.
- R. petræum.** Wulff. — Europ. media.; Asia bor.
 (*R. carpathicum*. Kit. — *R. callibotrys*. Wender.
- R. alpinum.** Lin. — Europa; Oriens; Reg. Caucas.; Asia
 bor.; Japon.
 (*R. dioticum*. Mönch)
 Var. : pumilum aureum.

Genera anomala :

BAUERA. BANKS. (1793)

- B. rubioides.** Andr. — Australia.

CEPHALOTUS. LABILL. (1806)

- C. follicularis.** Labill. — Australia.

Genus dubium :

CERCIDIPHYLLUM. SIEB. ET ZUCC. (1846)

- C. japonicum.** Maxim. — Japonia.

LIII. — CRASSULACEÆ

CRASSULA. DILL. EX LIN.

1. *Eucrassula*. Harv. et Sond.
- C. arborescens.** Willd. — Afr. aust.
 (*C. Cotyledon*. Curt. — *Cotyledon arborescens*. Mill.)
- C. lactea.** Ait. — Afr. aust.
- C. portulacea.** Lamk. — Afr. aust.
 (*C. obliqua*. Ait. — *Cotyledon ovata*. Mill.)
- C. falcata.** Willd. — Afr. aust.
 (*Rochea*. D.C. — *Larochea*. Hav. — *C. obliqua*. Andr.

- C. spathulata.** Thunb. — Afr. aust.
(*C. lucida*. Lamk.)
- C. lycopodioides.** Lamk. — Afr. aust.
(*C. imbricata*. Ait. — *C. muscosa*. Thunb. — *Tetraphyle lycopodioides*. Eckl. et Zey.)
- C. centauroides.** Lin. — Afric. austr.
(*C. pellucida*. Zey. — *C. minima*. Eckl. et Zey.)
- C. punctata.** Lin. — Afr. aust.
- C. Bolusii.** Hook. — Afr. aust.
- C. impressa.** R. E. Brown. — Afr. aust.
(*C. Smithii*. Rgl.)
2. *Pyramidella.* Harv. et Sond.
- C. multiceps.** Harv. — Afr. aust.
4. *Margarella.* Harv. et Sond.
- C. Cooperi.** Rgl. — Afr. aust.
6. *Globulea.* Harv. et Sond.
- C. cultrata.** Lin. — Afr. aust.
(*Globulea.* Harv.)
- C. canescens.** Schult. — Afr. aust.
(*Globulea.* Harv.)

ROCHEA. D.C. (18..)

- R. coccinea.** D.C. — Afr. aust.
(*Crassula.* Lin. — *Kalosanthes.* Harv.)
- R. jasminea.** D.C. — Afr. aust.
(*Crassula.* Lod. — *Kalosanthes.* Harv. — *Rochea microphylla.* E. Mey.)

BRIOPHYLLUM. SALISB. (1805)

- B. calycinum.** Salisb. — Ins. Maurit. ; Arch. Molucc.
(*Crassouvia floripendula.* Comm. — *Cotyledon pinnata.* Lamk. — *Kalanchoë calycina.* Pers.)

KALANCHOË. ADANS. (1763)

- K. glaucescens.** Britton. — Afr. trop.
- K. cassiopea.** Schweinf. — Abyssinia.
- K. integerrima.** Lange. — Afr. aust.

COTYLEDON. TOURN. EX LIN.

1. *Cotyledon.* D.C.
- C. orbiculata.** Lin. — Afr. aust.
(*C. crassifolia.* Eckl. et Zey.)
- C. coruscans.** Haw. Afr. aust.
(*C. rotundifolia.* Harv. — *C. unguolata.* Eckl. et Zey.)

- C. hemisphaerica.** Dill. ex Lin. — Afr. aust.
 (*C. rotundifolia*. Eckl. et Zey. — *C. rhombifolia*. Eckl. et Zey. —
C. triflora. Thunb.)
 Var. : *maculata minor*. (Salm Dyck.)
- C. macrantha.** Hort. — Afr. aust.
 2. *Umbilicus*. D.C.
- C. Semenowii.** Herd. — Asia med.
- C. chrysantha?** — Asia occid.
 (*Umbilicus*. Boiss.)
- C. spinosa.** Lin. — Asia bor.
 (*Umbilicus*. D.C.)
 4. *Echeverria* D.C.
- C. agavoides.** Baker. — Mexico.
 (*Echeveria*. Lem.)
- C. caespitosa.** Haw. — Amer. bor.-occid.
 (*Echeverria campanulata*. Kunze. — *Echeverria laxa*. Lindl.)
- C. coccinea.** Cav. — Mexico.
 (*Echeverria*. D.C.)
- C. gibbiflora.** Moç. et Sess. ex D.C. — Mexico.
 (*Echeverria*. D.C. — *E. grandiflora*. Harv. — *E. grandifolia*.
 Otto.)
- C. linguæfolia.** Lem. — Mexico.
 (*Echeverria*. Lem.)
- C. mucronata.** Baker. — Mexico.
 (*Echeverria*. Schlecht.)
- C. Pachyphytum.** Baker. — Mexico.
 (*Pachyphytum bracteosum*, Klotzsch. — *Echeverria clavifolia*.
 Deleuil.)
- C. pulverulenta.** Baker. — Mexico.
 (*Echeverria*. Nutt.)
- C. pubescens.** Baker. — Mexico.
 (*Echeverria*. Schlecht.)
- C. retusa.** Baker. — Mexico.
 (*Echeverria*. Lindl.)
 Var. : *major*.
 " *mirabilis*.
 " *minor*.
 " *glauca*.
- C. nuda.** Baker. — Mexico.
- C. secunda.** Baker. — Mexico.
 (*Echeverria*. Lindl.)
 Var. : *glauca*.
- C. Desmettiana?** . — Mexico.
 (*Echeverria*. Hook.)
- C. Scheideckeri.** — L. de Smet. — Mexico.

- C. discolor.** L. de Smet. — Mexico.
C. grandisepala. — (Stirps hybrid.).
 (*Echeverria*. Deleuil.)
C. imbricata. — (Stirps hybrid.).
 (*Echeverria*. Deleuil.)
C. scaphylla. — (Stirps hybrid.).
 (*Echeverria*. Deleuil.)
C. pachyphytioides. — (Stirps hybrid.).
 (*Echeverria*. L. de Smet.)
C. eminens?
 Var. : viridis.
C. magnifica?

SEDUM. LIN. (1753) EXTENS.

2. *Anacampseros*. Harv.

- S. Anacampseros.** Lin. — Europ. alpest.
 (*Anacampseros sempervirens*. Hawk.)
S. Telephium. Lin. — Europ. alpest.
 (*Anacampseros albida et rubra*. Harv.)
S. hybridum. Lin. — Sibiria ; Tartar.
S. oppositifolium. Sims. — Reg. Caucas.
 (*Anacampseros ciliaris*. Harv.)
S. Ewersii. Ledeb. — Sibiria.
S. sarmentosum. Bgl. — China bor..
S. Sieboldi. Sweet. — Japon.
 Var. : fol. variegatis.
S. spectabile. Boiss. — Oriens.
 Var. : fabarum.

3. *Eusedum*.

- S. altissimum.** Poir. — Europ. austr.
 (*Sempervivum sediforme*. Jacq.)
S. album. Lin. — Europ.; Asia min.; Afric. bor.
S. reflexum. Lin. — Europa.
 Var. : cristatum.
S. Lydium. Boiss. — Asia minor.

SEMPERVIVUM. LIN. (1753)

1. *Aichryson*. Webb.

- S. tortuosum.** Ait. — Ins. Canar.
S. villosum. Harv. — Ins. Canar.
 (*Æonium Lindleyi*. Webb.)

2. *Æonium*. Webb. et Berth

- S. arboreum.** Lin. — Penins. hisp.; Africa bor.; Oriens.
 Var. : atropurpurea.

- S. urbicum.** Horn. — Ins. Canar.
S. barbatum. C. Smith. — Ins. Canar.
 (*S. spathulatum.* Horn.)
S. glandulosum. Ait. — Ins. Canar.
S. tabulæforme. Harv. — Ins. Madeira.
 3. *Eusempervivum* (*Greenovia.* Webb.).
S. decorum. Webb. — Ins. Canar.
S. tectorum. Lin. — Europa.
 Var. : minus.
S. arachnoideum. — Europ. alp.
S. fimbriatum. Lehn. — Europ. alp.
S. soboliferum. Sims. — Europ. alp.
S. arenarium. K. Koch. — Tyrol.
S. tomentosum. Schn. — Europ. alp.
S. Moogridgei. Hook. — Europ. aust. alp.

MONANTHES. HARV. (1821)

- M. atlantica.** Ball. — Moghreb.; Ins. Canar.
 (*Petrophytes muralis.* Webb.)
-

LIV. — DROSERACEÆ

DROSERA. LIN. (1753)

1. *Rorella.* D.C.
D. spathulata. Labill. — Austr. orient.; Tasmania.
 2. *Ergaleum.* D.C.
D. binata. Labill. — Tasmania; Nov. Zelandia.
 (*D. dichotoma.* Banks et Soland.

DIONÆA. ELLIS. (1770)

- D. muscipula.** L. Mant. — Am. bor.-orient. (pars merid.).
 (*Drosera uniflora.* Raf.)
-

LV. — HAMAMELIDEÆ

PARROTIA. C. A. MEY (1831)

- P. persica.** C. A. Mey. — Persia.
 (*Hamamelis.* D.C.)

FOTHERGILLA. LIN. FIL. (1781)

F. alnifolia. Lin. fil. — Amer. bor.-orient. (pars med.).

CORYLOPSIS. SIEB. ET ZUCC. (1835)

C. spicata. Sieb. et Zucc. — Japon.

C. pauciflora. Sieb. et Zucc. — Japon.

HAMAMELIS. GRONOV. EX LIN.

H. virginica. Lin. — Amer. bor.

H. japonica. Sieb et Zucc. — Japon.

Var. : Zuccariniana.

H. arborea. Masters. — Japon.

(*H. japonica*. Hook. fil.)

LOROPETALUM. R. BR. (1818)

L. chinense. R. Br. — China.

(*Hamamelis*. R. Br.)

BUCKLANDIA. R. BR. (1832)

B. populnea. R. Br. — Reg. Himal.

LIQUIDAMBAR. LIN. (1753)

L. styraciflua. Lin. — Amer. bor.-orient.

L. orientalis. Mill. — Asia minor.

(*Platanus*. Pococke)

LVI. — BRUNIACEÆ

AUDOUINIA. BROGN. (1826)

A. capitata. Brogn. — Afr. aust.

(*Diosma*. Thunb.)

LVII. — HALORAGÆ

GUNNERA. L MANT. (1767)

G. chilensis. Lamk. — Chili.

(*G. scabra*. R. et Pav.)

LVIII. — MYRTACEÆ

Trib. 1. — CHAMÆLAUCIÆ.

DARWYNIA. RUDGE. (1813)

1. *Genetyllis*. Benth.**D. macrostegia**. Benth. — Austr. orient.*(Genetyllis tulipifera*. Hook. — *Hedaroma*. Lindl.)**D. fimbriata**. Benth. — Australia.*(Genetyllis*. Kipp. — *Hedaroma*. Baines.)

Trib. 2. — LEPTOSPERMEÆ.

BÆCKEA. LIN. (1753)

6. *Babingtonia*. Benth.**B. Camphorosmæ**. Endl. — Austr. occid.*(Babingtonia*. Lindl. — *Leptospermum imbricatum*. Sm.)

HYPOCALYMNA. ENDL. (1840)

H. robustum. Schaur. — Austr. occid.*(Leptospermum*. Endl.)

LEPTOSPERMUM. FORST. (1776)

1. *Fabricia*. Benth.**L. pubescens**. Lamk. — Australia.*(L. australe*. et *L. glaucescens*. Salisb. — *L. Cunninghamii*. Schaur. — *L. grandifolium* et *L. lanigerum*. Sm. — *L. nitidum*. Hook. — *L. ovalifolium*. Sweet. — *Fabricia incana*. Dum-Cours. — *Fabricia cœricea*. Sweet. — *Melaleuca trinervia*. White. — *Philadelphus laniger*. Ait.)**L. lævigatum**. F. Muell. — Austr. austro-orient. ; Tasman.*(Fabricia*. Gært. — *Fabricia corriacea*. F. Muell.)2. *Euleptospermum*. Benth.**L. stellatum**. Carv. — Austr. orient.*(L. sericatum*. Lindl.)**L. scoparium**. Forst. — Austral. ; Nova Zeland.*(L. floribundum*. Salisb. — *L. juniperifolium*. Cav. — *L. lini-folium*. Dum Cours. — *L. macrocarpum*. A. Cunn. — *L. persicæfolium*. Reichb. — *L. divaricatum* et *L. Oxycedrus*. Schaur. — *L. squarosum*. Gært. — *Melaleuca scoparia*. Wendl. — *Philadelphus scoparius*. Ait.)

KUNZEA. REICHB. (1828)

K. corifolia. Reichb. — Austral.

(*Metrosideros*. Vent. — *Leptospermum ambiguum*. Sm.)

CALLISTEMON. R. BR. (1814)

C. pinnifolius. Sweet. — Austral.

(*C. acerosus*. Tausch. — *Metrosideros pinnifolius*. Wendl. — *Metrosideros viridiflora*. Cels.)

C. salignus. Sweet et D.C. — Austral.

(*C. viridiflorum*. Sweet. — *C. pallidus*. D.C. — *Metrisideros salignus*. Sm.)

C. lanceolatus. Sweet. — Austral. austro-orient.

(*C. marginatus*. Sweet. — *C. scaber*. Lodd. — *Metrosideros citrina*. Curt. — *Metrosideros lophanta*. Vent. — *Metrosideros lanceolata*. Sm. — *Metrosideros marginata*. Carv. — *Metrosideros longifolia*. Dum-Cours. — *Metrosideros myrtifolia*. Hoffmg. — *Metrosideros rugulosa*. Sieber. — *Metrosideros semperflorens*. Lodd.)

C. speciosus. D.C. — Austral. austro-orient.

(*C. glaucus*. Sweet. — *Melaleuca palludosa*. R. Br. — *Metrosideros glauca*. Bonpl. — *Metrosideros speciosus*. Sims.)

C. brachyandrus. Lindl. — Austral.

(*C. acerosus*. Miq. — *C. arborescens*. F. Muell.)

MELALEUCA. L. MANT. (1767)

M. styphelioides. Sm. — Austral. austro-orient.

M. diosmifolia. R. Br. — Austral.

(*M. chlorantha*. Bonpl. — *M. foliosa*. Dum-Cours.)

M. nodosa. Sm. — Austral. oriental.

(*M. tenuifolia*. D.C. — *Metrosideros nodosa*. Gærtn. — *Metrosideros pungens*. Reichb.)

M. ericifolia. Sm. — Austr. austro-orientalis.

(*M. erubescens*. Otto. — *M. Gunniana*. Schaur. — *M. heliophylla*. F. Muell. — *M. nodosa*. Link. — *Metrosideros armillaris*. Cav.)

M. armillaris. Sm. — Austral. austro-orient.

(*M. cylindrica*. R. Br. — *Metrosideros armillaris*. Soland.)

M. thymifolia. Sm. — Austr. austro-orient.

(*M. coronata*. Andr. — *M. calycina*. Steud. — *M. discolor*. Reichb. — *M. ambriato*. Donn. — *M. gnidiæfolia*. Vent. — *M. parvifolia*. Otto. — *Metrosideros calycina*. Carv. — *Metrosideros gracilis*. Salisb.)

M. decussata. R. Br. — Austral. orient.

(*M. oligantha*. F. Muell. — *M. parviflora*. Reichb. — *M. pumila*. Otto. — *M. tetragona*. Lodd.)

M. linarifolia. Sm. — Austral. austro-orient.

(*M. trichostachya*. Lindl. — *Metrosideros hyssopifolia*. Cav.)

M. Preissiana. Schaur. — Austral.

(*M. pubescens*. Schaur. — *M. curvifolia*. Schlecht. — *M. parviflora*. Lindl.)

M. hypericifolia. Sm. — Austral. austro-orient.

(*Metrosideros*. Salisb.)

BEAUFORTIA. R. BR. (1812)

B. sparsa. R. Br. — Austral. austro-occident.

(*B. splendens*. Baxter.)

B. purpurea. Lindl. — Austral. merid.

CALOTHAMNUS. LABILL. (1806)

C. pinnifolius. F. Muell. — Austral.

C. sanguineus. Labill. — Austr. occid.

(*C. eriocarpus*. Lindl.)

EUCALYPTUS. L'HERIT. (1788)

Sect. 1. Naud.

A.

E. rostrata. Schlecht. — Austr. orient.

(*E. acuminata*. Hook. — *E. longirostris*. F. Muell.)

B.

E. glauca. D.C. Austral.

(*E. perfoliata*. Nois. — *E. pulverulenta*. Link.)

E. globulus. Labill. — Austral. merid.; Tasmania.

E. viminalis. Labill. — Tasmania.

(*E. diversifolia*. Bonpl. — *E. fabrorum*. Schlecht. — *E. granularis*. Sieber. — *E. Gunnii*. Miq. — *E. mannifera*. A. Cunn. — *E. persicifolia*. Loud. — *E. pillularis*. D.C.)

E. leucoxydon. F. Muell. — Austr. austr.-occid.

(*E. sideroxydon*. Dum. Cours.)

E. coccifera. Hook. fl. — Tasmania.

(*E. daphnoides*. Miq.)

E. Gunnii. Hook. — Tasmania.

(*E. ligustrina*. Miq.)

E. amygdalina. Labill. — Tasman.

(*E. ambigua*, *E. ligustrina* et *E. Lindleyana*. D.C. — *E. hypericifolia*. R. Br. — *E. longifolia*. Lindl. — *E. nitida*. Hook. — *E. tenuiramis*. Miq. — *E. radiata*. Sieber. — *Metrosideros salicifolia*. Gœrtn.)

E. diversicolor. F. Muell. — Austral.

E. resinifera. Sm. — Austral.
 (*Melaleuca gummifera*. Steud.)
 Sect. 2. *Naud.*

E. citriodora. Hook. — Austral merid.

E. polyanthema. Schaur. — Austral.
 (*E. Baueriana*. Schaur.)

TRISTANIA. R. BR. (1812)

1. *Neriophyllum*. Benth.

T. nerifolia. R. Br. — Austral. austro-orient.
 (*Melaleuca*. Sims. — *Melaleuca salicifolia*. Andr.)

2. *Lophostemon*. Benth.

T. conferta. R. Br. — Austral. austro-occident.
 (*Lophostemon*. Schott. — *Melaleuca*. Steud.)

SYNCARPIA. TEN. ()

S. laurifolia. — Austral. orient.

(*Kamptzia albens*. Nees. — *Metrosideros glomulifera*. Sm. —
Metrosideros procera et *Metrocideros propinqua*. Salisb.)

METROSIDEROS. BANKS. (1788) EX GÆRTN.

M. florida. Sm. — Nov. Zelandia.

(*Melaleuca*. Forst. — *Melaleuca scandens* et *Mel. spectabilis*.
 Rausch. — *Leptospermum scandens*. Forst.)

M. angustifolia. Sm. — Afric. aust.

(*Myrtus*. L. Mant. — *Leptospermum salicifolium*. Lamk.)

M. umbellata. Cav. — Nov. Zelandia.

(*M. lucida*. A. Rich. — *Melaleuca umbellata*. Rausch.)

M. robusta. A. Cunn. — Nov. Zelandia.

Var. : fol. varieg.

Trib. 3. — MYRTEÆ.

PSIDIUM. LIN. (1753)

P. Cattleyanum. Sabine. — Brazil.

(*P. coriaceum*. Mark.)

MYRTUS. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Ugni*. Benth.

M. Ugni. Molina. — Chili austr.

(*Eugenia*. Hook. et Arn.)

2. *Eumyrtus*. Benth.**M. communis**. Lin. — Europ. austral.; Oriens.

(*M. acuminata*, *M. belgica*, *M. minima* et *M. tarentina*. Mill.
— *M. littoralis*. Salisb. — *M. buxifolia*. Raf. — *M. lusitana*. Willd. — *M. macrophylla*. Ehrb. — *M. romana*. Hoffmsg.)

3. *Leantria*. As. Gray.**M. bullata**. Poepp. — Chili.

(Myrteola. Berg.)

M. myrsinoides. — H. B. et K. — Peruvia.(Myrteola. Berg. — *Chuacena*. Raf.)

PIMENTA. LINDL. (1824)

P. officinalis. Lindl. — Ind. occid.

(*Myrtus Pimenta*. Lin. — *M. aromatica*. Salisb. — *Caryophyllus Pimenta*. Mill. — *Eugenia Pimenta*. D.C.)

EUGENIA. MICHEL. ex LIN.

1. *Jambosa*. Benth.**E. Jambos**. Lin. — Asia trop.

(*E. decora*. Salisb. — *E. malaccensis*. Blanco. — *Jambosa vulgaris*. D.C. — *Myrtus Jambos*. H. B. et K. — *Caryophyllus Jambos*. Stokes.)

E. myrtifolia. Sims. — Australia.

(*E. australis*. Wendl. — *E. oleina*. Wight. — *Jambosa australis* D.C. — *Jambosa myrtifolia*. Hayne. — *Jambosa Thozetiana*. F. Muelle. — *Myrtus australis*. Spreng.)

2. *Sizygium*. Benth.**E. ?** — Nova Zeland.

(Acmaena ovata. Nichols.)

3. *Eueugenia*. Wight.**E. apiculata**. D.C. — Chili.(E. Luma. Berg. — *Myrtus Luma*. Molina.)**E. costaricensis**. Berg. — Costarica.**E. capparidifolia**. D.C. — Brazil.(E. firma. D.C. — *E. robusta*. Berg.)**E. cotinifolia**. Lamk. — Ins. Maurit.

(*E. elliptica*, *E. lucida* et *E. orbiculata*. Lamk. — *E. hypoleuca*. Thw. — *Jossinia tinifolia*, *J. elliptica*, *J. orbiculata* et *J. mespiloides*. D.C. — *Jossinia cordifolia* et *J. lanceolata*. Berg. — *Myrtus Commersonii*, *Myrtus cotinifolia*, *M. elliptica*, *M. orbiculata* et *M. mespiloides*. Spreng. — *Myrtus lucida*. Steud. — *Myrtus mucronata*. Pers.)

LIX. — MELASTOMACEÆ

Trib. 2. — TIBOUCHINEÆ.

HEERIA. SCHLECHT. (1839)

2. *Heterocentrum*. Triana.

H. rosea. Triana. — Mexico.

(*Heterocentrum mexicanum*. Naud. — *Heterocentrum roseum*.
A. Br. et Bouché.)

TIBOUCHINA. AUBL.

3. *Pleroma*. Cogn.

T. semidecandra. Cogn. — Braz. aust.

(*Pleroma*. Triana. — *Pl. macranthum*. Hook. — *Lasiandra*
macrantha. Linden et Seem.)

T. laxa. Cogn. — Peruvia; Ecuador.

(*Pleroma sarmentosum*. Hook. — *Pleroma laxum*. D.C. —
Lasiandra sarmentosa. Naud. — *Melastoma laxa*. Desr.)

Trib. 4. — RHEXIEÆ.

RHEXIA. LIN. (1753)

R. virginica. Lin. — Amer. bor. (pars mer.).

MONOCHÆTUM. NAUD. (1841)

M. Bonplandii. Naud. — Amer. trop.

(*M. sericeum*. Naud. et Lind.)

Var. : multiflorum.

(*An stirps hybrida* ?)

Trib. 6. — OXYSPOREÆ.

BREDIA. BL. (1849)

B. hirsuta. Bl. — Japon; Ins. Formose.

LX. — LYTHRARIÆ

Trib. 2. — LYTHREÆ.

CUPHEA. P. BROWNE (1756)

C. micropetala. H. B. et K. — Mexico.

(*C. jorullensis*. Hook. — *C. eminens*. Lindl. et Planch. —
C. ciliata. Link.)

C. ignea. D.C. — Mexico.

(*C. platycentra*. Lem.)

C. Llavea. Lex. — Mexico.

(*C. miniata*. A. Brogn. — *C. barbiger*a. Hook. et Arn. — *Endecaria coccinea*. Raf.)

C. cyanea. Moq. et Sess. — Mexico.

(*C. strigulosa*. Lem. — *C. Galleotii*. Hort. Ber.)

C. Hookeriana. Walp. — Mexico.

(*C. Ræzlii*. Carr. — *C. floribunda*. Hook. et Arn. — *C. fulgens*. Fenzl.)

C. Hillfieldiana ?

NESÆA. COMM. EX JUSS. (1789)

N. salicifolia. H. B. et K. — Amer. trop.

(*Heimia*. Link. et Otto. — *Heimia grandiflora*. Hook.)

LAGERSTRÆMIA. LIN. (1753)

L. indica. Lin. — As. or. trop. et subtrop.

Var. : violacea.

Genus anomalum.

PUNICA. (TOURN.) LIN. (1753)

P. Granatum. Lin. — Afr. bor.; Oriens; India.

Variet. hortens.

LXI. — ONAGRARIÆ

EPILOBIUM. DILL. EX LIN. (1753)

E. Dodonæi. Vill. — Europa.

(*E. Fleischeri*. Höchst.)

FUCHSIA. (PLUM.) LIN. (1753)

1. *Euccliandra*. Zucc.

F. microphylla. H. B. et K. — Mexico.

(*F. gracilis*. Moc. et Sess. — *Brebissonia microphylla*. Spach. — *Myrinia*. Lilja)

2. *Fuchsia*. Endl.

F. arborescens. Sims. — Mexico.

Var. : syringæflora.

(*F. paniculata*. Lindl.)

F. macrostemma. R. et Pav. — Chili; Fuegia.

(*F. coccinea*. Curt. — *F. conica* et *F. discolor*. Lindl. — *F. decussata*. R. Grah. — *F. multiflora*. Murr. — *F. pendula*. Salisb — *F. recurvata*. Niven.)

Var. : *gracilis*.

(*F. gracilis*. Lindl.)

Var. : fol. variegat.

" *Riccartoni*.

F. globosa. Lindl. — Mexico.**F. venusta.** H. B. et K. — Nov. Granad.**F. triphylla.** Lin. — Peruvia.**F. fulgens.** Moç. et Sess. — Mexico.

(*Ellobium*. Lilja.)

F. corymbiflora. R. et Pav. — Peruvia.

(*F. corymbosa*. Pritz.)

Variet. *hortens*.

F. serratifolia. R. et Pav. — Peruvia.**F. Boliviana.** Carr. — Bolivia.

3. *Skinnera*. Endl.

F. procumbens. R. Cunn. — Nov. Zelandia.

LOPEZIA. CAV. (1791)

L. miniata. D.C. — Mexico.

(*L. frutescens*. Roem. et Schult. — *L. fruticosa*. Schrank)

LXII. — PASSIFLORACEÆ.

Trib. 2. — PASSIFLOREÆ.

PASSIFLORA. LIN. (1753)

5. *Decaloba*. D. C.

P. Raddiana. D.C. — Brazil.

(*P. kermesina*. Link. et Otto. — *Decaloba dentata*. M. Roem. — *Decaloba kermesina*. M. Roem.)

7. *Granadilla*. D.C.

P. alata. Dryand. — Peruvia.

(*P. angulata*. Sweet. — *P. Brasiliana*. Desf. — *P. citrifolia*. Salisb. — *P. latifolia*. D.C. — *P. mascarensis*. Presl. — *P. mauritiana*. Thou. — *P. oviformis*. M. Roem. — *P. phænicea*. Lindl. — *P. tetradenia*. Vaud.)

P. cærulea. Lin. — Brazil; Peruvia.

(*P. Mayana*. Veitch. — *P. stenophylla*. Hoffmsg.)

Variet. *hortens*.

9. *Disemma*. D.C.**P. Banksii**. Benth. — Austr. tropic.*(P. coccinea*. Soland. — *Disemma coccinea*. Benth.)

TACSONIA. JUSS. (1789)

T. mollissima. H. B. et K. — Nov. Granad.*(Murucuja mollissima*. Spreng.)**T. van Volxemi**. Lem. — Nov. Granad.*(Passiflora Antioquiensis*. Karst. — *Passiflora van Volxemi*.
Triana et Planch.)**T. manicata**. Juss. — Peruvia.*(Passiflora*. Pers. — *P. chilensis*. Miers. — *P. pinnatifolia*.
Molina. — *P. pinnatistipula*. Cav. — *P. pennipes*. M. Rœm.)**T. pinnatistipula**. Juss. — Chili.*(Passiflora tomentosa*. Cav. — *Passiflora tillæfolia*. Molina.)

LXIII. — CUCURBITACEÆ

Trib. 1. — CUCUMERINEÆ.

BRYONOPSIS. ARN. (1841)

B. laciniosa. Naud. — Asia, Afr. et Austr. tropic.*(Bryonia palmata*. Lin.)

MELOTHRIA. LIN. (1753)

1. *Eumelothria*. Cogn.**M. punctata**. Cogn. — Africa austr.; India.*(Pilogyne suavis*. Schrad.)

LXVI. — BEGONIACEÆ

BEGONIA. (TOURN.) LIN. (1753)

Ser. 2. Diploclinium. Wight.**B. tuberosa**. Lamb. — Ins. Molucc.*Variet. hybrid. plurim.**Ser. 4. Benth. et Hook.***B. incarnata**. Link. et Otto. — Mexico.*(B. subpeltata*. Reg. — *B. insignis*. R. Grah. — *B. Martiana*.
Schlecht. — *B. papillosa*. R. Grah. — *Knesebeckia*. Kl.)*Var. : metallica.*

- B. rex.** Putz. — India transgang; Reg. Himal.
(*Platycentrum*. Kl.)
Variet. hort. plur.
- B. gracilis.** H. B. et K. — Mexico.
(*Knesebeckia*. Kl.)
- B. Griffithii.** Hook. — Reg. Himal.
(*Platycentrum*. Kl.)
Ser. 5. Benth. et Hook.
- B. Olbia.** Kerch. — Brazil.
- B. Scharfii.** Hook. — Brazil austr.
- B. maculata.** Raddi. — Brazil.
(*B. argyrostigma*. Fissch. — *B. aculeata*. Walp. — *Gaerdia*. Kl.)
Var. : corallina.
- B. fuchsioïdes.** Hook. — Mexico.
(*B. miniata*. Planch. et Lindl. — *Tittelbachia*. Kl.)
- B. scandens.** Sw. — Amer. austr.
(*B. lucida*. Otto et Dietr. — *B. elliptica*. H. B. et K. —
B. Montziana. Kunth. et Bouché. — *B. populifolia*. Schott.
Wageneria. Kl.)
- B. semperflorens.** Link et Otto. — Brazil.
(*B. cucullifolia*. Hassk — *B. Sellowii* Kl.)
Var. : atropurpurea
et altæ variet. hort.
- B. Ascottiensis.** J. B. Web. — Hab. ?
(*Tittelbachia*. Kl.)
- B. heracleifolia.** Cham. et Schlecht. — Mexico.
(*B. punctata*. Kl. — *Gireondia*. Kl.)
- B. rubella.** Buch.-Hamil. — Nepalia.
- B. Dregei.** Otto et Dietz. — Braz.; Afr. aust.
(*B. parvifolia*. Grah. — *B. sinuata*. R. Grah. — *Augustia Dregei*. Kl.)

LXV. — CACTEÆ

Trib. 1. — ECHINOCACTEÆ.

MAMILLARIA. HAW. (1812)

1. *Eumamillaria. Engelm.*
- M. crassispina.** Pfeiff. — Mexico.
(*M. floccigera*. Otto.)
- M. Schelhasei.** Pfeiff. — Mexico.
- M. micromeris.** Engelm. — Texas.

M. longiseta. Mühlpf. — Mexico.

M. rhodantha. Link et Otto. — Mexico.

(*M. sulphurea*. Forst. — *M. ruficeps*. Lem. — *M. Pfeifferi*.
Booth.)

M. centricirrha. Lem. — Mexico.

3. *Anhalonium*. Engelm.

M. fissurata. Engelm. — Mexico.

(*Anhalonium Engelmanni*. Lem.)

PELECYPHORA. EHRENB. (1843)

P. aselliformis. Ehrenb. — Mexico.

ECHINOCACTUS. LINK. ET OTTO (1827)

2. *Microgoni*. Salm-Dyck.

E. denudatus. Link. et Otto. — Mexico.

(*Gymnocalycium*. Pfeiff.)

3. *Hybogoni*. Salm-Dyck.

E. hexaëdrophorus. Lem. — Mexico.

4. *Theloidei*. Salm-Dyck.

E. ingens. Zucc. — Mexico.

5. *Uncinati*. Salm-Dyck.

E. cornigerus. D.C. — Amer. centr.

(*E. platyacanthus*. Link. et Otto. — *Cactus latispinus*. Haw.)

E. myriostigma. Salm-Dyck. — Mexico.

(*Astrophytum*. Lem.)

E. corynodes. Otto. — Reg. Argent.

(*Malacoparpus*. Salm-Dyck.)

CEREUS. MILL. (1768)

1. *Echinocereus*. Engelm.

C. procumbens. Engelm. — Mexico.

C. caespitosus. Engelm. — Arkansas.

2. *Eucereus*. Engelm.

C. lætus. D.C. — Americ. tropic.

C. chiloënsis. Colla. — Chili.

C. peruvianus. Mill. — Peruvia.

(*Cactus*. Lin.)

Var. : *monstruosus*.

C. serpentinus. Lagasc. — Mexico.

C. flagelliformis. Mill. — Amer. austr.

C. grandiflorus. Mill. — Ind. occid.

C. nycticalus. Link. — Mexico.

C. compressus. Mill. — Mexico; Ind. occid.

(*C. triangularis*. Harv.)

C. rostratus. Lem. — Mexico.

C. speciosissimus. D.C. — Mexico.

(*Cactus speciosus*. Cav.)

4. *Pilocereus*. Engelm.

C. virens. D.C. — Mexico.

(*Pilocereus Houlettianus*. Lem.)

C. senilis. Salm-Dyck. — Mexico.

5. *Echinopsis*. Benth. et Hook.

C. multiplex. Hort. Berol. — Brazil. austr.

(*Echinopsis*. Zucc.)

C. Eyriesii. Hort. Berol. — Reg. Argent.

(*Echinopsis*. Zucc.)

PHYLLOCACTUS. LINK. (1831)

P. Gärtneri. K. Schum. — Brazil. austr.

P. Phyllanthus. Link. et Walp. — Amer. trop

(*Epiphyllum*. Haw.)

P. Ackermannii. Salm-Dyck. — Mexico.

(*Epiphyllum*. Haw.)

EPIPHYLLUM. PFEIFF. (1837)

E. truncatum. Harv. — Brazil.

(*E. Bridgesii*. Lem. — *E. Smithianum*. Marnock.)

E. Russellianum. Hook. — Brazil.

Trib. 2. — OPUNTIEÆ.

RHIPSALIS. GÆRTN.

1. *Eurhypsalis*. Benth. et Hook.

R. stricta. Salm-Dyck. — Brazil.

2. *Lepismium*. Endl.

R. Knightii. Pfeiff. — Brazil.

(*Lepismium*. Pfeiff.)

OPUNTIA. TOURN. EX MILL (1752)

O. cylindrica. D.C. — Peruvia.

(*Cactus*. Lamk. — *Cereus*. Haw.)

O. Tuna. Mill. — Amer. austr.

(*O. horrida*. Salm-Dyck.)

O. Ficus-Indica. Haw. — Amer. austr.

(*Cactus*. Lin.)

O. humilis. Haw. — Mexico.

- O. aurantiaca.** Lindl. — Chili.
O. basilaris. Engelm. — Amer. bor.-occid. (California).
O. comanchica. Engelm. — Arkansas.
O. Raffinesquii. Engelm. — Amer. bor.-occid.
 Var. : *arkansana* (*arizonica*).
O. leucotricha. D.C. — Mexico.
O. microdasys. Pfeiff. — Mexico.
O. candelabriformis. Hort. Monac. ex Pfeiff. — Mexico.
O. armata. Hort. Hanbur. — Hab. ?
 Var. : *argentea*.

PERESKIA. PLUM. EX LIN.

- P. subulata.** Muhlpf. — Chili.

LXVI. — FICOIDEÆ

Trib. 1. — MESEMBRYANTHEMÆ.

MESEMBRYANTHEMUM. LIN. (1753)

2. *Triquetra.* Sond.

- M. tigrinum.** Haw. — Afric. austral.
 (*M. ringens.* Thunb.)
M. lupinum. Haw. — Afric. austral.
M. acinaciforme. Lin. — Afric. austral.
 (*M. lavigatum.* Haw. — *M. rubrocinctum.* Eckl. et Zey. —
 M. subullatum. Harv.)
M. edule. Lin. — Afric. austral.
 (*M. acinaciforme.* Eckl. et Zey.)
M. aurantiacum. Haw. — Afric. austral.
 (*M. verruculatum* et *M. glaucum.* Thunb. — *M. aurantium.*
 Willd. — *M. glaucoides.* Haw.)
M. blandum. Haw. — Afric. austral.
M. caulescens. Mill. — Afric. austral.
M. deltoïdes. Mill. — Afric. austral.
M. muricatum. Haw. — Afric. austral.
 (*M. deltoïdes.* Lin.)

3. *Perfoliata.* Sond.

- M. perfoliatum.** Haw. — Afric. austral.
 (*M. monacanthum.* D.C.)

4. *Teretiuscula.* Sond.

- M. tetragonum.** Thunb. — Afric. austral.

M. coccineum. Haw. — Afric. austral.

(*M. bicolorum*. Curt. — *M. tenuifolium*. Eckl. et Zey.)

5. *Papillosa*. Sond.

M. Ecklonis. Salm-Dyck. — Afric. austral.

(*M. lanceum*. et *M. villosum*. Eckl. et Zey.)

M. calycinum. Haw. — Afric. austral.

(*M. hispidum*. Thunb.)

M. floribundum. Haw. — Afric. austral.

(*M. tuberculatum*. Eckl. et Zey. — *M. torquatum* et *M. purpureum*. Harv. — *M. hispidum*, var. *pallidum*. Willd.)

M. barbatum. Lin. — Afric. austral.

(*M. stelligerum*. Haw.)

6. *Planifolia*. Sond.

M. cordifolium. Lin. fil. — Afric. austral.

Var. : fol. varieg.

LXVII. — UMBELLIFERÆ

Trib. 3. — SANICULÆ.

ERYNGIUM. (TOURN.) LIN. (1753)

E. alpinum. Lin. — Europ. alp.

E. Serra. Cham. et Schlecht. — Brazil.

(*E. platyphyllum*. Dene. — *E. serratum*. St-Lag.)

E. bromeliæfolium. De Lar. — Mexico.

E. Billardieri. De Lar. — Asia occid.

(*E. Kotschyi*. Boiss. — *E. cœrulescens*. Jacq.)

E. agavifolium. Griseb. — Reg. Argentina.

Trib. 5. — AMMINEÆ.

MOLOPOSPERMUM. K. KOCH. (1824)

M. cicutarium. D.C. — Europ.

(*M. peloponesiacum*. Koch.)

BUPLEVRUM. (TOURN.) LIN. (1753)

B. fruticosum. Lin. — Reg. mediter.

HETEROMORPHA. CHAM. ET SCHLECHT. (1826)

H. arborescens. Cham. et Schlecht. — Afr. aust.

(*Buplevrum*. Lin. — *Tenoria*. Zeyh.)

Trib. 6. — SESELINEÆ.

PORTENSCHLAGIA. VIS. FL. (1849)

P. ramosissima. Vis. — Dalmatia.

LIGUSTICUM. LIN. (1753)

L. mutellina. Crantz. — Europa austr. et or.
(*Meum*. Gærtn.)

ACIPHYLLA. FORST. (1776)

A. Lyallii. Hook. fil. — Nov. Zelandia.

LXVIII. — ARALIACEÆ

Trib. 1. — ARALIEÆ.

ARALIA TOURN. EX LIN.

1. *Ginseng*. Dcne. et Planch.**A. cashmerica.** Dcne. — Reg. Himal.2. *Euaralia*. Dcne. et Planch.**A. chinensis.** Lin. — China.Var. : *elata*.(A. *mandshurica*. Rupr. et Maxim. — *Dimorphantus elatus*. Miq.
— *Dimorphantus mandshuricus*. Maxim.)**A. quinquefolia.** Dcne et Planch. — Amer. bor.

(Panax. Lin.)

A. Veitchii. Hort. ex T. Moore. — Hab. ?

Trib. 2. — PANACEÆ.

PANAX. LIN. (1753)

P. sessiliflorum. Rupr. et Maxim. — China bor.; Reg. amur.

(Acanthopanax. Seem.)

ACANTHOPANAX. DCNE. ET PLANCH. (1854)

A. spinosum. Miq. — Japon ; China.(Aralia *pentaphylla*. Thunb.)**A. ricinifolium.** Dcne. et Planch. — Asia orient.(Panax. Sieb. et Zucc. — *Aralia Maximowiczii*. van Houtte.)

- A. aculeatum.** Seem. — China ; Asia subtrop.
(*Aralia trifoliata*. Meyen. — *Panax aculeatum*. Dryand.)

FATSIA. DCNE. ET PLANCH. (1854)

- F. japonica.** Dcne et Planch. — Japonia.
(*Aralia*. Thunb.)
Var. : Sieboldii.

- F. papyrifera.** Benth. et Hook. — China.
(*Aralia*. Hook. — *Tetrapanax*. K. Koch.)

MERYTA. FORST. (1776)

- M. latifolia.** Seem. — Ins. Norfolk.
(*Botryodendron*. Endl.)

SCHEFFLERA. FORST. (17)

- S. digitata.** Forst. — Nova Zelandia.
(*Aralia Schefflera*. Spreng.)

POLYSCIAS. FORST. (1775)

- P. nodosa.** Seem. — Malaya.
(*Aralia umbraculifera*. Roxb. — *Eupteron nodosum*. Miq.)

PSEUDOPANAX. K. KOCH. (1859)

- P. crassifolium.** K. Koch. — Nova Zelandia.
(*Aralia*. Soland. ex A. Cunn. — *Panax*. Dcne. et Planch.)
Var. : integrifolia.
heterophylla.
Enckei.
spathulata.

ELEUTHEROCOCCUS. MAXIM. (1859)

- E. senticosus.** Maxim. — Mandshuria.

TREVESIA. VIS. ()

- T. palmata.** Vis. — Ind. orient.
(*Gastonia*. Roxb.)

Trib. 4. — HEDEREÆ.

OREOPANAX. DCNE ET PLANCH (1854)

- O. floribundum.** Dcne et Planch. — Nov. Granat.
(*Aralia*. H. B. et K. — *Aralia Humboldtiana*. Roem. et Schult.)

O. capitatum. Dene. et Planch. — Amer. aust.

(*O. catalpæfolium* Dene. et Planch. — *O. destructor*. Seem. —
Aralia capitata. Jacq. — *Aralia septimnervia*. H. B. et K.)

Var. : *nymphæfolia*.

O. platanifolium. Dene. et Planch. — Reg. andina.

(*Aralia*. H. B. et K.)

O. dactylifolium. Hort. — Hab. ?

O. Xalapense. Dene et Planch. — Mexico.

(*Aralia Xalapensis*. H. B. et K. — *Monopanax Ghiesbrechtii*.
Rgl.)

HEDERA. TOURN. EX LIN.

H. helix. Lin. — Europ.; Asia temp.; Africa bor.

Var. : *arborea*.

" *conglomerata*.

" *palmata*.

" *digitata*.

" *dentata*.

" *rhombea*.

" *Hibernica*.

" *Hibernica marmorata*.

" *Hibernica aurea variegata*.

" *canariensis*.

(*H. canariensis*. Willd.)

Var. : *chrysocarpa*.

(*H. chrysocarpa*. Reg.)

Var. : *aurantiaca*.

" *nervosa*.

" *Salma elegantissima*.

" *atropurpurea*.

" *aurea spectabilis*.

H. colchica. K. Koch. — Reg. Caucas.

Var. : *foliis varieg.*

LXIX. — CORNACEÆ

STYLIDIUM. LOUR. (1790)

S. platanifolium. — China; Japon.

(*Marlea platanoides*. Sieb. et Zucc.)

S. begoniæfolium. — Ind. orient.; China; Japon.

(*Marlea begoniæfolia*. Roxb.)

COROKEA. A. CUNN. (1839)

C. Cotoneaster. Raoul. — Nov. Zeland.

CORNUS (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Benthamidia*. Spach.**C. florida**. Lin. — Amer. bor.-orient.*(Benthamidia florida*. Spach.)**C. Nuttallii**. Audubon. — Amer. bor.-occid.**C. capitata**. Wall. — Reg. Himal.*(Benthamia fragifera*. Lindl.)2. *Macrocarpium*. Spach.**C. mas**. Lin. — Europ. med. et austr.; Oriens.3. *Microcarpium*. Spach.**C. alternifolia**. Lin. fil. — Amer. bor.*(C. plicata*. Tausch.)**C. macrophylla**. Wall. — Reg. Himal.; China; Japon.**C. circinata**. L'Herit. — Amer. bor.-orient (pars sept. et med.).**C. fœmina**. Mill. — Amer. bor. (pars merid.)*(C. stricta*. L'Herit.)**C. candidissima**. Mill. — Amer. bor.-orient.*(C. racemosa*. Lamk. — *C. paniculata*. L'Herit.)**C. brachypoda**. C.-A. Mey. — Japon.*(C. alba*. Thunb.)

Var. : foliis variegatis.

C. alba. Wangenh. — Amer. bor. (pars sept. et centr.).*(C. stolonifera*. Mchx.)

Var. : Spæthii (fol. aureo-marginatis).

" fol. argenteo-marginatis.

C. tatarica. Mill. — Sibir.; China bor.*(C. alba*. L. Mant. — *C. purpurea*. Tausch.)

Var. : Sibirica.

(C. Sibirica. Lodd.)

AUCUBA. THUNB. (1783)

A. japonica. Thunb. — Japonia.

Var. : angustifolia.

bicolor præcox.

crassifolia.

dentata.

latimaculata.

limbata.

longifolia.

maculata.

maculata robusta.

picta.

Sieboldi (elegans).

sulphurea.

viridis.

A. himalayca. Hook. et Thoms. — Reg. Himal.

GARRYA. DOUGL. EX LINDL (1834)

G. elliptica. Dougl. — Amer. bor.-occid.

G. macrophylla. Benth. — Mexico.

(*Fadyenia*. Endl.)

G. laurifolia. Benth. — Mexico.

(*Fadyenia*. Endl.)

GRISELINIA. FORST. (1786)

G. littoralis. Raoul. — Nov. Zelandia.

G. lucida. Forst. — Nov. Zelandia.

NYSSA. GRONOV. EX LIN.

N. sylvatica. Marsh. — Amer. bor.

(*N. aquatica*. Lin. — *N. multiflora*. Wangenh. — *N. villosa*.
Mchx.)

DICOTYLEDONES GAMOPETALÆ

LXX. — CAPRIFOLIACEÆ

Trib. 1. — SAMBUCEÆ.

SAMBUCUS. (TOURN.) LIN. (1753)

S. racemosa. Lin. — Europ. med. et austr.; Oriens.; Sibir.

Var. : arborescens. Torr. et Gray.

“ plumosa.

S. nigra. Lin. — Europ.; Asia bor. et med.

(*S. vulgaris*. Lamk.)

Var. : foliis luteis.

“ foliis aureo-variegat : (elegantissima.)

S. canadensis. Lin. — Amer. bor.

(*S. nigra*. Marsh.)

Var. : filicifolia.

S. glauca. Nutt. — Amer. bor.-occid.

Var. : semperflorens (Fontenaysii).

VIBURNUM. LIN. (1753)

1. *Opulus*. D.C.

V. opulus. Lin. — Europ.; Sibir.

(*V. lobatum*. Lamk. — *Opulus glandulosa*. Lamk.)

Var. : sterile.

V. americanum. Mill. — Amer. bor. (pars sept.).

(*V. Oxycoccus*. Pursh. — *V. trilobum*. Marsh. — *V. opuloides*.
Muhl.)

V. tomentosum. Thunb. — Japon.

Var. : plicatum.

(*V. plicatum* et *V. denudatum*. Thunb.)

V. macrocephalum. Fortune. — China.

2. *Euviburnum*. Oerst.

V. dentatum. Lin. — Amer. bor. (pars sept. et centr.).

- V. Lantana.** Lin. — Europ.; Oriens.
(*V. tomentosum*. Lamk.)
- V. dilutatum.** Thunb. — Japon.
(*V. erosum*. Asa Gray.)
- V. cassinoides.** Lin. — Amer. bor. (pars sept. et cent.).
(*V. squamatum*. Willd. — *V. pyrifolium*. Pursh.)
- V. japonicum.** Spreng. — Japon.
(*V. macrophyllum*. Bl. — *V. Buërgueri*. Miq. — *Cornus japonica*. Thunb.)
- V. Lentago.** Lin. — Amer. bor. (pars sept. et cent.).
- V. prunifolium.** Lin. — Amer. bor. (pars cent. et merid.).
(*V. Lentago*. Duroi. — *V. pyrifolium*. Poir.)
Var. : *bullatum*.
- V. obovatum.** Walt. — Amer. bor. (pars merid.).
(*V. laevigatum*. Ait. — *V. cassinoides*. Mchx.)
3. *Tinus*. Benth. et Hook.
- V. Tinus.** Lin. — Europ. aust.; Oriens; Afr. bor.
(*V. lucidum*. Mill. — *V. laurifolium*. Lamk. — *Tinus laurifolius*. Borkh.)
- V. rigidum.** Vent. — Ins. Canar. et Açor.
(*V. rugosum*. Pers. — *V. strictum*. Link. — *Tinus rugosus*. Spach.)
6. *Solenotinus*. Benth. et Hook.
- V. odoratissimum.** Ker. — China; Japon.
(*V. Awafuski* Lindl.)
- V. Sandankwa.** Hassk. — Ins. Loochoo.

Trib. 2. — LONICERÆ.

SYMPHORICARPOS. DILL. EX JUSS.

- S. orbiculatus.** Mönch. — Amer. bor.-orient. (pars centr.).
(*S. vulgaris*. Mchx. — *S. parviflorus*. Desf. — *Symphoria conglomerata*. Pers. — *Lonicera Symphoricarpus*. Lin.)
- S. racemosus.** Mchx. — Amer. bor. (pars sept. et centr.).
(*S. albus*. Rafn. — *Symphoria racemosa*. Pursh.)
- S. Heyeri.** Dipp. — Colorado.
(*S. occidentalis*. Hook. var. *Heyeri*.)
- S. montanus.** H. B. et K. — Mexico alp.
Var. : *microphyllus*.
(*Symphoria montana*. Spreng.)

ABELIA. R. BR. (1818)

- A. rupestris.** Lindl. — China. bor.
Var. : *grandiflora alba*.
- A. triflora.** R. Br. — Reg. Himal

A. floribunda. Dcne. — Mexico alp.
(*Vesalea floribunda*. Mart. et Gall.)

LONICERA. LIN. (1753) SENS. DESF.

1. *Caprifolium*. Juss.

L. caprifolium. Lin. — Europ. austr.; Reg. Cauc.
(*Caprifolium hortense*. Lamk. — *Lonicera italica*. Schm. —
Lonicera dimorpha. Tausch. — *Peryclimenum italicum*. Mill.)
Var. : *præcox*. (Lamk.)

L. etrusca. Santi. — Europ. austr.; Reg. Caucas.
(*Caprifolium Peryclimenum*. Gonau. — *Caprifolium etruscum*.
Rœm.)

L. sempervirens. Lin. — Amer. bor. (pars centr.)
(*L. Virginiana* et *Caroliniana*. Marsh. — *Caprifolium semper-*
virens. Mchx. — *Peryclimenum sempervirens*. Mill.)
Var. : *minor*. (fuchsioides).
" *coccinea superba*.

L. ciliosa. Poir. — Amer. bor. occid.
(*L. occidentalis*. Hook. — *Caprifolium ciliosum* Pursh. — *Capri-*
fol. occidentale. Lindl.)

2. *Nintoa*. Sweet.

L. japonica. Thunb. — China; Japon.
(*L. flexuosa*. Edw. — *L. chinensis*. Wats. — *Caprifolium chi-*
nense. Loud. — *Nintoa japonica*. Sweet.)

L. flexuosa. Thunb. — China; Japon.
(*L. nigra*. Thunb. — *L. brachypoda*. D.C. — *L. diversifolia*.
Carr.)
Var. : *Halleana*.
" *aureo-reticulata*.

3. *Eulonicera*. Dipp.

L. chrysantha. Turcz. — Dahur.; Reg. Amur.

L. Morrowii. As. Gray. — Japon.

L. Standishii. Carr. — China.
(*L. fragrantissima*. Lindl. et Paxt. — *Chamæcerasus*. Lesk.)

L. fragrantissima. Carr. — China.

L. Xylosteum. Lin. — Europ.; Oriens.; Sibir.
(*L. dumetorum*. Mönch. — *Caprifolium dumetorum*. Lamk. —
Lonicera cotinifolia. C.-A. Mey. — *Chamæcerasus Xylos-*
teum. Medik.)

L. nigra. Lin. — Europ. med. alpest.
(*Xylosteum* Mill. — *Caprifolium roseum*. Lamk. — *Chamæce-*
rasus nigra. Medik.)

L. tatarica. Lin. — Russia merid.; Sibir.; Tartar.
(*Chamæcerasus*. Medik. — *Xylosteum cordatum*. Mönch —
Xylosteum tartarum. Dum. Cour.)
Var. : *latifolia* (*rubra grandifolia*).

- L. Ruprechtiana.** Rgl. — Reg. Amur.; Ussur.
(*Xylosteum chrysantum*, var. *subtomentosum*. Rupr.)
- L. Maackii.** Maxim. — Mandsch.; Reg. Amur.; Japon.
(*Xylosteum*. Rupr.)
- L. alpigena.** Lin. — Eur. centr. alp.; Oriens; Reg. Himal.
(*Caprifolium alpinum*. Lamk. — *Caprifolium alpigenum*.
Gærtn. — *Chamæcerasus alpigenus*. Medik. — *Isika lucida*.
Möench. — *Xylosteum alpigenum*. Dum. Cours.)
- L. Webbiana.** Wall. — Reg. Himal.
- L. angustifolia.** Wall. — Reg. Himal.
- L. Alberti.** Rgl. — Turkest. orient.
- L. Ledebouri.** Eschsch. — Amer. bor.
(*L. Mociniana*. D.C. — *L. intermedia* Kell.)
- L. cærulea.** Lin. — Eur. alp.; As. et Amer. bor.)
(*L. altaica*. Pall. — *L. villosa*. Muhl. — *L. vellutina*. D.C. —
Xylosteum canadense. Duham. — *Xylosteum villosum*. Mchx.
— *Caprifolium cæruleum*. Lamk. — *Isika cærulea*. Bork.)

LEYCESTERIA. WALL. (1824)

- L. formosa.** Wall. — Reg. Himal.

DIERVILLA. (TOURN.) JUSS. (1789)

1. *Eudiervilla*. K. Koch.
- D. Lonicera.** Mill. — Amer. bor. (pars sept. et cent.).
(*D. acadiensis*. Tourn. — *D. canadensis*. Willd. — *D. trifida*.
Möench — *D. Tournefortii*. Michx. — *D. lutea*. Pursh. —
Lonicera Diervilla. Lin.)
- D. sessilifolia.** Buckley. — Am. bor. (pars cent.).
(*D. splendens*. Carr. — *Wagneria Middendorffiana*. Lem.)
2. *Weigela*. Thunb.
- D. florida.** Sieb. et Zucc. — China bor.
(*D. rosea*. Walp. — *Weigela rosea*. Lindl. — *Calisphyrum*
floridum. Bnge.)
Var. : *Hendersoni*.
Kosteriana (variegata).
Sieboldii (fol. argenteo-margin.)
- D. hortensis.** Sieb et Zucc. — Japon.
Var. : *candida*
- D. coraënsis.** D.C. — Japon; Coræa.
(*D. grandiflora*. Sieb. et Zucc. — *D. amabilis*. Carr. — *Weigela*
coraënsis. Thunb.)
Var : *alba grandiflora*.

- D. Middendorffiana.** Carr. — China bor.; Sib. orient.
(*Calypstrotigma*. Trauttw.)

LXXI. — RUBIACEÆ

Trib. 1. — NAUCLEEÆ.

CEPHALANTHUS. LIN. (1753)

- C. occidentalis.** Lin. — Amer. bor.
(*C. oppositifolius*. Mönch.)

Trib. 2. — CINCHONEÆ.

CINCHONA. LIN. (1753)

- C. Ledgeriana.** Moens ex Trimens. — Bolivia.

BOUVARDIA. SALISB. (1805)

- B. triphylla.** Salisb. — Mexico.
(*B. Jacquinii*. H. B. et K. — *Ixora americana*. Jacq. — *I. ternifolia*. Cav. — *Houstonia coccinea*. Bayle)
B. flava. Dcne. — Mexico.
B. leiantha. Benth. — Guatemala; Mexico.
B. corymbosa. Oerst. — Nicaragua.
B. jasminiflora. Hort. — Hab. ?
B. candidissima. Gard. Chron. — Hab. ?
B. Humboldtii corymbiflora. — (St. hybr.).
(*B. Humboldtii* × *Houstonia longiflora*.)
et *altre hybridæ plurimæ*.

MANETTIA. MUTIS ex L. MANT. (1777)

- M. cordifolia.** Mart. — Brazil.
(*M. micans*. Poepp. et Endl. — *M. miniata*. Lem. — *M. glabra*. Cham. et Schl.)

Trib. 5. — RONDELETIÆ.

RONDELETIA. LIN. (1753)

- R. anomala ?** — Amer. trop.
R. cordata. Benth. — Amer. austr.
(*Rogiera*. Planch.)

Trib. 6. — HEDYOTIDEÆ.

PENTAS. BENTH. (1844)

P. carnea. Benth. — Afric. tropic. et subtrop.

(*P. Quartimana.* Oliva. — *Sypanea carnea.* Ad. Brong. —
Neurocarpea lanceolata. R. Br.)

HOUSTONIA. GRONOV. EX LIN.

H. longiflora. As. Gray. — Mexico.

(*Bouvardia.* H. B. et K. — *Æginetia.* Cav.)

Trib. 10. — GARDENIEÆ.

BURCHELIA. R. BR. (1820)

B. capensis. R. Br. — Africa australis.

(*B. Krausii.* Höchst. — *Lonicera bubalina.* Lin. fl.)

GARDENIA. ELLIS. (1761)

1. *Eugardenia.* Hook. fl.

G. florida. Lin. — China ; Japon.

(*G. jasminoides.* Salisb. — *Jasminum capense.* Mill.)

Var. : *Fortuneana* (Bot. Reg.).

(*G. radicans.* Thunb.)

Trib. 16. — ALBERTEÆ.

ALBERTA. E. MEY. (1838)

A. magna. E. Mey. — Afr. austr.

Trib. 18. — IXOREÆ.

PAVETTA. LIN. (1747)

P. indica. Lin. — Asia et Austr. trop.

(*Ixora paniculata.* Lamk. — *Ixora Pavetta.* Roxb.)

COFFEA. LIN. (1753)

C. arabica. Lin. — Arabia ; Afric. tropic.

(*C. laurifolia.* Salisb.)

Trib. 19. — MORINDEÆ.

DAMNACANTHUS. GÆRTN. (1805)

D. indicus. Gært. — Reg. Himal ; Japon.

(*D. major.* Sieb. et Zucc. — *Baumannia geminiflora.* D.C.)

Trib. 23. — ANTHOSPERMEÆ.

SERISSA. COMM. IN JUSS. (1789)

S. fœtida. Comm. — China; Japon.

(*Lycium fœtidum*. Lin. fl. — *Lycium japonicum*. Thunb. —
Buchozia coprosmoides. L'Herit. — *Dipsoda fœtida*. Salisb.
 — *Dipsoda fasciculata*. Lour.)

NERTERA. BANKS ET SOLAND. EX GÆRTN. (1788)

N. depressa. Banks et Soland. — Am. austr.; Nov. Zel.
 Ins. Trit. Acun.

(*N. alsinoides*. Cham. et Schled. — *N. assurgens*. Thou. —
N. repens. Ruiz. et Pav. — *Gomozia americana*. Mirb. —
Gomozia granadensis. Murs. — *Erythrœlanum alsinœforme*.
 Thou. — *Cunima Sanfuentes*. C'os. — *Coprosma Nertera*.
 F. Mull.)

COPROSMA. FORST. (1776)

C. Baueria. Endl. — Nov. Zeland.; Ins. Norfolk.

Var. : fol. variegatis.

C. lucida. Forst. — Nov. Zeland.

(*Pelaghia laurina*. Banks et Soland.)

LXXII. — DIPSACEÆ

MORINA. TOURN. EX LIN.

M. longifolia. Wall. — Reg. Himal.

CEPHALARIA. SCHRAD EX RŒM. ET SCHL. (1814)

C. alpina. Schrad. — Europa.

(*Lepicephalus*. Lag. — *Succisa*. Spreng.)

SCABIOSA. LIN. (1753)

6. *Asterocephalus*. Coult.**S. caucasica.** Marsh. — Reg. Caucas.

(*Asterocephalus caucasicus*. Spreng. — *Asterocephalus elegans*.
 Lag. — *Asterocephalus pumilus*. Spreng.)

LXXIII. — COMPOSITÆ

Trib. 1. — VERNONIACEÆ.

VERNONIA. SCHREB. (1791)

3. *Stengelia*. Sch. Bip.**V. Arkansana**. D.C. — Amer. bor.

STOKESIA. L'HERIT. (1788)

S. cyanea. L'Herit. — Amer. bor.*(Cartesia centauroides. Cass.)*

Trib. 2. — EUPATORIACEÆ.

AGERATUM. LIN. (1753)

A. conyzoides. Lin. — Reg. trop.*(A. mexicanum. Sims. — A. cœruleum. Hor. ex Poir.)**Variet. hortens.*

STEVIA. CAV. (1798)

S. serrata. Cav. — Mexico.*Var. : foliis variegat.*

EUPATORIUM. (TOURN.) LIN. (1753)

E. ageratoides. Lin. — Amer. bor.*(Batschia nivea. Mœnch.)***E. micranthum**. Less. — Mexico.*(E. ligustrinum. D.C. — E. Weinmannianum. Reg. et Kœrn.)***E. megalophyllum**. Klatt. — Mexico.*(Hebeclinium. Lem.)***E. atrorubens?** — Mexico.*(Hebeclinium. Lem.)***E. reticulatum**. A. Rich. — Cuba.

LIATRIS. SCHREB. (1791)

L. spicata. Willd. — Amer. bor.*(L. macrostachya. Mchx. — L. pilosa. Ker. Gawl.)*

Trib. 3. — ASTEROÏDEÆ.

BOLTONIA. L'HER. (1788)

B. latisquama. A. Gray. — Amer. bor.

ASTER. TOURN. EX LIN.

3. *Euaster*. As Gray.**A. amellus**. Lin. — Europ.; As. min.; Reg. Caucas.**A. grandiflorus**. Lin. — Am. bor.**A. peregrinus**. Pursh. — Asia orient.; Am. bor. artic.**A. versicolor**. Willd. — Amer. bor.**A. tenuifolius**. Lin. — Amer. bor.(A. *recurvatus*. Nees.)**A. diffusus**. Dryand. — Amer. bor.(A. *pendulus*. Dryand. — A. *secundiflorus*. Desf.)11. *Galatella*. Benth.**A. longifolius**. Lamk. — Amer. bor.Var. : *formosus*.13. *Agathæa*. Harv.**A. capensis**. Less. — Africa austr.(A. *rotundifolius*. Thunb. — *Agathæa cælestis*. Cass. — *Agathæa amelloides*. D.C. — *Cineraria amelloides*. Lin.)

OLEARIA. MÖNCH. (1802)

O. ilicifolia. Hook. — Nov. Zeland.(Eurybia *dentata*. Hook. — *Haxtonia phlogopappa*. D. Don.)**O. stellulata**. D.C. — Tasmania.(O. *Gunniana*. Hook. fl. — O. *quercifolia*. — Eurybia *Gunniana*. D.C. — H. *Gunniana*. D. Don.)**O. dentata**. Moench. — Australia.(Aster. Andr. — Aster *tomentosus*. Schrad. et Wendl. — Aster *ferrugineus*. Wendl. — *Haxtonia tomentosa*. D. Don. — *Orestion dentatu*. Rafin)**O. Haastii**. Hook. fl. — Nov. Zeland.**O. heliophila**. F. Mull. — Austral.(Eurybia *paniculata*. Steetz. — *Shawia paniculata*. Forst.)**O. argophylla**. F. Mull. — Australia.(Eurybia. Cass. — *Haxtonia*. Caley.)**O. nitida**. Hook. fl. — Nov. Zelandia.

(Eurybia. Hook. fl.)

ERIGERON. LIN. (1753)

Sect. 2. *Euerigeron*. Lin.**E. aurantiacus**. Rgl. — Turkestan.Sect. 4. *Phænactis*. Mutt.**E. speciosus**. D.C. — Amer. bor. occid.(Stenactis *speciosa*. Lindl)

VITTADINIA. A. RICH. ()

- V. triloba.** D.C. — Australia orientalis.
(*Microgyne trifurcata*. Less.)

BACCHARIS. LIN. (1753)

- B. halimifolia.** Lin. — Am. bor.
(*B. cuneifolia*. Mönch. — *Conyza*. Desf.)
B. patagonica. Hook. et Arn. — Reg. Magellan.
(*B. cuneifolia*. D.C. — *B. tridentata*. Gaud.)
B. xalapensis. H. B. et K. — Mexico.
(*B. conferta*. H. B. et K.)

Trib. 4. — INULOIDEÆ.

PLUCHEA. CASS. (1817)

- P. subdecurrens.** Cass. — Mexico.
(*Conyza asteroides*. Desf. — *Conyza adhata*. H. B. et K. —
Baccharis adnata. Willd.)

FILAGO. LIN. (1753)

2. *Loglia*. Cass.
F. minima. Fries. — Europa.
Var. : *pulchella*.
(*Gnaphalium*. Sm.)

ANTENNARIA. GÆRTN. (1791)

- A. dioica.** Gærtn. — Europ.; Asia bor.
Var. : *candida*.

HELICHRYSUM. } VAILL. ex LIN.
 } GÆRTN. (1791)

- Subg. I. *Euhelichrysum*. Benth.
4. *Chrysocephalum*. Benth.
H. serpyllifolium. Less. — Afr. aust.
(*H. helianthemifolium* D. Don. — *Gnaphalium orbiculare*.
Thunb.)
5. *Ozothamnus*. Less.
H. diosmæfolium. Sweet. — Tasmania.
(*H. rosmarinifolium*. Spreng. — *Ozothamnus rosmarinifolius*.
D.C. — *Ozothamnus thyrsoides*. D.C. — *Ozothamnus dios-*
mæfolius. D.C.)
Subg. II. *Lepicline*. Benth.
H. humile. Less. — Africa aust.
(*H. sesamoides*. Curt. — *H. spectabilis*. Lodd. — *Helipterum*
humile. D.C. — *Aphelaxis humilis*. Don.)

CASSINIA. R. BR. (1817)

- C. fulvida.** Hook. fl. — Nov. Zeland.
(*Diplopappus chrysophyllus*. Kœhne.)

PHÆNOCOMA. D. DON. (1826)

- P. prolifera.** D. Don. — Afric. austr.
(*Xeranthemum*. Lin. — *Helichrysum*. Mæd.)

HUMEA. SM. (1804)

- H. elegans.** Sm. — Australia.

CALOCEPHALUS. R. BR. (1817)

1. *Leucophyta*. R. Br.
C. Brownii. F. Muell. — Austr. orient.-merid.; Tasmania.
(*Leucophyta*. Cass.)

BUPHTALMUM. LIN. (1753)

- B. speciosum.** Schreb. — Oriens.
(*B. cordifolium*. Waldst et Kit.)

Trib. 5. — HELIANTHOIDEÆ.

FRANSERIA. CAV. (1793)

- F. artemisioides.** Cav. — Peruvia.
(*Ambrosia arborescens*. Lamk. — *Xanthium fruticosum*. Lin.)

MONTANOA. CERV. IN LLAV. ET LEX. (1825)

- M. elegans.** C. Koch. — Mexico.
(*Uhdeæ pinnatifida*. Kunth.)

RUDBECKIA. LIN. (1753)

3. *Eurudbeckia*.
R. californica. A. Gray. — Amer. bor.-occid.
R. Newmanni. Loud. — Amer. austr.

PERYMENIUM. SCHRAD (1830)

- P. discolor.** Schrad. — Mexico.

PODACHÆNIUM. BENTH. EX OERST (1852)

- P. paniculatum.** Benth. — Mexico.
(*Ferdinanda cminens*. Lagasc.)

DAHLIA. CAV. (1791)

D. variabilis. Desf. — Mexico.

(*Georgina superflua*. D.C. — *Georgina purpurea*. Willd.)

Var. : *nana*.

et *altæ hortens. plurimæ*.

D. Juarezii. Hort. — Mexico.

D. imperialis. Rœzl. — Mexico.

D. Zimapani ? — Mexico.

(*Bidens atrosanguinea*. Hort.)

Trib. 7. — ANTHEMIDEÆ.

ERIOCEPHALUS. LIN. (1753)

E. africanus. Lin. — Africa austr.

(*E. septifer*. Cass.)

GONOSPERMUM. LESS.

G. canariense. Less. — Ins. Canar.

(*G. elegans*. D.C. — *G. fruticosum*. D.C. — *Achillea arborea*.

Horn. — *Hymenolepis canariensis*. Sch. Bip. — *Hymenolepis elegans*. Cass.)

ACHILLEA. LIN. (1753)

A. Ptarmica. Lin. — Reg. temp.-bor.

A. tomentosa. Lin. — Europ.; Oriens; As. bor.

A. umbellata. Sibth. — Græcia.

Var. : *argentea*.

SANTOLINA. LIN. (1753)

S. chamæcyparissus. Lin. — Reg. medit.

CHRYSANTHEMUM. (TOURN.) LIN. (1753)

3. *Argyranthema*. Benth.

C. frutescens. Lin. — Ins. Canar.

(*Pyrethrum*. Willd.)

4. *Pyrethra*. Benth.

C. indicum. Lin. — China; Japon.

(*C. japonicum*. Thunb. — *C. tripartitum*. Sweet. — *Pyrethrum indicum*. Cass.)

C. Parthenium. Bernh. — Europa.

(*Matricaria*. Lin. — *M. florida*. Salisb. — *M. odorata*. Lamk.)

C. corymbosum. Lin. — Europa; Afr. bor.; Reg. Caucas.

(*Matricaria*. Desr. in Lamk. — *Pyrethrum*. Willd.)

ARTEMISIA. LIN. (1753)

A. Abrotanum. Lin. — Europ.; As. temp.

(*Abrotanum*. Tourn.)

A. camphorata. Vill. — Europ. aust.

(*A. corymbosa*. Lamk. — *A. subcanescens*. Willd. — *Absinthium saxatile*. Bess. — *Absinthium corymbosum*. D.C.)

A. italica. Stechn. — Italia.

Trib. 8. — SENECONIDEÆ.

DORONICUM. TOURN. EX LIN.

D. austriacum. Jacq. — Europa.

GYNURA. CASS. (1825)

G. aurantiaca. D.C. — Java.

NOTONIA. D.C. (1833)

N. Schweinfurthi. Oliver et Hiern. — Abyssinia.

SENECIO. LIN. (1753)

2. *Cineraria*. Lin. p. part.

S. Cineraria. D.C. — Reg. mediterr.

(*Cineraria maritima*. Lin.) — *Cin. acanthifolia*. Reichb.)

S. Petasites. D.C. — Mexico.

(*Cineraria platanifolia*. Schrank.

5. *Hubertia*. Bory.

S. pinnifolius. Lamk. — Afric. austr.

(*Inula*. Lin. — *Cineraria laricifolia*. Lamk. — *Hubertia pinnifolia*. Sieb.)

?

S. eleagnifolius. Hook. fil. — Nov. Zeland (pars sept.).

S. oxyriæfolius. D.C. — Afr. austr.

(*S. peltatus*, *S. subnudus* et *S. peltiformis*. D.C.)

16. *Delairia*. Lenn.

S. macroglossus. D.C. — Afr. austr.

S. mikanooides. Otto. — Afr. austr.

(*S. scandens*. D.C. — *Cacalia scandens*. Zeyh. — *Delairia odorata*. Lem.)

20. *Ligularia*. Cass.

S. Kämpferi. D.C. — Japonia.

(*Ligularia*. Sieb. et Zucc. — *Ligularia japonica*. Less.)

S. palmatifida. Benth. et Hook. — Japonia.

(*Erythrochæte*. Sieb. et Zucc.)

23. *Kleinia*. Haw.**S. ficoides**. Benth. et Hook. — Afr. austr.*Cacalia*. Lin. — *Kleinia*. Haw.**S. succulentus**. Sch. Bip. — Afric. austral.*Cacalia* t. Lin. fil. — *Kleinia repens*. Haw.**S. Haworthii**. Sch. Bip. — Afr. austr.*Kleinia*. D.C. — *Cacalia tomentosa*. Haw. — *Cacalia Haworthii*.Sw. — *Cacalia canescens*. Willd.**S. articulatus**. Benth et Hook. — Afric. austr.*Cacalia* Lin. fil. — *Cacalia laciniata*. Jacq. — *Cacalia runcinata*. Lamk. — *Kleinia articulata*. Haw.**S. Kleinia**. — Africa austr.*Kleinia neriifolia*. Haw.

EURYOPS. CASS. 1818

E. virgineus. Less. — Afr. austr.*Othonna*. Lin. fil. — *Othonna flabellifolia*. Lodd. — *Euryops flabelliformis*. Cass

OTHONNA. LIN. 1753

O. carnea. Less. — Afric. austr.*Cineraria cacalioides*. Lin. fil.**O. cylindrica**. D.C. — Afric. austr.*O. tenuissima*. Haw. — *Cacalia cylindrica*. Lamk.

Trib. 9. — CALENDULACEÆ.

OSTEOSPERMUM. LIN. (1753)

O. moniliferum. Lin. — Afr. austr.**O. coriaceum**. D.C. — Afr. austr.*O. junceum* Herb. — *O. paniculatum*. Less.)

Trib. 10. — ARCTOTIDEÆ.

ARCTOTIS. LIN. (1753)

A. reptans. Jacq. — Afr. austr.**A. aspera**. Lin. — Afr. austr.

Var. : undulata.

A. undulata. Thunb. — *A. cuprea*. Jacq. — *A. aureola*.
Elwards)

GAZANIA. GÆRTN. (1791)

G. Pavonia. R. Br. — Afr. austr.*Gorteria rigens*. Thunb. — *Gorteria Pavonia*. Ander. — *Gazania pinnata*. D.C.)

G. splendens. Hort. angl. — (St. Hybr.).

Trib. 11. — **CYNAROIDEÆ.**

ECHINOPS. LIN. (1753)

E. niveus. Wall. — Reg. Himal. occ.

CNICUS. LIN. (1753)

4. *Chamæpeuce.* D.C.

C. gnaphaloides. Willd. — Italia.

SILYBUM. GÆRTN. (1791)

S. marianum. Gært. — Europ. austr.; Afric. bor.; Asia occ.

CENTAUREA. LIN. (1753)

Ser. A. Benth. et Hook.

1. *Centaurium.* D.C.

C. alpina. Lin. — Europ.

Ser. B. Benth. et Hook.

8. *Jacea.* Benth.

C. montana. Lin. — Europ.

(*Jacea alata.* Lamk.)

C. ragusina. Lin. — Dalmatia; Creta.

Trib. 12. — **MUTISACEÆ.**

GERBERA. GRONOV. IN LIN. (1753)

6. *Lasiopus.* Cass.

G. plantaginea. Harv. — Afr. austr.

Trib. 13. — **CHICORIACEÆ.**

CATANANCHE. LIN. (1753)

C. cærulea. Lin. — Reg. mediterr.-occ.

SONCHUS. LIN. (1753)

S. gummifer. Link. — Ins. Canar.

LXXIV. — CANDOLLEACEÆ

CANDOLLEA. LABILL. (1806)

3. *Rhinchangium*. Benth.**C. fasciculata**. F. Müll. — Austral.

(Stylidium. R. Br.)

LXXV. — GOODENIACEÆ

LESCHENAULTIA. R. BR. (1810)

L. biloba. Lindl. — Austral. merid.

(L. Drummondii. de Vriese. — L. grandiflora. D.C.)

L. formosa. R. Br. — Australia.

(L. Baxteri. G. Don. — L. multiflora. Lodd. — L. oblata. Sweet.)

LXXVI. — LOBELIACEÆ

Trib. 1. — LOBELIEÆ.

CENTROPOGON. PRESL. (1836)

C. Lucyanus. Hort. — Hab. ?

SIPHOCAMPYLUS. POHL. (1831)

S. bicolor. Don. — Amer. bor.-orient. (pars merid.).**S. coccineus**. Hook. — Brazil.

PRATIA. GAUD. (1826)

P. angulata. Hook. fil. — Nov. Zeland.

(Lobelia littoralis. R. Cunn.)

LOBELIA. PLUM. EX. LIN. (1753)

5. *Homochilus*. D.C.**L. laxiflora**. H. B. et K. — Mexico.

(L. rigidula. H. B. et K. — L. floribunda. Bonpl. — L. persicæfolia. Cav. — L. Cavanillesiana. Rœm. et Schult. — L. fissa. Willd. — L. ovalifolia. Hook. et Arn.)

6. *Eulobelia*. Benth. et Hook.

L. syphilitica. Lin. — Amer. bor. (pars cent. et med.); Afr. austr. ? Ind. Kew., p. 106).

(*L. reflexa*. Stokes. — *L. speciosa*. Sweet.)

L. cardinalis. Lin. — Amer. bor. (pars merid.)

Var. : Queen Victoria.

HETEROTOMA. ZUCC. (1832)

H. lobelioides. Zucc. — Mexico.

(*Myopsia mexicana*. Presl. — *Lobelia calcarata*. Bertol.)

LXXVII. — CAMPANULACEÆ

WAHLENBERGIA. SCHRAD. (1833)

W. tenuifolia. A. D. C. — Europ. medio.-orient.

(*Edraianthus*. A. D. C. — *Edraianthus caricinus*. Schott.)

PLATYCODON. A. D. C. (1830)

P. grandiflorum. A. D. C. — As. bor.; China; Japon.

CANARINA. L. MANT. (1767)

C. campanulata. L. Mant. — Ins. Canar.

(*C. lævigata*. G. Don. — *Canaria*. Lin.)

ROELLA. LIN. (1753)

R. ciliata. Lin. — Afr. austr.

CAMPANULA (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Medium*. A. D. C.

C. medium. Lin. — Eur. austr.

(*C. grandiflora*. Lamk.)

Var. : calycanthemum.

C. glomerata. Lin. — Europ.; Asia temp.

C. speciosa. Pourr. — Mont. Pyren.

C. isophylla. Moretti. — Italia.

OSTROWSKIA. RGL. (1884)

O. magnifica. Rgl. — Asia centralis.

LXXVIII. — VACCINIACEÆ

Trib. 1. — THIBAUDIÆ.

CERATOSTEMMA. JUSS. (1789)

1. *Euceratostemma*. Benth et Hook.**C. grandiflorum**. R. et Pav. — Peruv. andina.

THIBAUDIA. PAV. (179)

T. acuminata. Hook. — Nov. Granat.**T. pulcherrima**. Wall. — ?

PENTAPTERYGIUM. KL. (1851)

P. rugosum. Hook. — Reg. Himal.

Trib 2. — EUVACCINIÆ.

VACCINIUM. LIN. (1753)

1. *Batodendrum*. As. Gray.**V. stamineum**. Lin. — Amer. bor.-orient.(*V. elevatum*. Banks et Soland. — *V. album*. Pursh. — *Arbutus myrtilioides*. Humb — *Picoccus stamineus* et *Pic. floridanus*. Nutt.)2. *Euvaccineum*. As. Gray.**V. uliginosum**. Lin. — Eur. bor. et med.; Asia et Am. bor.(*V. pubescens*. Hornem. — *V. rubrum*. Gilib. — *V. gaultheroides*. Bigel.)**V. Myrtillus**. Lin. — Eur.; Asia et Amer. bor.(*Vitis-Idea Myrtillus*. Mönch.)3. *Cyanococcus*. As. Gray.**V. pennsylvanicum**. Lamk. — Am. bor. (pars sept. en cent.).(*V. myrtilioides*. Mchx. — *V. tenellum*. Pursh. — *V. ramulosum*. Willd)**V. corymbosum**. Lin. — Amer. bor. (pars sept.).(*V. disamorphum*. Mchx.)4. *Vitis-Idea*. C. Koch.**V. Vitis-Idea**. Lin. — Europ.; Asia et Amer. bor.(*V. punctatum*. Lamk. — *Vitis-Idea*. Mönch.)**V. coccineum** ? — Hort. angl.

OXYCOCCUS. TOURN. ex ANDANS. (1763)

O. macrocarpus. Wats. — Amer. bor. (pars sept. et cent.).(*Vaccinium macrocarpum*. Ait. — *V. hispidulum*. Wangenh).

CHIOGENES. SALISB. (1817)

C. serpyllifolia. Salisb. — Amsr. bor.-or.

(*C. hispidula*. Torr. et Gray. — *Vaccinium hispidulum*. Lin.
— *Arbutus filiformis*. Lamk. — *Oxycoccus hispidulum*. Pers.
— *Gaultheria serpyllifolia*. Pursh. — *Glycyphylla hispidula*.
Raf. — *Phalerocarpus serpyllifolius*. G. Don.)

LXXIX. — ERICACEÆ

Trib. 1. — ARBUTEÆ.

ARBUTUS. (TOURN.) LIN. (1753) PR. PART.

A. Andrachne. Lin. — Reg. medit.-orient.

(*A. integrifolia*. Salisb. — *Andrachne frutescens*. Ehr.)

A. Unedo. Lin. — Reg. medit.; Hibern.

(*A. serratifolia*. Salisb. — *A. salicifolia*. Hoffmsg. — *Unedo*
edulis. Hoffmsg.)

A. macrophylla. Mart. et Gall. — Mexico.

ARCTOSTAPHYLOS. ADANS. (1763)

1. *Arctostaphylos*. Kl.**A. Uva-ursi.** Spreng — Reg. bor. et arct.

(*A. officinalis*. Wimm. — *A. procumbens*. E. Mey. — *Arbutus*
Uva-ursi. Lin. — *Arbutus procumbens*. Salisb. — *Arbutus*
buxifolia. Stokes. — *Mairania Uva-ursi*. Desvaux.)

PERNETTYA. GAUD. (1826)

P. mucronata. Gaud. — Reg. Magell.

(*Arbutus*. Lin. fl.)

P. angustifolia. Lindl. — Chili austr.**P. phillyreæfolia.** D.C. — Amer. austr.

(*Arbutus*. Pers.)

Trib. 2. — ANDROMEDEÆ.

GAULTHERIA. KALM. IN LIN. (1753)

G. procumbens. Lin. — Amer. bor. (pars sept. et or.).

(*G. humilis*. Salisb.)

G. nummularioides. D. Don. — Reg. Himal.**G. Shallon.** Pursh. — Amer. bor. occid.**G. acuminata.** Cham et Schlecht. — Mexico.

CHAMÆDAPHNE. MCENCH. (1794)

- C. calyculata.** Mönch. — Eur.; As. bor.; Amer. bor.-or.
(*Andromeda*. Lin. — *Cassandra*. D. Don.)

CASSIOPE. D. DON. (1834)

- C. tetragona.** D. Don. — Eur. bor.; Sibiria; Amer. bor.
(pars sept.).
(*Andromeda*. Lin.)

LEUCOTHOË. D. DON. (1834)

1. *Euleucothoë*. As. Gray.
L. axillaris. D. Don. — Amer. bor. (pars merid.)
(*Andromeda*. Lamk.)
L. Catesbæi. As. Gray. — Amer. bor.-or. (pars centr.)
(*Leucothoë spinulosa*. D. Don. — *Andromeda Catesbæi*. Walt.
— *Andromeda axillaris*. Mchx. — *Andr. Walteri*. Willd.)
2. *Eubotrys*. As. Gray.
L. racemosa. As. Gray. — Amer. bor.-orient.
(*L. spicata*. D. Don. — *Lyonia racemosa*. D. Don. — *Andromeda racemosa*. Lin. — *Cassandra racemosa*. Spach. — *Zenobia racemosa*. D.C. — *Eubotrys racemosa*. Nutt.)

OXYDENDRON. D. C. (1838)

- O. arboreum.** D.C. — Amer. bor. (pars centr. et merid.).
(*Andromeda*. Lin. — *Lyonia*. D. Don.)

EPIGÆA. LIN. (1764)

- E. repens.** Lin. — Amer. bor. (pars cent. et sept.).

LYONIA. NUTT. (1818)

- L. paniculata.** Nutt. — Amer. bor.
(*Andromeda*. Ait. — *Andromeda racemosa*. Lamk. — *Andromeda ligustrina*. Mühlb. — *Lyonia ligustrina*. D.C. — *Lyonia salicifolia*. Wats. — *Vaccinium ligustrinum*. Lin.)

ZENOBIA. D. DON. (1834)

- Z speciosa.** D. Don. — Amer. bor. (pars merid.).
(*Andromeda*. Mchx. — *Andromeda pulverulenta*. Bartr. — *Andromeda cassinæfolia*. Vent. — *Andromeda dealbata*. Lindl.)
Var. : *pulverulenta*.

ANDROMEDA. LIN. (1753) (PART.).

A. polifolia. Lin. — Reg. bor. et arct.(A. *rosmarinifolia* Pursh. — A. *glaucophylla*. Link. — *Rhododendrum polifolium*. Scop.)

Var. : major.

PIERIS. D. DON. (1834)

P. floribunda. Benth. et Hook. — Am. bor. or. (p. cent.).

(Andromeda. Pursh. — Portuna. Nutt. — Leucothoë. D. Don. — Zenobia. D.C.)

P. japonica. D. Don. — Japon.

(Andromeda. Thunb.)

P. formosa. D. Don. — Reg. Himal.

(Andromeda. Wall.)

P. Rolissoni. Hort. — (An species ?).

ENKIANTHUS. LOUR. (1790)

E. quinqueflorus. Lour. — China.(E. *reticulatus*. Lindl.)

Trib. 3. — ERICEÆ.

CALLUNA. SALISB. (1802)

C. vulgaris. Salisb. — Europ. bor. et occ.; Amer. bor.-or.
(pars sept.)(C. *Erica*. D.C. — *Erica vulgaris*. Lin. — *E. sagittifolia*. Salisb.)

Var. : dumosa.

pygmæa.

elata.

flore albo.

flore coccineo.

ERICA. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Ectasis*. Benth.**E. carnea.** Lin. — Europ. austr.; Hibernia.(E. *mediterranea*. Lin. — E. *bracteata*. Mönch. — E. *lugubris*
et E. *saxatilis*. Salisb. — *Gypsocallis*. D. Don.)

Var. : alba.

mediterranea.

2. *Syringodæa*. Benth.**E. blanda.** Andr. — Africa austr.(E. *doliiformis*. Salisb. — E. *mammosa*. Thunb.)**E. Bowieana.** Lodd. — Afric. austr.(S. *Bauera*. Andr. — E. *Bowerii*. Donovan.)

- E. Cavendishii.** Hort. — (An. st. hybrid.)
E. cerinthoides. Lin. — Afric. austr.
 (*E. crinifolia*, Salisb.)
E. Conchina. Soland. — Afric. austr.
E. conspicua. Soland. — Afric. austr.
 (*E. elata*, Andr. — *E. floccosa*, Salisb. — *E. lanata*, Wendl. —
E. longiflora, Salisb. — *E. sordida*, Andr.)
 3. *Stellanthé*. Benth.
E. ventricosa. Thunb. — Afr. austr.
 (*E. densa*, Andr. — *E. glabra*, Link. — *E. prægnans*, Andr. —
E. venusta, Salisb. — *Eurylepis glabra*, G. Don. — *Callista*
ventricosa, et *C. prægnans*, G. Don.)
 4. *Euerica*. Benth.
E. tetralix. Lin. — Europ. occid. et med.
 (*E. glomerata*, Salisb. — *E. Mackaiana*, Bab.)
E. cinerea. Lin. — Europ. occid.
 (*E. humilis*, Neck. — *E. mutabilis*, Salisb.)
 Var. : *atrosanguinea*.
E. stricta. G. Don. — Europ. austr.; Oriens.
 (*E. pendula*, Wendl. — *E. multicaulis*, Salisb. — *E. corsica*, D.C.)
E. ciliaris. Lin. — Europ. austr.-occid.
E. multiflora. Lin. — Reg. mediter.
 (*E. dianthera*, Mönch. — *E. purpurascens*, Lamk. — *E. umbel-*
lifera, Loisel. — *E. vagans*, Desf. — *Gypsocallis*, D. Don.)
E. vagans. Lin. — Eur. austr.-occid.; Oriens.
 (*E. multiflora*, Hudson. — *E. anthura*, Link. — *E. decipiens*,
 St Amans. — *E. didyma*, Stokes. — *E. Forskallii*, Vitm. —
Gypsocallis, Salisb.)
 Var. : *alba*.
 " *rubra*.
E. scoparia. Lin. — Eur. austr.-occid.; Ins. Mader.
 (*E. fuscata*, Thunb. — *E. virgulata*, Wendl.)
E. arborea. Lin. — Reg. medit. et Caucas.
E. australis. L. Mant. — Reg. medit.-occid.
 (*E. protrusa*, Salisb. — *E. stylosa*, Rudolph. — *E. umbellata*,
 Asso. — *Arsace arborea*, Fourr.)
E. lusitanica. Rudolph. — Europ. occid.
 (*E. polytrichifolia*, Salisb. — *E. codonodes*, Lindl.)
E. barbata. Andr. — Afr. austr.
E. urceolaris. Berg. — Afr. austr.
 (*E. caffra*, Lin. — *E. pentaphylla*, Lin. — *Ceramia*, D. Don.)
E. nigrita. L. Mant. — Afric. austr.
 (*E. acutangula*, Lodd. — *E. emarginata*, Andr. — *E. laricina*,
 Berg. — *E. lyrigera*, Salisb. — *E. marginata*, Benth. —
E. cucullata, Tausch. — *Eurystegia emarginata*, Benth. —
Lamprotis munda, G. Don.)

E. glamea ?

E. globosa. Andr. — Afric. austr.

Var. : *Zinota*.

E. hirsuta. Kl. — Afr. austr.

E. Massoni. Lin. fl. — Afr. austr.

(*E. rubrosepala*. Sweet. — *E. munda*, *E. calamiformis*.
E. culcitæflora. et *E. lycopodiifolia*. Salisb. — *E. spuria*,
E. princeps, *E. magnifica*, *E. acuminata* et *E. cylindrica*.
Andr. — *E. tubulosa* et *E. ambigua*. Wendl. — *E. callostoma*.
E. carinata, *E. rubida*, *E. pallida*, et *E. gemmifera*. Lodd.
E. adjuvans, *E. Andrewsii* et *E. bibracteata*. Kl. — *E. metulaeflora*. Curt. — *Callista tubulosa*. G. Don.

E. melanthera. L. Mant. — Afr. austr.

(*E. mundtiana*. Klotzsch. — *E. jubata*. Lodd.)

E. persoluta. L. Mant. — Afr. austr.

(*E. assurgens*. Link. — *E. caffra*. Andr. — *E. congesta*. Wendl.
E. pallidiflora. Klotzsch. — *E. paniculata*. Wendl. — *E. prolifera*. Salisb. — *E. setacea*. Drège. — *E. strigosa*. Wendl. —
E. subdivaricata. Berg.)

Var. : *alba*.

E. rubens. Andr. — Afr. austr.

(*E. pendula*. Lodd.)

BRUCKENTHALIA. RCHB. (1832)

B. spiculiflora. Rchb. — Europ. austro-orientalis.

(*Erica*. Salisb. — *E. Bruckenthalii*. Spreng. — *E. olympiaca*.
Sibth — *Menziesia Bruckenthalii*. Baumg.)

Trib. 4. — RHODOREÆ.

BRYANTHUS. GMEL. (1760)

2. *Parabryanthus*. As. Gray.

B. empetriformis. As. Gray. — Amer. bor.-occid.

(*Menziesia*. Sm. — *Menziesia Grahmi*. Hook. — *Phyllodoce*
empetriformis. D. Don. — *Phyll. Grahmi*. Nutt.)

DABOECIA. D. DON. (1834)

D. polifolia. D. Don. — Pens. Iber.; Hibernia.

(*Erica Daboecia*. Lin. — *Vaccinium cantabricum*. Huds. —
Menziesia polifolia. Juss. — *Andromeda montana*. Salisb.
Var. : *empetrifolia*.)

KALMIA. LIN. (1753)

K. latifolia. Lin. — Amer. bor.-orient.

K. angustifolia. Lin. — Amer. bor.-orient. (p. sept. et cent.).

Var. : *rubella*.

" *rubra nana*.

K. glauca. Ait. — Amer. bor.-orient. (pars sept. et centr.).

(*K. polifolia*. Wangenh.)

RHODOTHAMNUS. RCHB. (1827)

R. Chamœcystus. Rchb. — Austr. et Bavar. alpest.

(*Rhododendrum*. Lin.)

LEIOPHYLLUM. PERS. (1805)

1. *Euleiophyllum*. Dipp.

L. buxifolium. Elliot. — Amer. bor.-orient.

(*L. serpyllifolium*. D.C. — *L. thymifolium*. G. Don. — *Ledum buxifolium*. Berg. — *Amyrsine buxifolia*. Pursh. — *Dendrium buxifolium*. Devis. — *Fischera buxifolia*. Swartz. — *Cladothamnus buxifolius*. Baill.)

LEDUM. RUPP. ex LIN. (1735)

L. palustre. Lin. — Eur. bor. et med.; As. bor.; Amer. arct.

L. latifolium. Ait. — Amer. bor. (pars sept.).

(*L. groenlandicum*. Retz. — *L. canadense*. Lodd.)

RHODODENDRUM. LIN. (1753)

1. *Eurhododendrum*. Maxim.

R. ponticum. Lin. — Penins.; Hiber.; As. min.; Armen.

(*R. lancifolium*. Mœench. — *R. speciosum*. Salisb. — *R. myrtifolium*. Lodd. — *R. obtusum*. Wats.)

R. catawbiense. Mchx. — Amer. bor.-orient. (pars centr.).

R. hybridum. Hort.

Variet. plurim.

R. californicum. Hook. — Amer. bor.-occid.

R. corymbosum. Pallas. — Asia bor.-orient.

(*R. flavum*. Pall. — *R. officinale*. Salisb.)

R. caucasicum. Pall. — Reg. Caucas.; Oriens.

R. punctatum. Andr. — Amer. bor.-orient. (pars centr.).

(*R. minus*. Mchx.)

R. Dalhousiæ. G. D. Hook. — Reg. Himal.

R. Falconeri. G. D. Hook. — Reg. Himal.

R. cupreum ? — Reg. Himal.

R. calophyllum. Nutt. — Reg. Himal.

3. *Osmothamnus*. Maxim.

R. hirsutum. Lin. — Eur. alpest.

- R. ferrugineum.** Lin. — Europ. alpest.
R. myrtifolium. Schott. et Kotsch. — Mont. Karpath.
 4. *Azalea. Maxim.*
R. occidentale. As. Gray. — Californ.
 (*Azalea calendulacea.* Hook et Arn. — *Azalea occid.* Torr. et Gray)
R. viscosum. Torr. — Amer. bor.
 (*Azalea.* Lin. — *Anthodendron.* Rehb.)
R. canadense. Dipp. — Amer. bor. (pars sept.).
 (*R. pulchellum.* Salisb. — *Rhodora canadensis.* Lin. — *Rhodora congesta.* Mönch.)
R. Vaseyi. As. Gray. — Amer. bor. (pars centr.).
R. arborescens. Torr. — Amer. bor.
 (*Azalea.* Pursh.)
 5. *Tsusia. Maxim.*
R. rosmarinifolium. Dipp. — China; Japon.
 (*R. leucanthum.* Bnge. — *R. ledifolium* et *R. mucronatum.* G. Don. — *Azalea rosmarinifolia.* Burm. — *Azalea alba.* Sweet. — *Azalea mucronata.* Blm. — *Azalea ledifolia.* Hook.)
R. amænum. Planch. — China.
 (*Azalea.* Lindl. — *Azalea Buergeri.* Miq.)
R. obtusum. Planch. — China; Japon.
 (*Azalea obtusa.* Lindl. — *Azalea indica.* Thunb.)
 6. *Rhodorastrum. Maxim.*
R. Dahuricum. Lin. — Sibir. or.; China or.
R. racemosum. Franchet. — China occid.
 7. *Azaleastrum. Maxim.*
R. ovatum. Planch. — China.
 (*Azalea.* Lindl. — *Azalea myrtifolia.* Champ.)

Genus anomalum.

CLETHRA. GRONOV. EX LIN. (1753)

- C. alnifolia.** Lin. — Amer. bor.
 (*C. paniculata.* Ait. — *C. scabra.* Pers.)
 Var.: *tomentosa.*
 (*C. tomentosa.* Lamk. — *C. incana.* Pers.)
C. acuminata. Mchx. — Amer. bor. (pars centr. et merid.).
C. montana. Bartr.)
C. arborea. Soland. — Ins. Mader.
C. ferruginea. R. et Pav. — Peruvia.
 (*Cuellaria.* R. et Pav.)
-

LXXX. — EPACRIDEÆ

Trib. 1. — STYPHELIEÆ.

STYPHELIA. SM. (1802)

1. *Eustypelia*. Benth.**S. tubiflora**. Sm. — Austral.

CYATHODES. LABILL. (1804)

C. empetrifolia. Hook. fl. — Tasman.; Nov. Zel.(*Androstoma*. Hook. fl.)

LEUCOPOGON. R. BR. (1810)

1. *Perojoa*. Benth.**L. lanceolatus**. R. Br. — Austr.(*L. Cunninghamii*. R. Br. ex D.C. — *L. microphyllus*. F. Muell.
— *L. pimelæoides*. A. Cunn. — *L. australis*. Sieb.)**L. melaleucoides**. A. Cunn. — Austral.(*L. linifolius*. A. Cunn.)**L. Richei**. R. Br. — Austral.(*L. lanceolatus*. Sieber. — *Stypelia Richei*. Labill.)

Trib. 2. — EPACREÆ.

EPACRIS. FORST. (1773)

E. impressa. Labill. — Tasmania.(*E. ceræflora*. R. Grah. — *E. nivalis*. Lodd. — *E. nivea*. D.C.
— *E. ruscifolia*. R. Br. — *E. variabilis*. Lodd.)**E. paludosa**. R. Br. — Australia.**E. longiflora**. Cav. — Australia.(*E. grandiflora*. Willd. — *E. miniata*. Lindl.)Var. : *splendens*." *amæna*.**E. hyacinthiflora**. W. Smith. — Hab. ?**E. purpurascens**. R. Br. — Australia.(*F. onosmæflora*. A. Cunn. — *E. pungens*. Sims. — *Lysinema ruscifolium*. Sieb.)Var. : *nivalis*.**E. densiflora**. Hort. angl. — Hab. ?

LYSINEMA. R. BR. (1810)

L. pungens. R. Br. — Australia.(*Epacris odorata*. Sm. — *Epacris attenuata*. Lodd. — *Epacris pungens*. Cav. — *Ep. riparia*. Sieber. — *Ep. rosea*. Lodd.)

DRACOPHYLLUM. LABILL. (1790)

2. *Sphenotoma*. R. Br.**D. gracile**. R. Br. — Australia.(*Sphenotoma*. Sweet. — *Epacris*. Poir.)

LXXXI. — DIAPENSIACEÆ

Trib. 2. — GALACINEÆ.

SHORTIA. TORR. ET GRAY. (1838)

S. galacifolia. Torr. et Gray. — Amer. bor. (Carolina.)

GALAX. LIN. (1753)

G. aphylla. Lin. — Amer. bor.(*Blandfordia cordata*. Andr. — *Erythrorhiza rotundifolia*.
Mchx.)

LXXXII. — PLUMBAGINEÆ

Trib. 1. — STATICEÆ.

ACANTHOLIMON. BOISS. (1846)

A. glumaceum. Boiss. — Armenia.(*A. Hohenackeri*. Ledeb.)**A. venustum**. Boiss. — Asia minor.

STATICE. LIN. (1753) (PR. P.)

1. *Schizopetalum*. Bois.**S. arborescens**. Brouss. — Teneriffe.**S. profusa**. Hort. — Hab. ?3. *Limonium*. Benth. et Hook.**S. Limonium**. Lin. — Europa.**S. lychnidifolia**. Girard. — Eur. austr.(*S. Willdenowiana*. Poir.)

ARMERIA. WILLD. (1809)

A. maritima. Willd. — Europa.(*Statice linearifolia* et *Statice maritima*. Later. — *Statice caespitosa*. Poir.)

A. mauritanica. Wallr. — Afr. bor.

(*A. Cephalotes*. Poir. — *Statice Pseudo-Armeria*. Desf. — *Statice lusitanica*. Poir.)

LIMONIASTRUM. MCENCH. (1794)

L. articulatum. Mönch. — Reg. mediter.

(*L. monopetalum*. Boiss. — *Bubania monepetala*. Girard.)

Trib. 2. — PLUMBAGEÆ.

PLUMBAGO. TOURN. ex LIN. (1753)

1. *Plumbagidium*. Spach.

P. capensis. Thunb. — Afr. austr.

(*P. auriculatum*. Spach.)

CERATOSTIGMA. BNGE. (1835)

C. plumbaginoïdes. Bnge. — China.

(*Plumbago Larpentæ*. Lindl. — *Valoradia Larpentæ*. Boiss.)

LXXXIII — PRIMULACEÆ

Trib. 2. — PRIMULACEÆ.

PRIMULA. LIN. (1753)

1. *Primulastrum*. Schott.

P. sinensis. Lindl. — China.

(*Auganthus prænitens*. Link. — *Oscaria sinensis*. Lilja.)

Var. : fimbriata.

et *altæ hortenses*.

P. cortusoïdes. Lin. — Sibiria.

(*Oscaria*. Lilja.)

P. japonica. As Gray. — Japon.

P. sikkimensis. Hook. — Reg. Himal. orient.

P. farinosa. Lin. — Europa.

(*P. scottica*. Hook.)

2. *Auriculastrum*. Schott.

P. Auricula. Lin. — Europa.

Varietates hort. permultæ.

P. marginata. Curt. — Europ. alp.

(*Aretia crenata*. Link.)

P. clusiana. Tausch. — Austria alpest.

SOLDANELLA. LIN. (1753)

S. montana. Willd. — Europ. media alpest.

DODECATHEON. LIN. (1756)

D. Meadia. Lin. — Amer. bor. et arct.

(*Meadia Dodecatheon*. Mill.)

Trib. 3. — **LYSIMACHIEÆ.**

CYCLAMEN (TOURN.) LIN. (1753)

C. europæum. Lin. — Europ.; Reg. Caucas.

(*Cyclaminus*. Scop.)

C. africanum. Broiss. et Reut. — Afr. bor.

LYSIMACHIA. (TOURN.) LIN. (1753).

7. *Lysimachia*. Spach.

L. verticillata. Bieb. — Reg. Caucas.

L. clethroides. Duby. — Japon.

(*L. Ephemerum*. Thunb.)

L. Nummularia. Lin. — Europ.

(*Nummularia prostrata*. Opiz. — *Nummularia repens*. Gilib.)

LXXXIV. — MYRSINEÆ

Trib. 2. — **EUMYRSINEÆ.**

MYRSINE. LIN. (1753)

M. africana. Lin. — Reg. Himal.; Afr. austr.; Ins. Açor.

ARDISIA. SW. (1788)

A. Japonica. Bl. — Japon; China.

(*A. odontophylla*. Lindl. — *Bladia japonica*. Hornst.)

A. longifolia. Mart. ex Miq. — Bras.

LXXXV. — SAPOTACEÆ

Subord. 1. — DYSSAPOTEÆ.

Trib. 2. — CHRYSOPHYLLÆ.

CHRYSOPHYLLUM. LIN. (1753)

2. *Caïnito. A.D.C.*

C. imperiale. Benth. — Brazil.

(*Theophrasta*. Lind.)

C. glabrum. Jacq. — Ins. Martin.

Subord. 2. — SAPOTEÆ.

Trib. 4. — POUTERIEÆ.

LUCUMA. MOLINA. (1782)

L. deliciosa. Planch et Lind. — Nov. Granat.

(*Achras Lucuma*. R. et Pav.)

Trib. 5. — SIDEROXYLEÆ.

ARGANIA. RÆM. ET SCHLECHT (1819)

A. Sideroxylon. Rœm. et Schlecht. — Mauritania.

(*Sideroxylon spinosum*. Lin. — *Elæodendron Argan*. Retz)

Trib. 6. — BUMELIEÆ.

BUMELIA. SW. (1788)

B. tenax. Willd. — Amer. bor. or. (pars meridionalis.)

(*B. chrysophylloides*. Pursh. — *Sideroxylon tenax*. L. Mant. —
Sideroxylon sericeum. Wallt. — *Chrysophyllum carolinense*. Jacq.)

B. lycioides. Pers. — Amer. bor. (pars merid.).

(*Syderoxylon lycioides*. Lin. — *Sideroxylon læve*. Walld.)

LXXXVI. — EBENACEÆ

ROYENA. LIN. (1753)

R. lucida. Lin. — Afr. austr.

EUCLEA. MURR. (1772)

E. undulata. Thunb. — Afr. austr.*(E. myrtina. Burch. — E. humilis. Eckl. et Zey.)*

DIOSPYROS. LIN. (1753)

10. *Danzleria. Hiern.***D. Lotus.** Lin. — Reg. Caucas.; As. minor. et China.*(Dactylus trapezuntinus. Forsk.)***D. virginiana.** Lin. — Amer. bor. (pars centralis et merid. .)*(D. concolor. Mönch.)*14. *Cavanillea. Hiern.***D. Kaki.** Lin. fl. — Japon et China septentr.*(D. chinensis. Blume. — D. Schi-tse. Bng. — D. Japonica.**Sieb. et Zucc. — Embryopteris Kaki. G. Don.)**Var. : costata.**et altræ hort. plurimæ.*

LXXXVII. — STYRACEÆ.

HALESIA. LIN. (1753)

H. tetraptera. Lin. — Amer. bor. (pars merid.).**H. hispida.** Benth et Hook. — Japon.*(Pterostyrax. Sieb. et Zucc.*

STYRAX. (TOURN.) LIN. (1753)

S. japonica. Sieb. et Zucc. — Japon merid.**S. Obassia.** Sieb. et Zucc. — Japon.

LXXXVIII. — OLEACEÆ

Trib. 1. — JASMINEÆ.

JASMINUM. (TOURN.) LIN. (1753)

J. nudiflorum. Lindl. — China borealis.**J. revolutum.** Sims. — Reg. Himal.*(J. Chrysanthemum. Roxb. — J. flavum. Sieb.)***J. grandiflorum.** Lin. — Reg. Himal.**J. Sambac.** Soland. — As. trop.*(Mogorium gimea. Zuccagena. — Mogorium undulatum. Lamk.)***J. odorantissimum.** Lin. — Ins. Fortun.

Trib. 2. — SYRINGEÆ.

FORSYTHIA. VAHL. (1804)

- F. viridissima.** Lindl. — China.
F. suspensa. Vahl. — China; Japon.
 (*Syringa suspensa*. Thunb. — *Lilac perpensa*. Lamk.)
F. intermedia. Zabel. — (Stirps hybrida.)
 (*F. suspensa*. × *F. viridissima*.)
F. Fortunei. Lindl. — China.

SYRINGA. LIN. (1753)

1. *Eusyringa*. C. Koch.
S. vulgaris. Lin. — Europ. med.; Oriens.
 (*Lilac vulgaris*. Lamk.)
 Var. : alba.
 " purpurea.
 " purpurea major.
 et altræ hortens.
S. oblata. Lindl. — China bor.
S. dubia. Pers. — (An species?).
 (*S. chinensis*. Willd. — *Lilac Varina*. Dum. Cours.)
S. persica. Lin. — Reg. Caucas. orient.
 (*Lilac*. Lamk. — *Lilac minor*. Monch.)
S. Josikæa. Jacq. fl. — Hungaria.
S. Emodi. Wall. — Reg. Himal.
S. villosa. Vahl. — China bor.
 (*S. pubescens*. Turcz.)
 2. *Ligustrina*. Maxim.
S. amurensis. Rup. — Reg. Amur.; Dsungaria.
 (*Ligustrina*. Rgl.)

Trib. 3. — FRAXINEÆ.

FRAXINUS. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Ornus*. Pers.
F. Bungeana. A.D.C. — China.
 (*F. floribunda*. Bge. — *F. obovata*. Bl. — *Fr. chinensis*. Herd.)
F. Marlesii. J. D. Hook. — China (Prov. Kiu-Kiang.).
F. Ornus. Lin. — Eur. aust.; Oriens.
 (*F. paniculata*. Mill. — *F. florifera*. Scop. — *Ornus europea*. Pers.)
 Var. : latifolia.
 2. *Sciadhanthus*. Coss. et Dur.
F. xanthoxyloides. Wall. — Reg. Himal.; Afghanist.
 (*Ornus*. G. Don.)

F. dimorpha. Coss. et Dur. — Afr. bor.

3. *Fraxinaster*. D.C.

F. americana. Lin. — Amer. bor. or.

(*F. alba*. Marsh. — *F. novæ Angliæ*. Wangenh. — *F. acuminata*.
Lamk. — *F. canadensis*. Gærtn. — *F. juglandifolia*. Willd.)

Var. : eiptera.

F. pubescens. Lamk. — Amer. bor.

(*F. novæ Angliæ*. Du Roi. — *F. pensylvanica*. Marsh. —
F. tomentosa. Mchx.)

Var. : aucubæfolia (foliis aureo-variegatis).

F. viridis. Mchx. — Amer. bor.

(*F. expans*. Willd. — *F. concolor*. Mühlenb. — *F. caroliniana*.
Pursh.)

F. Oregona. Nutt. — Amer. bor.-occid.

(*F. latifolia*. Booth.)

F. excelsior. Lin. — Eur. et Asia occ.

(*F. apetala*. Lamk.)

Var. : atrovirens.

" monophylla.

(*F. heterophylla*. Vahl.)

Var. : pendula.

" jaspidea (Desf.)

F. sogdiana. Bnge. — Turkest.

F. raibocarpa. Rgl. — Turkest. mont.

FONTANESIA. LABILL. (1791)

F. phillyreoides. Labill. — Syria.

F. Fortunei. Carr. — China bor.

Trib. 4. — OLEINEÆ.

PHILLYREA. (TOURN.) LIN. (1753)

P. latifolia. Lin. — Eur. aust.; Afr. bor.

P. angustifolia. Lin. — Eur. aust.; Afr. bor.

(*P. lanceolata* et *P. brachiata*. Ait.)

P. Decora. Boiss et Bal. — Oriens.

(*P. Vilmoriniana*. Boiss.)

OSMANTHUS. LOUR. (1790)

O. fragrans. Lour. — China et Japon; Reg. Himal.

(*Olea*. Thunb.)

O. Aquifolium. Siebold. — Japon.

(*Olea aquifolia*. Sieb. et Zucc. — *Olea ilicifolia*. Hassk. — *Ilex*
aquifolium, var. *heterophylla*. Bl.)

Var. : rotundifolius.

" ilicifolius.

CHIONANTHUS. ROYEN. ex LIN. (1753)

C. virginica. Lin. — Amer. bor. or. (pars centr. et merid.)
(*C. trifida*. Mönch.)

Var. : *latifolia*.

(*C. montana*. Pursh.)

C. retusa. Lindl. — China et Japon.

NOTELÆA. VENT. (1803)

N. excelsa. Webb. et Bert. — Ins. Canar.

(*Picconia excelsa*. D.C.)

OLEA. (TOURN.) LIN. (1753)

O. europea. Lin. — Oriens.

LIGUSTRUM (TOURN.) LIN. (1753)

L. vulgare. Lin. — Europ.

L. Quihoui. Carr. — China.

L. Stauntoni. D.C. — China.

(*L. chinense* et *L. chinense nanum*. Carr.)

L. compactum. Hook. et Thoms. — Reg. Himal.

(*L. longifolium* et *L. lancifolium*. Carr.)

L. lucidum. Ait. — China.

(*Ligustridium japonicum*. Spach.)

Var. : *coriaceum*.

L. obtusifolium. Sieb. et Zucc. — Japon.

(*L. Ibota*. Sieb. — *L. vulgare*. Thunb.)

L. Ibota. Sieb. et Zucc. — Japon.

(*L. amurense*. Carr.)

Var. : *ciliatum*.

“ *obovatum*.

L. ovalifolium. Hassk. — Japonia.

Var. : *foliis aureo-variegatis*.

L. Massalongianum. Visiani. — India (Nillgheries).

LXXXIX. — SALVADORACEÆ

SALVADORA. LIN. (1793)

S. persica. Lin. — Oriens.

XC. — APOCYNACEÆ

Trib. 1. — CARISSEÆ.

CARISSA. LIN. (1767)

2. *Arduina*. A.D.C.

C. grandiflora. A.D.C. — Afr. austr.

(*Arduina*. E. Mey.)

C. Arduina. Lamk. — Afr. austr.

(*C. bispinosa*. Desf. — *Arduina bispinosa*. L. Mant.)

ACOKANTHERA. G. DON. (1837)

A. spectabilis. Hook. fil. — Afr. austr.

(*Toxicophlœa*. Harv.)

A. venenata. G. Don. — Afr. austr.

(*Toxicophlœa Thunbergii*?)

Trib. 2. — PLUMERIEÆ.

THEVETIA. LIN. (1753)

T. nerifolia. Juss. — Ind. occ. (forsé Amer. trop. et subtr.?)

(*Cerbera Thevetia*. Lin. — *Cerbera peruviana*. Pers.)

VINCA. LIN. (1753)

V. herbacea. Walld. — Eur. orient.

V. minor. Lin. — Eur. med.

(*Pervinca*. All.)

V. major. Lin. — Eur. austr.

Trib. 3. — ECHITIDEÆ.

MALOUETIA. A.D.C. (1844)

M. asiatica. Sieb. et Zucc. — Japon.

Var. : foliis variegatis.

PARSONSIA. R. BR. (1809)

P. albiflora. Raoul. — Nova Zeland.

(*P. heterophylla*. A. Cunn. — *P. capsullaris*. Endl. — *F. Fors-
teri*. G. Don.)

NERIUM. LIN. (1753)

P. Oleander. Lin. — Reg. medit.

Var. : roseum duplex.

APOCYNUM. (TOURN.) LIN. (1753)

A. androsæmifolium. Lin. — Amer. bor.

TRACHELOSPERMUM. CH. LEM. (1847)

T. jasminoides. Ch. Lem. — China.

(*Rhynchospermum*. Lindl. — *Parechites adnascens*. Hance. —
Parechites Thunberghii. As. Gray.)

T. japonicum. Sieb. — Japon.

Var : aureo maculatum.

MANDEVILLA. LINDL. (1840)

M. suaverolens. — Reg. argent.

(*Echites*. A. D. C. — *Ambryanthera*. Muell.)

XCI. — ASCLEPIADEÆ

Trib. 1. — PERIPLOCEÆ.

PERIPLOCA. (TOURN.) EX LIN.

P. græca. Lin. — Eur. austr.; Oriens.

Trib. 3. — CYNANCHEÆ.

ARAUJIA. BROT. (1818)

A. sericifera. Brot. — Peruvia.

(*Physianthus albens*. Mart.)

SCHUBERTIA. MART. ET ZUCC. (1824)

S. graveolens. Lindl. — Brazil.

(*S. Grahamii*. Dene. — *Physianthus auricomus*. Gräh.)

OXYPETALUM. R. BR. (1809)

O. cæruleum. Dene. — Brazil.

(*Tweedia*. G. Don.)

GOMPHOCARPUS. R. BR. (1809)

G. arborescens. R. Br. — Afr. austr.

(*Asclepias*. L. Mant. — *A. pubescens*. L. Mant.)

ASCLEPIAS. LIN. (1753)

A. tuberosa. Lin. — Amer. bor.

A. incarnata. Lin. — Amer. bor.
(*A. maritima*. Raf. — *A. verecunda*. Salisb.)

METAPLEXIS. R. BR. (1809)

M. Stauntonii. Roem. et Schult. — China bor. et Japon
(*M. rostellata*. Turcz. — *Urostelma chinensis*. Bnge.)

Trib. 5. — MARSDENIÆ.

MARSEENIA. R. BR. (1809)

M. erecta. R. Br. — Eur. orient.; Oriens.
(*Cynanchum*. Lin. — *Pergularia*. Spreng. — *Cionura*. Grieseb.
— *Koelreuteria completa* et *K. procumbens*. Medik.)

STEPHANOTIS. THOU. (1806)

S. floribunda. A. Brong. — Madagasc.

PERGULARIA. L. MANT. (1767)

P. minor. Ander. — As. trop.
(*P. odoratissima*. Roxb. — *Asclepias odoratissima*. Roxb.)

HOYA. R. BR. (1809)

H. carnos. R. Br. — As. et Austr. trop.
(*Asclepias*. Lin. fl.)

H. multiflora. Bl. — Archip. malay.
(*Cyrtoceras reflexum*. Benn. — *Cyrtoceras floribundum* Maund.
— *Centrostemma Cyrtoceras* Meyss.)

Trib. 7. — STAPELIEÆ.

PODANTHES. HAW. (1812)

P. verrucosa. Haw. — Afr. austr.
(*Stapelia*. Mass.)

STAPELIA. LIN. (1753)

3. *Stapletonia*. D.C.

S. grandiflora. Mass. — Afr. austr.

S. gigantea. N. E. Brown. — Afr. austr.

4. *Tromotriche*. Haw.

S. revoluta. Mass. — Afr. austr.

5. *Orbea*. Haw.

S. variegata. Lin. — Afr. austr.

Var. : *cristata*.

- S. anguina.** Jacq. — Afr. austr.
S. Ackermani?
-

XCII. — LOGANIACEÆ

Trib. 1. — GELSEMIÆ.

GELSEMIUM. JUSS. (1789)

- G. sempervirens.** Ait. — Amer. bor. (pars merid.; Mexico.
(G. nitidum, Mchx. — G. lucidum, Poir. — Bignonia sempervirens, Lin. — Lisianthus sempervirens, Mill. — Anonymos sempervirens, Walt.))

Trib. 2. — EULOGANIÆ.

SPIGELIA. LIN. (1753)

- S. marylandica.** Lin. — Amer. bor. (pars centr.).

CHILIANTHUS. BURCH. (1822)

- C. oleaceus.** Burch. — Afr. austr.
(C. arborescens, Benth. — Buddleia salicifolia, Jacq ?)

BUDDLEIA. LIN. (1753)

- B. globosa.** Lamk. — Chili alp.
(B. capitata, Jacq.)
B. madagascariensis. Lamk. — Madagascar.
(B. heterophylla, Lindl.)
B. Lindleyana. Fortune. — China.
B. curviflora. Hook. et Arn. — Archip. Loo-Choo.
B. intermedia. Carr. — (Stirps hybrida).
B Lindleyana. × B. curviflora.)
B. brasiliensis. Jacq. fil. — Brazil.
(B. australis, Vell.)

DESFONTAINIA. R. ET PAV. (1794)

- D. spinosa.** Hook. — Patagonia.
(D. Hookeri, Dun.)
-

XCI. — GENTIANÆ

Trib. 2. — CHIRONIÆ.

CHIRONIA. LIN. (1753)

- C. floribunda.** Paxt. — Afric. austr.

- C. linoïdes.** Lin. — Afric. austr.
 (*C. vulgaris*. Cham. — *Ch. amœna*. Salisb. — *C. baccifera*. Zey.
 ex Griseb. — *C. uniflora*. Eckl. — *Onesera coccinea*. Raf.)
- C. frutescens.** Lin. — Afric. austr.
 (*C. decussata*. Vent. — *C. angustifolia*. Sims.)
- C. glutinosa.** Paxt. — Australia ?
- C. exigua.** Oliver in Hook. — Afr. austr.

Trib. 3. — SWERTIÆ.

GENTIANA. TOURN. EX LIN.

- G. lutea.** Lin. — Europa ; Asia minor.
- G. bavarica.** Lin. — Europa.
 (*G. serpyllifolia*. Lamk. — *Hippion bavaricum*. Schmidt. —
Ericoila bavarica. Borkh.)
- G. asclepiadea.** Lin. — Eur. austr.; Reg. Caucas.
 (*Pneumonanthe*. Schmidt. — *Coilanthe*. Don.)
- G. septemfida.** Pall. — Oriens; As. bor.
 (*Pneumonanthe*. Schmidt.)

XCIV. — POLEMONIACEÆ

PHLOX. LIN. (1753)

- P. subulata.** Lin. — Amer. bor.
 (*P. setacea*. Lin. — *P. aristata*. Lodd. — *P. Hentzii*. Nutt.)
- P. paniculata.** Lin. — Amer. bor.
 (*P. acuminata*. Pursh. — *P. undulata*. Ait. — *P. cabra*. Sw.)
Variet. hort.
- P. Drummondii.** Hook. — Texas.
Variet. hort.

POLEMONIUM. (TOURN.) LIN. (1753)

- P. cœruleum.** Lin. — Reg. bor. temp.
 (*P. acutiflorum*. Willd. — *P. capitatum*. Benth. — *P. humile*.
 Turcz. — *P. villosum*. Rudolph.)
Var. : himalaycum.)

CANTUA. JUSS. (1789)

- C. bicolor.** Lem. — Bolivia.
- C. buxifolia.** Lamk. — Peruvia.
 (*C. dependens*. Pers. — *C. tomentosa*. Cav. — *Periphragmos*
dependens. R. et Pav.)

COBÆA. CAV. (1791)

C. scandens. Cav. — Mexico.

XCV. — HYDROPHYLLACEÆ

Trib. 3. — NAMEÆ.

WIGANDIA. H. B. et K. (1818)

W. caracasana. Kunth. — Amer. trop. mont
(*Hydrolea*. Steud. — *Hydrolea mollis*. Willd.)

XCVI. — BORAGINEÆ

Trib. 3. — HELIOTROPIEÆ.

TOURNEFORTIA. LIN. (1753)

T. cordifolia. Ed. André. — Amer. trop. (Ecuador).

HELIOTROPIUM. (TOURN.) LIN. (1753)

2. *Euheliotropium*. Benth.

H. peruvianum. Lin. — Peruvia.
(*H. odorum*. Salisb.)

Var. *hortens*.

H. incanum. Ruiz. et Pav. — Ecuador.
Var. *hortens*.

Trib. 4. — BORAGEÆ.

LINDELOFIA. LEHM. (1850)

L. spectabilis. Lehm. — Reg. Himal.
(*Anchusopsis longiflora*. Bisch.)

MYOSOTIDIUM. HOOK. (1853)

M. nobile. Hook. — Ins. Chatam.

ANCHUSA. LIN. (1753)

A. Italica. Retz. — Reg. medit.
(*A. azurea*. Mill. — *Buglossum amœnum*. Gærtn. — *Buglossum cœruleum*. Pers.)

MERTENSIA. ROTH. (1797)

- M. sibirica.** G. Don. — Siber. or.; Amer. bor.-occ.
(*Pulmonaria* Lin. — *Pulmonaria bracteata*. Willd. — *Lithospermum Pallasii*. Ledeb.)

MYOSOTIS. (TOURN.) DILL. ex LIN.

- M. palustris.** Lamk. — Eur. As. et Amer. bor.
(*M. scorpioides*. Willd. — *M. perennis* Mönch.)

LITHOSPERMUM. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Eulithospermum*. D.C.

- L. fruticosum.** Lin. — Eur. austr.

MACROTOMIA. D.C. IN MEISSN. (1846)

- M. echioides.** Boiss. — Oriens.
(*Arnebia*. A.D.C. — *Lycopsis*. Lin. — *Anchusa*. Bieb. — *Lithospermum setosum*. Fisch. et Mey.)

ECHIUM. TOURN. ex LIN. (1753)

- E. candicans.** Lin. fil. — Ins. Canar.

ONOSMA. LIN. (1762)

- O. stellulatum.** Waldst et Kit. — Eur. orient.; Oriens.
(*Onosma tauricum*. Pall.)

XCVII. — CONVULVULACEÆ

Trib. 1. — CONVULVULÆ.

IPOMÆA. LIN. (1753)

Ser. A.

- I. versicolor.** Meissn. — Am. trop.
(*Mina lobata*. Cerv. — *Pharbitis cuspidata*. G. Don. — *Pharbitis speciosa*. Choisy.)

Ser. B.

- I. Learii.** Paxt. — Am. austr.
(*Pharbitis*. Lindl.)

CALYSTEGIA. R. BR. (1810)

- C. hederacea.** Wall. — Ind. or.; China; Afghanist.
(*C. pubescens*. Lindl. — *Convolvulus acetosifolius*. Turcz.)

CONVOLVULUS. (TOURN.) LIN. (1753)

- C. lineatus.** Lin. — Eur. austr.; As. temp.
 (*C. humilis*. Salisb. — *C. spicæfolius*. Desr. — *C. Besseri*.
 Spreng. — *C. Gerardi*. Rœm. et Schult.)
- C. oleæfolius.** Desv. in Lamk. — Oriens.
 (*C. linearis*. Curt. — *C. Cneorum*. Sprun. — *C. Tournefortii*.
 Sieb.)
- C. mauritanicus.** Boiss. — Afr. bor.

XCVIII. — SOLANACEÆ

Trib. 1. — SOLANEÆ.

SOLANUM. LIN. (1753)

1. *Pachystemonum*. Dunal.
- S. venustum.** Kunth. — Amer. trop.
 (*S. Seaforthianum*. Andr.)
- S. laciniatum.** Ait. — Nova Zelandia.
 (*S. pinnatifidum*. Lamk.)
- S. Dulcamara.** Lin. — Eur. austr.; As. med.
 (*Dulcamara flexuosa*. Mœnch. — *Lycopersicum Dulcamara*.
 Medik.)
- S. jasminoides.** Paxt. — Hab. ?
2. *Leptostemonum*. Dunal.
- S. Pseudo-Capsicum.** Lin. — Ins. Mader.
 (*S. capsicastrum*. Lin.)
- S. quitoense.** Kunth. — Ecuador.
 (*S. angulatum*. R. et Pav.)
- S. Rantonettii.** Carr. — Hab. ?
- S. ciliatum.** Lamk. — Brazil.
 Var. : macrocarpa.
- S. albidum.** Dunal. — Am. trop. (Ecuador).
 Var. : Poortmani.
- S. argenteum.** Dunal. — Brazil.
- S. Wendlandi.** Hook. — Am. trop. (Costa-Rica).
- S. Amazonicum.** Ker. Gawl. — Mexico.
 (*Nycterium*. Sims. — *Nycterium Lamberti*. Lindl.)

PHYSALIS. LIN. (1753)

- P. Alkekengi.** Lin. — Eur. austr. et Japon.
 (*Alkekengi officinarum*. Mœnch. — *Megista maxima*. Fourr.)

IOCHROMA. BENTH. (1845)

I. tubulosa. Benth. — Nova Granata.

(*Habrothammus cyaneus*. Lindl. — *Meyenia cyanea*. Heyn.)

I. coccinea. Scheidw. — Mexico.

Trib. 2. — ATROPEÆ.

LYCIUM. LIN. (1753)

L. halimifolium. Mill. — Eur. med. et austr.; As. or.; Afr. bor.

(*L. europæum*. Goua. — *L. barbarum*. Spreng. — *L. turbinatum*. Poir.)

L. carolinianum. Walld. — Amer. bor.

L. sinense. Mill. — China med.

(*L. Trevianum*. Rœm. et Schult. — *L. barbarum*. Lour.)

L. Afrum. Lin. — Reg. medit.; Afr. bor.

SOLANDRA SWARTZ.

S. grandiflora. Swartz. — Ind. occ.

(*S. scandens*. Willd. — *Datura sarmentosa*. Lin. — *Sicartzia grandiflora*. Gmel.)

Trib. 3. — HYOSCYAMEÆ.

DATURA. LIN. (1753)

1. *Brugmansia*. Bernh.

D. sanguinea. R. et Pav. — Am. austr.

(*Brugmansia bicolor*. Pers.)

D. cornigera. Hook. — Mexico.

D. flava. Hort. Kew. — (An species ?)

Trib. 4. — CESTRINEÆ.

JUANULLOA. RUIZ ET PAV. (1794)

J. aurantiaca. Otto et Dietr. — Mexico.

(*J. Hookeriana*. Miers. — *J. parasitica*. Hook. — *Brugmansia floribunda*. Paxt.)

CESTRUM. LIN. (1753)

C. nocturnum. Lin. — Amer. austr.

(*C. fetidissimum*. Jacq.)

C. Parqui. L'Herit. — Amer. austr. (Chili et Reg. argent.).

(*C. virgatum*. Ruiz et Pav.)

C. aurantiacum. Lindl. — Guatemala.

(*Habrothamnus*. Seem.)

C. Regelii. Planch. — Guatemala.

(*Habrothamnus aurantiacus*. Rgl.)

C. Warszewiczii. Klotzsch. — Am. austr.

C. fasciculatum. Miers. — Mexico.

(*Habrothamnus elegans*. Scheidw. — *Habrothamnus fasciculatus*. Brong. — *Habrothamnus purpureus*. Lindl.)

C. Endlicheri. Miers. — Peruvia.

(*Habrothamnus corymbosus*. Endl. — *Meyenia corymbosa*. Schlecht.)

C. Hartwegi. Dun. — Mexico.

(*Habrothamnus fasciculatus*. Benth. — *Meyenia fasciculata*. Schlecht.)

FABIANA. R. ET PAV. (1794)

F. imbricata. Ruiz. et Pav. — Chili et Peruv. andin.

NICOTIANA. LIN. (1753)

N. colossea. Ed. André. — Brazil.

Trib. 5. — SALPIGLOSSIDEÆ.

PETUNIA. JUSS. (1803)

P. violacea. Lindl. — Peruvia.

(*Nierembergia phænicea*. D. Don. — *Salpiglossis integrifolia*. Hook.)

Var. *hortens et hybrid.*

NIEREMBERGIA. R. ET PAV. (1794)

N. gracilis. Hook. — Reg. argent.

Var. : *grandiflora alba.*

BROWALLIA. LIN. (1753)

B. speciosa. Hook. — Nov. Granat.

STREPTOSOLEN. MIERS. (186..)

S. Jamesoni. Miers. — Nov. Granat.

(*Browallia*. Benth.)

BRUNFELSIA. PLUM. EX LIN.

B. macrophylla. Benth. — Brazil.

(*Franciscea*. Cham. et Schlecht. — *Franciscea eximia*. Lem. ?)

XCIX. — SCROPHULARINEÆ

Trib. 3. — VERBASCEÆ.

VERBASCUM. LIN. (1753)

V. Chaixii. Vill. — Eur. med.; Hispan.

(*V. orientale*. Bieb. — *V. urticæfolium*. Lamk.)

CELSIA. LIN. (1753)

2. *Arcturus*. Benth.

C. cretica. Lin. fl. — Reg. medit.

(*Verbascum lyratum*. Lamk.)

Trib. 4. — CALCEOLARIEÆ.

CALCEOLARIA. LIN. (1771)

2. *Jovellana*. Benth.

C. punctata. Vahl. — Peruvia.

(*Jovellana*. R. et Pav. — *Bæa punctata*. Pers.)

3. *Eucalceolaria*. Benth.

C. integrifolia. Murr. — Chili.

(*C. rugosa*. R. et Pav. — *C. ferruginea*. Colla. — *C. salviæfolia*. Pers. — *C. angustifolia*. Sweet.)

Var. *hortens. plur.*

C. corymbosa. Ruiz et Pav. — Chili.

(*C. Wheeleri*. Sweet.)

Var. *hybridæ et hortenses.*

Trib. 5. — HEMIMERIDEE.

ALONSOA. R. ET PAV. (1798)

A. incisæfolia. R. et Pav. — Amer. austr.

(*A. urticæfolia*. Steud. — *Celsia urticæfolia*. Sims. — *Hemimeris urticæfolia*. Willd. — *Hem. intermedia*. Lodd.)

Trib. 6. — ANTIRRHINEÆ.

ANTIRRHINUM. TOURN. EX LIN.

2. *Antirrhinastrum*. Chav.

A. majus. Lin. — Reg. medit.

(*A. italicum*. Mill. — *A. murale*. Salisb. — *A. rhodium*. Boiss. — *Orontium majus*. Pers.)

Var. *hortens. plur.*

MAURANDIA. ORTEG. (1791)

1. *Eumaurandia*. Benth.
M. Barclayana. Lindl. — Mexico.
 3. *Lophospermum*. Benth.
M. scandens. As. Gray. — Mexico.
 (*Lophospermum*. D. Don.)

RHODOCHITON. ZUCC. (1832)

- R. volubile**. Zucc. — Mexico.
 (*Lophospermum rhodochiton*. D. Don. — *Lophospermum atrosanguineum*. Zucc. — *Maurandia atrosanguinea*. Nicholson.)

Trib. 7. — CHELONEÆ.

PHYGELIUS. E. MEY. (1836)

- P. capensis**. E. Mey. — Afr. austr.

HALLERIA. LIN. (1753)

- H. lucida**. Lin. — Afr. austr. et trop.
 (*H. elliptica*. Thunb.)

FREYLINIA. PANGELLI ()

- F. cestroides**. Colla. — Afr. austr.
 (*F. lanceolata*. G. Don. — *Capraria cestroides*. Lin. fl.)

BOWKERIA. HARV. (1859)

- B. triphylla**. Harv. — Afr. austr.

PAULOWNIA. SIEB. ET ZUCC. (1835)

- P. imperialis**. Sieb. et Zucc. — Japon.
 (*Bignonia tomentosa*. Thunb. — *Incarvillea tomentosa*. Spreng.)

CHELONE. LIN. (1753)

- C. Lyonii**. Pursh. — Amer. bor.

PENTSTEMON. MITCH. (1748)

1. *Eupentstemon*. As. Gray.
P. Murrayanus. Hook. — Texas.
P. Hartwegi. Benth. — Mexico.
 (*P. coccineus*. Hoffmansg. — *P. gentianoides*. Lindl.)
 Var. *hortens*.
P. Cobæa. Nutt. — Amer. bor. occid.
P. spectabilis. Thunb. — California.

2. *Saccanthera*. As. Gray.**P. procerum**. Dougl. — Oregon.**P. pubescens**. Soland. — Amer. bor.(P. *hirsitus*. Willd. — P. *amplexicaulis*. Moench. — *Chelone Pentstemon*. Lin.)

RUSSELIA. JACQ. (179.)

R. juncea. Zucc. — Mexico.

UROSKINNERA. LINDL. (1857)

U. spectabilis. Lindl. — Guatemala.

DERMATOBOTRYS. BOLUS. ()

D. Saundersii. Bolus. — Afr. austr. (Natal; Zulul.).

Trib. 8. — MANULEÆ.

CHÆNOSTOMA. BENTH. (1835)

C. hispidum. Benth. — Afric. austr.(Manulea. Thunb. — *Manulea oppositiflora*. Vent.)

Trib. 9. — GRATIOLEÆ.

MIMULUS. LIN. (1753)

2. *Diplacus*. As. Gray.**M. glutinosus**. Wendl. — California.(M. *aurantiacus*. Curt. — M. *linearis*. Benth. — M. *viscosus*. Moench. — *Diplacus glutinosus*. Nutt. — *Diplacus aurantius*. G Don.)Var. : *punicæus*.3. *Eumimulus*. As. Gray.**M. cardinalis**. Dougl. — Amer. bor. occid.(M. *Maclainii*. Fergus. — *Erythranthe cardinalis*. Spach.)Var. *hortens*.**M. luteus**. Lin. — Amer. bor. occid.(M. *cupreus*. Rgl. — M. *nummularis*. C. Gay. — M. *rivularis*. Nutt.)Var. *hortens*.**M. moschatus**. Dougl. — Amer. bor. occid.(M. *inodorus*. Greene.)**M. Jeffrayanus**. Hort. angl. — ?

TORENIA. LIN. (1753)

T. asiatica. Lin. — Ind. or.

(*T. hians*. Roxb.)

T. edentula. Griff. — Arch. Malay.

Trib. 10. — DIGITALEÆ.

SIBTHORPIA. LIN. (1753)

S. europea. Lin. — Eur. austr.

Var. : foliis variegatis.

S. peregrina. Lin. — Ins. Mader.

(*Disandra prostrata*. Murr.)

OURISIA. COMM. EX JUSS. (1789)

O. coccinea. Pers. — Ins. Chiloë.

(*O. villosa*. Molina. — *Dichroma coccineum*. Cav.)

WULFENIA. JACQ. (17...)

W. Amherstiana. Hook. — Reg. Himal.

PÆDEROTA. LIN. (1753)

P. ageria. Lin. — Eur. austr. mont.

(*Wulfenia*. Sm. — *W. lutea*. Host.)

VERONICA. LIN. (1753)

1. *Hebe*. Benth.

V. elliptica. G. Forst. — Ins. Falkland.

(*V. decussata*. Soland. — *Hebe magellanica*. J. F. Gmel.)

V. speciosa. R. Cunn. — Nov. Zeland.

V. Lindleyana. Paxt. — Nov. Zeland.

V. anomala. Armst. — Nov. Zeland.

V. pinguifolia. Hook. fl. — Nov. Zeland.

V. Traversii. Hook. fl. — Nov. Zeland.

V. pimelæoides. Armst. — Nov. Zeland.

V. cupressoides. Lin. — Nov. Zeland.

V. vernicosa. Hook. fl. — Nov. Zeland.

V. Hendersonii ?

V. Andersonii. — (Stirps hybrida.)

(*V. speciosa*. R. Cunn. × *V. salicifolia*. Forst.)

3. *Pseudolysimachia*. Benth.

V. incana. Lin. — Russia.

(*V. canescens*. Chrad. — *V. neglecta*. Vahl.)

- V. latifolia.** Lin. — Eur. austr.
 6. *Veronicastrum.* Benth.
V. saxatilis. Lin. — Eur. mont.
-

C. — LENTIBULARIÆ

PINGUICULA. TOURN. EX LIN. (1753)

- P. caudata.** Schlecht. — Mexico.
 (*P. oblongifolia.* A. D. C.)
-

CI. — GESNERACEÆ

Trib. 1. — GESNEREÆ.

GLOXINIA. L'HERIT. (1785)

- G. maculata.** L'Herit. — Amer. austr.
 (*G. bicolor.* Pœp. — *Martynia perennis.* Lin. — *Escheria gloxinæfolia.* Rgl. — *Eucolum crassifolium.* Salisb.)

ACHIMENES. P. BROWNE. (1756)

1. *Trevirana.* Benth. et Hook.
A. grandiflora. D.C. — Mexico.
 (*A. Giesbrechtii.* Lindl. — *Trevirana grandiflora.* Schied.)
 Var. hort. et hybrid. plurimæ.
A. longiflora. D.C. — Mexico.
 (*A. Haageana.* Otto. — *Gesneria longiflora.* Moç. et Sess.)
 Var. hort. et hybrid. plurimæ.
A. patens. Benth. — Mexico.
 Var. : variabilis.
A. coccinea. Pers. — Ind. occid.
 (*A. purpurea.* Pritzel. — *A. pyropæa.* Goresl. — *Columnnea erecta.* Lamk. — *Trevirana coccinea.* Willd. — *Gesneria pulchella.* Sw. — *Cyrilla pulchella.* L'Herit.)
 Variet. hort. plur.
A. rosea. Lindl. — Guatemala.
 (*Trevirana rosea.* Dene.)
 2. *Locheria.* Benth. et Hook.
A. pedunculata. Benth. — Mexico.
 (*Locheria.* Rgl.)

A. tubiflora ? — Uruguay.

(*Dolichoderia*. Hanst. — *Gesneria*. Endl. — *Gloxinia*. Hook. —
Houttea. Hayne.)

Variet. hort.

A. Georgeana. Hort. belg. — Hab. ?

3. *Mandirola*. Benth. et Hook.

A. Scheeril. Hemsl. — Mexico.

(*Scheeria mexicana*. Seem.)

Var. : *cærulescens*.

NÆGELIA. RGL. (1848)

N. zebrina. Rgl. — Mexico.

(*Gesneria*. Paxt. — *Gloxinia punctata*. Mart. et Gall.)

Var. : *splendens*.

KÖELLIKERIA. RGL. (1848)

K. argyrostigna. Rgl. — Amer. trop.

(*Achimenes*. Hook.)

DICYRTA. RGL. (1849)

D. candida. Hanst. et Kl. — Guatemala.

(*Achimenes*. Lindl. — *Achimenes gracilis*. Warcs.)

GESNERA. LIN. (1753) (MART. 1829)

1. *Reichsteinera*. Benth. et Hook.

G. allagophylla. Mart. — Brazil.

(*Reichsteinera*. Rgl.)

3. *Eugesnera*. Benth. et Hook.

G. Douglasii. Lindl. — Brazil.

Var. : *purpurea*.

G. Donkelaarrii. Hort. ex Hook. — Nova Granat.

SINNINGIA. NEES. (1832)

3. *Ligeria*. Benth. et Hook.

S. speciosa. Lodd. — Brazil.

(*Ligeria* Dcne. — *Gloxinia caulescens*. Lindl. — *Glox speciosa*.

Lodd. — *Gloxinia immaculata*. Mart. — *Gloxinia Merkl.*

Otto. — *Martynia speciosa*. Loisel.)

Var. hort. et hybr. plur.

S. conspicua ? — Brazil.

(*Rosanovia*. Rgl. — *Biglandularia*. Seem.)

Trib. 3. — CYRTANDREÆ.

ÆSCHYNANTHUS. JACK. (1823)

Æ. Lobbiana. Hook. — Ins. Java

RAMONDIA. LIN. (1753)

R. pyrenaica. Rich. — Eur. austr.*(Chaixia Myconi. Lapair.)*

HABERLEA. FRIVALDSKY (1835)

H. rhodopensis. Frivaldsky. — Eur. orient. (mont. Balkan.).

MITRARIA. CAV. (1801)

M. coccinea. Cav. — Ins. Chiloë.*(Gesneria chilensis. Molin.)*

CII. — BIGNONIACEÆ

Trib. 1. — BIGNONIEÆ.

BIGNONIA. (TOURN.) LIN. (1853)

4. *Anisostictus. Bur.***B. capreolata.** Lin. — Amer. bor. (pars merid.).*(B. crucigera. Walld. — Anisostictus capreolatus. Bur. —
Doxantha capreolata. Miers.)*5. *Bignonia. Bur.***B. Lindleyana.** D.C. — Reg. argent.*(B. picta. Lindl.)***B. venusta.** Ker-Gawl. — Brazil.*(Tecoma. Lem.)***B. Kerere.** Aubl. — Guyana.**B. albo-lutea.** Hort. Mortol. — Hab. ?**B. Mac-Kennyi ?**6. *Doxantha. Miers.***B. Tweediana.** Lindl. — Brazil.10. *Phædranthus. Miers.***B. buccinatoria.** Mairet ex D.C. — Mexico.*(Phædranthus cinerascens, exsertus et Lindleyanus. Miers. —
Pithecoctenium buccinatorium. D.C. — Bignonia Kerere.
Lindl.)*

PITHECOCTENIUM. MART. EX D.C. (1840)

P. Vitalbæ. D.C. — Brazil.

Trib. 2. — TECOMEÆ.

CATALPA. SCOP. (1777)

- C. bignonioides.** Walld. — Amer. bor. (pars cent. et merid.).
 (*C. syringæfolia*. Sims. — *Bignonia Catalpa*. Lin.)
- C. ovata.** G. Don. — Japon.
 (*C. Kämpferi*. Sieb. et Zucc. — *Bignonia Catalpa*. Thunb.)

TECOMA. JUSS. (1774)

1. *Tecomaria*. Endl.
- T. capensis.** Lindl. — Afric. austr.
 (*Bignonia*. Thunb. — *Ducoudræa*. Bur.)
3. *Eutecoma*. Benth. et Hook.
- T. radicans.** Juss. — Am. bor.-or. (pars merid.).
 (*Bignonia*. Lin. — *Campsis*. Bur.)
- T. grandiflora.** Delaun. — China; Japon.
 (*Bignonia*. Thunb. — *Bignonia chinensis*. Lamk. — *Campsis adrepens*. Lour. — *Incarvillea grandiflora*. Poir.)
- T. Manglesii?**
- T. Valdivianum?** — Chili.
 (*Campsidium*. Seem.)
4. *Pandorea*. Endl.
- T. australis.** R. Br. — Austral. orient.
 (*B. pandoreana*. Andr. — *Pandorea australis*. Spach.)

AMPHICOME. ROYLE. (1835)

- A. Emodi.** Royle. — Reg. Himal.

INCARVILLEA. JUSS. (1789)

- I. Olga.** Rgl. — Khokand.

Trib. 3. — JACARANDEÆ.

ECCREMOCARPUS. R. ET PAV. (1794)

2. *Calampelis*. Benth. et Hook.
- E. scaber.** R. et Pav. — Chili.
 (*Calampelis*. Don.)

JACARANDA. JUSS. (1789)

1. *Monolobus*. D.C.
- J. ovalifolia.** R. Br. — Am. austr.
 (*J. mimosæfolia*. Don.)

CIII. — ACANTHACEÆ

Trib. 1. — THUNBERGIEÆ.

THUNBERGIA. LIN. FL. (178)

1. *Euthunbergia*. Benth. et Hook.

T. alata. Bojer. — Afr. trop.

3. *Hexacentris*. Benth. et Hook.

T. mysorensis. Wight. — Ind. or.

(*Hexacentris*. Nees.)

Trib. 3. — RUELLIEÆ.

OTACANTHUS. LINDL. (1862)

O. cæruleus. Lindl. — Brazil.

RUELLIA. LIN. (1753)

Sect. 4.

R. formosa. Andr. — Brazil.

(*Arrhoxylum*. Nees.)

DÆDALACANTHUS. T. ANDERS. (1864)

D. nervosus. T. Anders. — Ind. orient.

(*Justicia colorata*. Vahl. — *Ruellia varians*. Vent.)

(Forsé ad *Euruellias* transferen., ex Radlk. manus. 1883).

STROBILANTHES. BLUM. (1826)

S. Dyeranus. Hort. Sander. — India orient.

Trib. 4. — ACANTHEÆ.

ACANTHUS. TOURN. ex LIN.

A. mollis. Lin. — Europa austr.

Var. : latifolius.

A. spinosus. Lin. — Europa.

(*A. spinosissimus*. Desf.)

A. longifolius. Poir. — Europ. austr.

(*Dilivaria longifolia*. Poir.)

Trib. 5. — JUSTICIEÆ.

BARLERIA. LIN. (1753)

B. lupulina. Lindl. — Ind. orient.; Ins. maurit.

(*B. macrostachya*. Boj. — *Diclytera spinosa*. Lodd.)

ASYSTASIA. BLUME. (1826)

- A. bella.** Jacks. — Africa austr. (Natal.).
(*Mackaya*. Harv.)

APHELANDRA. R. BR. (1810)

- A. cristata.** R. Br. — Ind. occid.

ADHATODA. TOURN. EX MEDIK. (1790)

- A. Vasica.** Nees. — Asia trop.
(*Justicia Adhatoda*. Lin.)

JACOBINIA. MORIC. (1846)

- S. Pohliana.** Benth. et Hook. — Brazil.
(*Cyrtanthera magnifica*. Nees.)
S. chrysostephana. Benth. et Hook. — Mexico.
(*Cyrtanthera*. Nees.)
S. Liboniana. Benth. et Hook. — Brazil.
(*Cyrtanthera*. Lem.)
S. pauciflora. Benth. et Hook. — Brazil austr.
(*Libonia floribunda*. C. Koch.)

ANISACANTHUS. NEES. (1842)

- A. virgularis.** Nees. — Mexico.
(*Birnbaumia quadrifida*. Kostel. — *Justicia coccinea*. Cav. —
Justicia quadrifida. Vahl. — *Justicia hyssopifolia*. Gouan.)
A. Wrightii. A. Gray. — Amer. bor.

THIRSACANTHUS. NEES. (1842)

- T. rutilans.** Nees. — Amer. trop. (Reg. Columb.).

CIV. — MYOPORINEÆ

MYOPORUM. BANKS ET SOLAND. (1786)

3. *Eumyoporum*. Benth et Hook.
M. serratum. R. Br. — Austral. mer. et occid.; Tasmania.
(*M. tuberculatum*. R. Br. — *M. glandulosum*. D.C. — *M. capra-*
rioides. Bart. — *M. tasmaniceus*. A.D.C. — *Pagonia tetran-*
dra. Labill.)
M. verrucosum. Poir. — Australia.

- M. parvifolium.** R. Br. — Austr. austro-occid.)
 (*M. humile*. R. Br. — *Andreusia scabra*. Zeyh.)
M. acuminatum. R. Br. — Australia orient.
 (*M. Cunninghamii*. Benth. — *M. cyanantherum* et *M. Dampieri*.
 A. Cunn. — *M. ellipticum*. R. Br. — *Pogonia glabra*. Andr.)
-

CV. — SELAGINEÆ

HEBENSTREITIA. LIN. (1753)

- H. dentata.** Lin. — Afr. bor. et austr.
 (*H. pulchella*. Salisb. — *H. tenuifolia*. Schrad. — *Polycenia pulchella*. Schimp.)

SELAGO. LIN. (1753)

- S. cinerea.** Lin. — Africa austr.
 (*S. corymbosa*. Poir. — *S. spuria*. Lodd.)

GLOBULARIA. TOURN. EX LIN. (1753)

- G. nudicaulis.** Lin. — Europa,
G. salicina. Lamk. — Ins. Madeira.
 (*G. longifolia*. Ait. — *G. procera*. Salisb.)
-

CVI. — VERBENACEÆ

Trib. 4. — VERBENEÆ.

LANTANA. LIN. (1753)

- L. Camara.** Lin. — Amer. trop.
 (*L. aculeata*. Lin. — *L. scabrida*. Soland. — *L. mutabilis*.
 Salisb. — *L. viburnoides*. Blanco.)
Variet. hortens.
L. Sellowiana. Link. et Otto. — Amer. austr.
 (*L. decumbens*. Sellow. — *L. Selloi*. Steud. — *Lippia montevidensis*. Spr.)

LIPPIA. HOUST. EX LIN. (1753)

1. *Aloysia*. Schau.
L. citriodora. H. B. et K. — Amer. austr.
 (*Aloysia*. Orteg. ex Steud. — *Zapania*. Lamk. — *Verbena triphylla*. L'Herit.)

L. chamædrifolia. Steud. — Brazil.

(*Aloysia*. Cham.)

VERBENA. LIN. (1753)

V. chamædrifolia. Juss. — Brazil.

(*V. veronicæfolia*. Sm. — *V. Melindres*. Gill. — *V. melissoides*. Sweet.)

Variet. hort.

V. teucrioides. Gill. et Hook. — Brazil.

Variet. hort.

V. venosa. Gill. et Hook. — Brazil.

(*V. rugosa*. G. Don.)

V. trifida. Kunth. — Mexico.

AMASONIA. LIN. FIL. (1781)

A. punicea. Vahl. — Ins. Trinit.

RHAPHITHAMNUS. MIERS.

R. cyanocarpus. Miers. — Chili.

(*Citharexylum*. Hook. et Arnd. — *Pœppigia*. Bert.)

DURANTA. LIN. (1753)

D. Plumieri. Jacq. — Amer. trop.

(*D. inermis*. Lin. — *D. Ellisia*. Jacq. — *Ellisia acuta*. Lin.)

D. integrifolia. Tod. — Hab. ?

Trib. 5. — VITICEÆ.

CALLICARPA. LIN. (1753)

C. americana. Lin. — Amer. bor. (pars merid.).

(*Johnsonia*. Mill. — *Burchardia Heisteri*. Duham.)

C. mollis. Sieb. et Zucc. — Japon.

C. japonica. Thunb. — Japon.

(*C. longifolia*. Lamk. — *C. longifolia subglabrata*. Schau. in D.C. — *C. Mimurazaki*. Hassl.)

VITEX. LIN. (1753)

V. Agnus Castus. Lin. — Europ. austr.; Oriens.

(*V. latifolia* Mill. — *V. verticillata*. Lamk. — *Agnus Castus vulgaris*. Carr)

CLERODENDRON. LIN. (1753)

C. foetidum. Bnge. — China bor.

(*C. Bungei*. Steud.)

C. trichotomum. Thunb. — Japon.

Trib. 6. — CARYOPTERIDEÆ.

CARYOPTERIS. BNGE. (1846)

C. Mastacanthus. Schau. — China.

(*Barbula sinensis*. Low. — *Mastacanthus sinensis*. Endl.)

CVII. — LABIATÆ

Trib. 1. — OCIMOÏDEÆ.

PLECTRANTHUS. L'HERIT. (1785)

P. fruticosus. L'Herit. — Afr. austr.

(*Germanea urticifolia*. Lamk. — *Coleus fruticosus*. Benth.)

P. parviflorus. Willd. — Austral et Ins. Pacific.

(*P. paniculatus*. Jacq. — *Germanea parviflora*. Poir.)

COLEUS. LOUR. (1790)

C. Blumei. Benth. — Java.

Var. *hybridæ plurimæ*.

C. Verschaffeltii. Ch. Lem. — Java.

LAVANDULA. (TOURN.) LIN. (1753)

2. *Spica*. Benth.

L. spica. Lois. — Europ. austr.; Afr. bor.

(*Lavandula vulgaris*. Lamk. — *Lavandula officinalis*. Chaix. —

Lavandula angustifolia. Ehrh.)

Trib. 2. — SATUREINEÆ.

POGOSTEMON. DESF. (1815)

P. Patchouly. Pellet. — Ind. or.; Burma.

(*P. Heyneanus*. Benth. — *P. suavis*. Ten.)

MENTHA. (TOURN.) LIN. (1753)

M. Pulegium. Lin. — Eur.; Asia et Afr. bor.

(*M. exigua*. Lin. — *Pulegium exiguum*. Mill. — *Melissa*

Pulegium. Griseb.)

THYMUS. LIN. (1753)

T. vulgaris. Lin. — Europa.

Var. : *citriodora*.

MELISSA TOURN. EX LIN. (1753)

M. officinalis. Lin. — Reg. Mediter.; Oriens.*(M. cordifolia. Pers. — M. graveolens. Host. — M. romana. Mill.)*

SPHACELE. BENTH. ()

S. campanullata. Benth. — Chili.*(Phytoxis acidissima. Molina.)*

Trib. 3. — MONARDEÆ.

SALVIA. LIN.

*Sect. 1. Salvia. Benth.***S. camphorata.** Hort. — Europ. austr.*Sect. 3. Calosphace. Benth.***S. prunelloïdes.** H. B. et K. — Amer.**S. splendens.** Sell. — Brazil*(S. brasiliensis. Sprun.)***S. patens.** Cav. — Mexico.*(S. spectabilis. H. B. et K. — S. macrantha. Schlecht. — S. decipiens. Mart. et Gall.)***S. leucantha.** Cav. — Mexico.**S. lantanæfolia.** Mart. et Gal. — Mexico.**S. ianthina.** Otto. et Dietr. — Mexico.**S. cacaliæfolia.** Benth. — Mexico; Peruvia.**S. involucrata.** Cav. — Mexico.*(S. levigata. Kunth.)**Var. : Bethelii.***S. semiatrata.** Zucc. — Mexico.

ROSMARINUS (TOURN.) LIN. (1753)

R. officinalis. Lin. — Reg. mediter.*(R. latifolius. Mill.)*

MONARDA. LIN. (1753)

*1. Eumonarda. Benth.***M. didyma.** Lin. — Amer. bor.*(M. coccinea. Mchx. — M. fistulosa. Curt. — M. Kalmiana. Pursh. — M. oswegoënsis. Bart. — M. purpurea. Lamk.)*

Trib. 4. — NEPETEÆ.

DRACOCEPHALUM. LIN. (1753)

D. Ruprechtii. Rgl. — Turkest.; Thibet. occ.

Trib. 5. — STACHIDEÆ.

SCUTELLARIA. LIN. (1753)

2. *Heteranthesia*. Benth.**S. Mocinniana**. Benth. — Mexico.**S. Ventenatii**. Hook. — Nov. Granat.

PHYSOSTEGIA. BENTH. (1829)

P. virginiana. Benth. — Amer. bor.(P. *inbricata*. Hook. — P. *speciosa*. Sweet.)

MELITTIS. LIN. (1753)

M. Melissophyllum. Lin. — Europ.(M. *albida*. Guss. — M. *grandiflora*. Sm. — *Melissa sylvestris*. Lamk.)

STACHYS. LIN. (1753)

S. densiflora. Benth. — Europ. med.(Betonica *hirsuta*. Lin. — *Betonica incana*. Ait.)**S. lanata**. Jacq. — Reg. Caucas.

LAMIUM. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Orvala*. Dmrt.**L. Orvala**. Lin. — Europ. austr.(L. *grandiflorum*. Salisb. — L. *pannonicum*. Scop. — *Orvala lamioides*. D.C. — *Orvala garganica*. Lin.)4. *Galeobdolon*. Benth.**L. Galeobdolon**. Crantz. — Europ. med.(L. *luteum*. Krock. — *Galeobdolon luteum*. Huds.)

LEONOTIS. R. BR. (1811)

L. Leonurus. R. Br. — Afr. austr.(L. *Hemisodon*. Raf.)

PHLOMIS. LIN. (1753)

1. *Euphlomis*. Benth.**P. fruticosa**. Lin. — Europ. austr. et Oriens.(P. *latifolia*. Mill.)

Trib. 7. — PROSTANTHEREÆ.

PROSTANTHERA. LABILL. (1806)

1. *Euprostanthera*. Benth.**P. nivea**. A. Cunn. — Austral.

P. lasianthes. Labill. — Australia.

WESTRINGIA. SM. (1805)

W. rosmariniformis. Sm. — Austr. orient.
(*Cunila fruticosa*. Willd.)

Trib. 8. — AJUGOIDEÆ.

TEUCRIUM. LIN. (1753)

7. *Chamædrys*. Benth..

T. Marum. Lin. — Reg. medit.

(*T. maritimum*. Lamk. — *Chamædrys marum*. Mœnch.)

T. flavum. Lin. — Europ. austr.

8. *Polium*. Benth.

T. polium. Lin. — Europ. austr.; Asia occid.

(*T. flavicans*. Lamk. — *T. tomentosum*. Mill. — *Polium aureum*. Mœnch. — *Polium flaveum*. Mill.)

AJUGA. LIN. (1753)

1. *Bugula*. Benth.

A. reptans. Lin. — Europ.

(*Bugula decumbens*. Mill. — *Bugula densiflora*. Benth.)

DICOTYLEDONES MONOCHLAMYDEÆ

CVIII. — NYCTAGINEÆ

Trib. 1. — MIRABILIEÆ.

MIRABILIS. RIV. EX LIN.

1. *Mirabilis*. Choisy.

M. Jalapa. Lin. — Amer. trop.

Nyctago Jalapæ. D.C. — *Nyctago versicolor*. Salisb. — *Jalapa congesta*. Moench.)

Variet. hort.

BOUGAINVILLÆA. COMM. EX JUSS. (1789)

B. spectabilis. Willd. — Brazil.

(*B. bracteata*. Pers. — *Josepha augusta*. Vell.)

B. glabra. Choisy. in D.C. — Brazil.

ABRONIA. JUSS. (1789)

A. umbellata. Lamk. — California.

(*A. rotundifolia*. Gærtn.)

Trib. 2. — PISONIEÆ.

PISONIA. PLUM. EX LIN.

P. Brunoniana. Endl. — Austr.; Nov. Zeland.; Ins. Norfolk.

CIX. — ILLECEBRACEÆ

Trib. 2. — PARONYCHIEÆ.

HERNIARIA. (TOURN.) LIN. (1753)

H. glabra. Lin. — Europa; Asia bor.

CX. — AMARANTACEÆ

Trib. 2. — AMARANTEÆ.

BOSEA. LIN. (1753)

B. Amherstiana. Hook. fl. — Reg. Himal.

(*Deeringia*. Wall.)

Var. : foliis variegatis.)

Trib. 3. — GOMPHRENEÆ.

TELANTHERA. R. BR.

1. *Bucholtzia*. Mart.

T. ficoidea. Moq. — Brazil.

(*Bucholtzia brachiata*. Schrad. — *Alternanthera amabilis*. Hort.

ex Lem. — *Alternanthera triandra*. Steud. — *Bucholtzia*

ficoidea. Mart. — *Illecebra ficosdeum*. Lin.)

Variet. *hortens*.

T. amœna. Rgl. — Asia ; Afric. ; Brazil.

(*Altern. sessilis*. Lem.)

T. flavescens. Moq. — Amer. calid.

(*Alternanthera*. H. B. et K.)

T. versicolor.

(*Alternanthera*. Hort. ex Regel.)

ALTERNANTHERA. FORSK. (1775)

A. paronychioides. St. Hil. — Amer. austr.

Variet. *hort*.

IREGINE. P. BROWN. (1756)

Sect. 1. *Euiresine*. Benth. et Hook.

J. acuminata. Moq. in D.C. — Mexico.

J. Herbstii. Hook. — Brazil.

(*Achyranthes Verschaffelti*. Ch. Lem.)

Var. : aurea reticulata.

J. Lindenii. Van Hout. — Hab. ?

CXI. — CHENOPODIACEÆ

Trib. 1. — CHENOPODIEÆ.

HABLITZIA. MARS. BIEB. (1817)

H. tamnoïdes. Mars. Bieb. — Reg. Caucas.

Trib. 2. — ATRIPLICEÆ.

ATRIPLEX. (TOURN.) LIN. (1753)

A. Halimus. Lin. — Afr. bor. et austr.*(Obione crispa. Moq. — Chenopodium Halimus. Thunb.)***A. nummularia.** Lindl. — Austr.

Trib. 7. — SALICORNIEÆ.

SALICORNIA. LIN. (1753)

S. macrostachya. Moric. — Europ. austr.

Trib. 8. — SUÆDEÆ.

SUÆDA. FORSK. (1775)

1. *Suæda. Moq.***S. fruticosa.** Forsk. — Littora salsa.*(Salsola. Lin. — Salsola annularis. Poir.)*

Trib. 12. — BOUSSINGAULTIÆ.

BOUSSINGAULTIA. H. B. ET K. (1825)

B. baselloides. H. B. et K. — Ecuador.*(B. leptostachys. Moq. in D.C.)*

CXII. — PHYTOLACCACEÆ

Trib. 1. — RIVINEÆ.

PETIVERIA. PLUM. EX LIN. (1753)

P. alliacea. Lin. — Ind. occid.*(P. fetida. Salisb. — P. ochroleuca. Moq.)*

SEGUIERIA. LIN. (1753)

S. americana. Lin. — Amer. trop.

Trib. 2. — EUPHYTOLACCACEÆ.

PHYTOLACCA. TOURN. EX LIN. (1753)

P. dioica. Lin. — Amer. austr.*(P. poppilifolia. Salisb. — Pircunia diotca. Moq.)*

ERCILLA. A. JUSS. (1832)

E. volubilis. A. Juss. — Peruvia.

(Bridgesia spicata. Hook. et Arn. — Apodostachys densiflora. Turcz.)

CXIII. — POLYGONACEÆ

Trib. 3. — EUPOLYGONEÆ.

ATRAPHAXIS. LIN. (1753)

A. spinosa. Lin. — Oriens.

(A. Calverti. Boiss. -- A. replicata. Lamk.)

POLYGONUM. (TOURN.) LIN. (1753)

4. *Persicaria. Benth. et Hook.***P. virginianum.** Lin. — Reg. Himal.; Amer. bor.

(P. fliforme. Thunb. — Persicaria virginiana. Gærtn. — Anteromon racemosum. Rav.)

Var. : foliis variegatis.

P. vacciniifolium. Wall. — Reg. Himal.6. *Cephalophilon. Meisn.***P. cuspidatum.** Sieb. — Japonia.10. *Pleuropterus. Benth. et Hook.***P. multiflorum.** Thunb. — China; Japon.

(P. chinense. Houtt. — Pleuropterus cordatus. Turcz. — Helxine multif. Raf.)

P. Baldshuanicum. Rgl. — Turkest.

FAGOPYRUM. TOURN. ex HALL. (1742)

F. esculentum. Moench. — Europ.; Asia temp.

(Polygonum fagopyrum. Lin. — Polyg. cereale. Salisb. — Polyg. dioicum. Buch-Ham. — Polyg. emarginatum. Rotb. — Polyg. pyramidatum. Loisel.)

Trib. 4. — RUMICEÆ.

RHEUM. LIN. (1753)

R. rhaponticum. Lin. — Oriens et Reg. Caucas.**R. undulatum.** Lin. — Turkest.

Trib. 5. — COCCOLOBEÆ.

MUEHLENBECKIA. MEISS. (1840)

- M. platyclados.** Meissn. — Ins. Salomon.
 (*Coccoloba*. F. Müll.)
- M. complexa.** Meissn. — Nov. Zelandia.
 (*Polygonum*. A. Cunn.)
-

CXIV. — ARISTOLOCHIEÆ

ARISTOLOCHIA. TOURN. EX LIN. (1753)

3. *Gymnolobus*. Duchartre.
- A. elegans.** Mast. — Brazil.
4. *Siphisia*. Duchartre.
- A. macrophylla.** Lamk. — Amer. bor. (pars cent. et merid.)
 (*A. Sypho*. L'Herit. — *Siphisia glabra*. Rav. — *Siphisia Sypho*.
 Klotzsch. — *Hocquartia macrophylla*. Dum.)
- A. tomentosa.** Seem. — Amer. bor. (pars merid.)
 (*A. hirsuta*. Muhlbg. — *Hocquartia tomentosa*. Dum.)
-

CXV. — PIPERACEÆ

Trib. 1. — SAURUREÆ.

SAURURUS. LIN. (1753)

- S. Loureiri.** Dcne. — Asia orient.
 (*Spathium* ? Lour.)

Trib. 2. — PIPERACEÆ.

PIPER. LIN. (1753) PART.

2. *Eupiper*. Benth. et Hook.
- P. Futo-Kadsura.** Sieb. — Japonia.
5. *Steffensia*. Benth. et Hook.
- P. unguiculatum.** R. et Pav. — Peruvia.
 (*P. celtidifolium*. Desf. — *P. discolor*. Balb. ex Kunth. —
P. glaucescens. Jacq. — *P. terminalis*. H. B. et K. — *Enckea*
glaucescens. Kunth. — *Enckea Amalago*. Grieseb. — *Gonis-*
trum unguiculatum. Raf. — *Ottonia unguiculata*. Heynh.)

CXVI. — CHLORANTHACEÆ

CHLORANTHUS. SW. (1787)

C. inconspicuus. Sw. — China; Japon.

(*Creodus odorifer*. Lour. — *Nigrina spicata*. Thunb. — *Nigrina spicifera*. Lamk.)

CXVII. — MONIMIACEÆ

Trib. 1. — MONIMIEÆ.

PEUMUS { MOLINA. (1782)
PERS. (1807)

P. Boldus. Molina. — Chili.

(*P. fragrans*. Pers. — *Boldu chilinum*. Nees. — *Boldu chilense*. Poepp. ex Meissn. — *Boldus chilensis*. Schult. — *Boldea fragrans*. C. Gay. — *Laurus Lingui*. Bridges. — *Laurus Belloto*. Miers.)

Trib. 2. — ATHEROSPERMEÆ.

DORYPHORA. ENDL. (1837)

D. Sassafras. Endl. — Australia.

CXVIII. — LAURINEÆ

Trib. 1. — PERSEACEÆ.

CRYPTOCARIA. R. BR. (1810)

C. Peumus. Nees. — Chili.

(*C. Berteroana*. C. Gay. — *C. stenantha*. Phil. — *Laurus Peumo*. Doub. — *Peumus mammosa*, *Peumus alba* et *Peumus rubra*. Molina.)

CINNAMOMUM. (TOURN) { LIN. (1753)
BL. (1825)

1. *Malabathrum*. Meissn.

C. Cassia. Blume. — Burma; China.

(*C. aromaticum*. et *C. officinarum*. Nees. — *C. Malabathrum*. Reinw. — *Persea Cassia*. Spreng. — *Laurus Cinnamomum*. Andr.)

2. *Camphora*. Meissn.**C. Camphora**. Nees et Eberm. — China; Japon.

(*C. Camphoriferum*. St. Lag. — *Camphora officinarum*. Nees.
— *Camphora vera*. Rav. — *Laurus camphora*. Lin. — *Laurus camphorifera*. Salisb. — *Persea Camphora*. Spreng.)

C. glanduliferum. Meissn. — Reg. Himal.

(*Camphora glandulifera*. Nees. — *Laurus glandulifera*. Wall.)

PERSEA. PLUM. EX LIN. (1753)

1. *Eupersea*. Benth. et Hook.**P. gratissima**. Gærtn. — Amer. trop.

(*P. americana*. Mill. — *P. drymifolia*. Cham. et Schlecht. —
P. edulis. Rav. — *P. præcox*. Pæp. — *P. Schiedeana*. Nees.
— *Laurus Persea*. Lin.)

P. Carolinensis. Nees. — Amer. bor. (pars merid.)

(*P. Borbonia*. Spreng. — *Laurus Borbonia*. Lin. — *Laurus carolinensis*. Catesb. — *Laurus ellongata*. Salisb. — *Laurus foetens*. Willd.)

Trib. 2. — LITSEACEÆ.

SASSAFRAS. NEES. (1836)

S. officinale. Nees et Eberm. — Amer. bor.-or. (pars merid.)

(*Laurus Sassafras*. Lin. — *Laurus variefolia*. Salisb. — *Persea sassafras*. Spreng. — *Tetranthera albida*. Spreng. — *Evosmus albidus*. Nutt.)

LITSEA. LAMK. (1789)

3. *Cylicodaphne*. Benth. et Hook.**L. japonica**. Mirb. — Japon.

(*Litsea Thunbergii*. Sieb. — *Tetranthera japonica*. Spreng. —
Tomex japonica. Thunb.)

UMBELLULARIA. NEES. (1836)

U. californica. Benth. et Hook. — Amer. bor.-occid.

(*Oreodaphne*. G. Nees. — *Tetranthera*. Hook. et Arn. —
Drimophyllum. Nutt.)

LINDERA. THUNB. (1783)

1. *Benzoin*. Benth. et Hook.**L. Benzoin**. Meissn. — Amer. bor.-or.

(*Benzoin æstivalis* et *Benzoin odoriferum*. Nees. — *Laurus æstivalis* et *Laurus Benzoin*. Lin. — *Laurus Pseudo-Benzoin*. Mehx. — *Evosmus Benzoin*. Blume. — *Calosmon Benzoin*. Presl.)

3. *Daphnidium*. Nees.**L. strychnifolia**. Vill. — Ins. Philip.(Litsea trinervia. Burg. — *Daphnidium Myrrha*. Sieb. et Zucc.)

LAURUS. (TOURN.) LIN. (1753)

L. nobilis. Lin. — Reg. mediter.

(L. undulata. Mill.)

CXIX. — PROTEACEÆ

Trib. 1. — PROTEEÆ.

LEUCOSPERMUM. R. BR. (1810)

L. spatulatum. R. Br. — Afr. austr.(Protea spatulata. Poir. — *Protea spatulæfolia*. Knight.)

Trib. 5. — GREVILLEÆ.

MACADAMIA. F. MULL. (1858)

M. ternifolia. F. Müll. — Austr. orient.

(Helicia. F. Müll.)

ROUPALA. AUBL. (1775)

R. aurea. Lind. — Braz. austr.

LAMBERTIA. SM. (1798)

L. formosa. Sm. — Austr.**L. echinata**. R. Br. — Austr.

(L. propinqua. R. Br.)

GREVILLEA. R. BR. (1810)

G. juniperina. R. Br. — Nov. Zeland.

(G. sulfurea. A. Cunn. — G. acicularis. Schult. — G. aciphylla. Siebr.)

G. bipinnatifida. R. Br. — Austr.**G. robusta**. A. Cunn. — Austr. orient.

(G. umbratica et G. venusta. A. Cunn.)

G. pyramidalis. A. Cunn. — Austr.**G. rosmarinifolia**. A. Cunn. — Nov. Zeland.

(G. riparia. Siebr.)

G. alpina. Lindl. — Austr. orient.

(G. alpestris. Meissn. — G. Dallachiana. F. Müll.)

- G. glabrata.** Meissn. — Austral.
 (*Manglesia cuneata*. Endl. — *Manglesia glabrata*. Lindl. —
Anadesia Manglesii. R. Grah.)
- G. Preissii.** Meissn. — Austral.
- G. Hilliana.** F. Müll. — Austral. orient.
- G. macrostylis.** F. Müll. — Austral. occid.
- G. lavandulacea.** Schlecht. — Austral.
 (*G. rosea*. Lindl. — *G. ramulosa*. F. Müll.)
- G. Forsteri.** Hort. — Hab. ?

HAKEA. SCHRAD. (1797)

- H. pugioniformis.** — Cav. — Austr. merid.; Tasmania.
 (*H. glabra*. Schrad. — *H. glauca* et *H. parilis*. Knight. — *Lambertia terretifolia*. Gært. — *Banksia terretifolia*. Salisb. —
Conchium corniculatum. Sm.)
- H. gibbosa.** Cav. — Australia.
 (*H. pinnifolia*. Knight. — *H. pubescens*. Schrad. — *H. lanigera*. Ten. — *Banksia pinnifolia*. Salisb. — *Conchium cornutum*. Gært. — *Conchium sphæroideum*. Sm. — *Conchium gibbosum*. Sm.)
- H. suaveolens.** R. Br. — Austr. occident.
 (*H. pectinata*. Dum. Cours. — *H. pinnata*. Roem. et Schul. —
Banksia pinnifolia. Hort. Cels.)
- H. laurina.** R. Br. — Austr. occident.
 (*H. eucalyptoides*. Meissn.)
- H. acicularis.** Knight. — Austral. orient.
 (*H. decurrens* et *H. lissosperma*. R. Br. — *H. obliqua*. Lodd. —
H. sericea. Schrad. — *H. brachyrrhyncha*. F. Müll. —
Banksia tenuifolia. Salisb. — *Conchium aciculare* et *C. compressum*. Sm.)
- H. nitida.** R. Br. — Austr. occident.
 (*H. picnobotrys*. F. Müll.)
- H. lissocarpa.** R. Br. — Austr.
 (*H. lissocarpa*. Rgl. — *Mercklinia petrophyloides* et *Mercklinia rosea*. Rgl.)

Trib. 6. — EMBOTHRIEÆ.

STENOCARPUS. R. BR. (1810)

- S. Cunninghami.** R. Br. — Austral. occid.
 (*Agnostus sinuatus*. A. Cunn.)
 Var. : integrifolius.

LOMATIA. R. BR. (1810)

- L. ferruginea.** R. Br. — Tasmania; Chili (?)
 (*Embothrium*. Cav.)

L. longifolia. R. Br. — Australia.

(*L. angustifolia*. Schnizl. — *Embothrium myricoides*. Gærtn.)

L. silaifolia. R. Br. — Austral.

(*Embothrium herbaceum*. Cav. — *Embothrium silaifolium*. Sm.
— *Grevillia silaifolia*. Donn.)

EMBOTHRIUM. FORST. (1776)

E. coccineum. Forst. — Reg. Magellan.

(*Catas parviflora*. Juss.)

TELOPEA. R. BR. (1810)

T. speciosissima. R. Br. — Austral.

(*Embothrium spatulatum*. Cav. — *E. speciosissimum*. Sm. —
E. speciosum. Salisb.)

KNIGHTIA. R. BR. (1810)

K. excelsa. R. Br. — Nov. Zeland.

Trib. 7. — BANKSIEÆ.

BANKSIA. LIN. FL. (1781)

B. integrifolia. Lin. fl. — Austral. austro-orient.

(*B. asplenifolia*. Salisb. — *B. Compar*. R. Br. — *B. dentata*.
Wendl. — *B. glauca*, *B. oleifolia* et *B. salicifolia*. Cav. —
B. macrophylla. Link. — *B. reticulata*. Hoffm. — *Hakea*
pubescens Hort. Cels.)

B. serrata. Lin. fl. — Austr. austro-occid.

(*B. æmula*. Siebr. — *B. conchifera*. Gærtn. — *B. longifolia*.
Donn. — *B. media*. Hook. — *B. undulata*. Lindl.)

B. marcescens. R. Br. — Austr. occid.

(*B. asplenifolia*. Knight. — *B. præmorsa*. Andr.)

B. speciosa. R. Br. — Austr. austro-orient.

(*B. grandidentata*. Dum. Cours.)

B. quercifolia. R. Br. — Austr.

B. littoralis. R. Br. — Austral.

B. Lamberti?

CXX. — THYMELÆACEÆ

Trib. 1. — EUTHYMELEÆ.

PIMELEA. BANKS ET SOLAND. (1788)

2. *Eupimelea*. Benth.

P. flava. R. Br. — Australia.

(*P. diosmæfolia*. A. Cunn. — *P. parvifolia*. Meissn.)

3. *Heterolæna*.**P. ferruginea.** Labill. — Austr. occid. et merid.(P. *decussata*. R. Br. — P. *diosmæfolia*. Lodd. — *Hererolæna decussata*. C. A. Mey.)**P. spectabilis.** Lindl. — Austr. occid.(Hererolæna *spectabilis*. C. A. Mey.)4. *Calyptrostegia*. Benth.**P. ligustrina.** Labill. — Austr. merid; Tasmania.(Calyptrostegia *ligustrina*. C. A. Mey.)

DAPHNE. LIN. (1753)

1. *Eudaphne*. Benth. et Hook.**D. Mezereum.** Lin. — Eur. orient.; Caucasus; Asia. bor.(Thymelæa. Scop. — Thymelæa *præcox*. Gilib. — *Mezereum officinarum*. C. A. Mey.)

Var. : atropurpurea.

(D. *Houtteana*. Planch.)**D. caucasica.** Pallas. — As. minor.; Reg. Caucas.(D. *salicifolia*. Lamk.)**D. alpina.** Lin. — Europ. med. et austr. alp.(Thymelæa *candida*. Scop. — Thymelæa *alpina*. All.)2. *Daphnantes*. Meissn.**D. Cneorum.** Lin. — Eur. mont.(D. *odorata*. Lamk. — Thymelæa *Cneorum*. Scop.)

Var. : major.

D. petræa. Leybold. — Alp. austriac.(D. *rupestris*. Facchini.)**D. collina.** Sm. — Italia mont.(D. *australis*. Cir. — D. *alpina*. Savi.)**D. Blagayana.** Freyer. — Carniola.3. *Laureola*. Meissn**D. Laureola.** Lin. — Eur. austr., Asia min.; Ins. Azor.(D. *major*. Lamk. — Thymelæa *Laureola*. Scop.)**D. pontica.** Lin. — Turk.; Asia min.; Reg. Caucas.4. *Gengkwa*. Benth. et Hook.**D. japonica.** Sieb. et Zucc. — Japon.**D. Gengkwa.** Sieb. et Zucc. — China.

DIRCA. LIN. (1753)

D. palustris. Lin. — Amer. bor.

DAIS. LIN. (1762)

D. cotinifolia. Lin. — Afr. austr.

EDGEWORTHIA MEISSN. (1836)

- E. Gardneri.** Meissn. — Reg. Himal; China; Japon.
(E. chrysatha, Lindl. — E. papyrifera, Sieb. et Zucc. — Daphne papyrifera, Sieb.)

WICKSTRÆMIA. ENDL.

- W. indica.** C. A. Mey. — China.
(Daphne indica, Linn.)

GNIDIA. LIN. (1753)

1. *Eugnidia, Meissn.*
G. pinnifolia. Lin. — Afr. austr.
(Cannalia daphnoides, F. W. Schmidt.)

CXXI. — ELÆAGNACEÆ

ELÆAGNUS. LIN. (1753)

- E. argentea.** Pursh. — Amer. bor. (pars septent. et centr.)
(E. commutata, Bernh.)
E. angustifolia. Lin. — Reg. medit.; Reg. Cauc.; As. bor.
(E. hortensis, Marsch. Bieb.)
E. umbellata. Thunb. — Japon et Reg. Himal.
(E. parvifolia, Royle. — E. reflexa, E. Morr. et Dcne.)
E. multiflora. Thunb. — Japon.
(E. longipes, As. Gray.)
E. macrophylla. Thunb. — Japon.
E. pungens. Thunb. — Japon.
(E. Simonii, Carr.)
Var. : aureo maculata.
E. glabra. Thunb. — Japon.

HYPPOPHAE. LIN. (1753)

- H. rhamnoides.** Lin. — Europ.; Oriens; Sibiria.
(Osyris rhamnoides, Scop.)
H. salicifolia. D. Don. — Reg. Himal.
(H. conferta, Wall.)

SHEPHERDIA. NUTT. (1818)

- S. argentea.** Nutt. — Amer. bor.
(Hyppophaë, Pursh. — Lepargyrea, Greene.)

CXXIII. — EUPHORBIACEÆ

Trib. 1. — EUPHORBIEÆ.

PEDILANTHUS. NECK. (1790)

P. tithymaloides. Poit. — Amer. austr.

(*Euphorbia canaliculata*. Lodd. — *Euphorbia carinata*. Don. — *Crepidaria myrtifolia*. Haw.)

EUPHORBIA. LIN. (1753)

3. *Poinsettia*. Benth. et Hook.**E. pulcherrima.** Willd. — Mexico.

(*E. erythrophylla*. Willd. — *E. lutea*. A. Lam. — *E. poinsettiana*. Buist. — *Poinsettia pulcherrima*. R. Grah. — *Pleurodenia coccinea*. Raf.)

5. *Euphorbium*. Boiss.**E. antiquorum.** Lin. — Ind. or. et Ægypt.

(*E. trigona*. Mill.)

E. Caput-Medusæ. Lin. — Afr. austr.

(*E. Fructus-pini* Mill. — *E. Commelini*. D.C. — *Medusea Fructus-pini*, *Medus. major* et *Medus. tessellata*. Haw.)

E. lactæa. Haw. — Ind. or.**E. melloformis.** Ait. — Afr. austr.**E. canariensis.** Lin. — Ins. Canar.**E. natalensis.** Bernh. — Afr. austr.**E. nerifolia.** Lin. — Ind. orient.**E. clandestina.** Jacq. — Afr. austr.**E. Morini?**6. *Tithymalus*. Boiss.**E. amygdaloides.** Lin. — Europ.; Oriens.

(*E. Chaixiana*. Timb. — *E. ligulata*. Chamb. — *Esula amygdaloides*. Haw. — *Characias amygdaloides*. S. F. Gay.)

Var. : versicolor.

E. Characias. Lin. — Reg. mediter. orient.

(*E. cretica*. Mill. — *E. eriocarpa*. Berthol. — *E. esula* et *E. veneta*. Ten. — *E. stenophylla*. Schur. — *Esula Characias*. Haw. — *Characias purpurea*. S. F. Gay. — *Galarhæus creticus*. Haw.)

E. capitulata. Reichb. — Græcia et Thassalia.

Trib. 2. — STENOLOBIEÆ.

BEYERIA. MIQ. (1844)

B. viscosa. Miq. — Australia.

(*B. oblongifolia*. Sond. — *Calyplostigma oblongifolium* et *Cal. viscosum*. Klotzsch.)

Trib. 3. — BUXEÆ.

SARCOCOCCA. LINDL.

S. pruniformis. Lindl. — Ind. orient.

(*Buxus coriacea*. Spreng. — *Buxus saligna*. D. Don. — *Austrobuxus nitidus*. Miq. — *Pachysandra coriacea*. Hook.)

BUXUS. LIN. (1753)

1. *Eubuxus*. Benth et Hook.

B. sempervirens. Lin. — Europ.; Oriens; Asia temp.

Subsp. A : *arborescens*.

(*B. arborescens*. Mill.)

Var. : *flava marginata*.

• *argenteo marginata*.

• *bullata* (*decussata*.)

• *latifolia*.

Subsp. B : *angustifolia*.

(*B. angustifolia*. Mill.)

Subsp. D : *myrtifolia*. Loud.

(*B. myrtifolia*. Lamk.)

(*Subsp. F* : *suffruticosa*. Lin.

(*B. suffruticosa*. Mill.)

Var. : *aurea* ?

B. japonica. Müll. — Japon; China.

(*B. sempervirens*. Thunb. — *B. Fortunei*. Stand.)

Var. : *obcordata*.

B. longifolia. Boiss. — Syria.

(*B. Fortunei*. Carr.)

B. balearica. Willd. — Ins. Balear.

(*B. sempervirens* var. *gigantea*. Loisel.)

PACHYSANDRA. MCHX. (1803)

P. terminalis. Sieb. et Zucc. — Japon.

Trib. 4. — PHYLLANTHÆ.

SECURINEGA. JUSS. (1789)

S. ramiflora. Müll. — Siberia mer.; Mongol.; Reg. amour.

(*Xylophylla*. Ait. — *Phyllanthus*. Pers. — *Geblera suffruticosa*.

Fisch. et Mey. — *Fluggea suffruticosa*. Baill.)

DAPHNIPHYLLUM. BLUM. (1826)

D. glaucescens. Blum. — Ind. or.; Java; Corea.

(*D. Roxburgii*. Baill. — *D. neilgherrense*. Thw. — *Goughia*

neilgherrensis. Wight.)

D. Teysmanni. Kurz ex Teysm. et Binn. — Java.

Trib. 6. — **CROTONEÆ.**

MANIHOT. TOURN. ex ADANS (1763)

M. Glazovii. Muell. — Brazil.

ACALYPHA. LIN. (1753).

2. *Euacalypha. Müll.*

A. macrostachia. Jacq. — Amer. austr.

(*A. macrophylla. H. B. et K.*)

A. cunneata. Poepp. et Endl. — Amer. austr.

(*A. obovata. Benth.*)

A. musaica. Veitch. — Hab. ?

MALLOTUS. LOUR. (1790)

5. *Eumallotus. Müll.*

M. japonicus. Müll. — Japon ; China bor.

(*Rottlera. Spreng. — Croton. Thunb.*)

RICINUS. LIN. (1753)

R. communis. Lin. — Utr. orb. reg. calid.

SAPIUM. P. BROWNE. (1756)

S. sebiferum. Mierb. — China ; Japon.

(*Croton. Lin. — Stillingia. Mchx. — Excoecaria. Mall.*)

HURA. LIN. (1753)

H. crepitans. Lin. — Amer. austr.

(*H. brasiliensis. Willd. — H. strepens. Willd.*)

CXXIV. — URTICACEÆ

Trib. 1. — **ULMEÆ.**

ULMUS. LIN. (1753)

1. *Dryoptelea. Spach.*

U. campestris. Lin. — Eur. ; Asia minor ; Siberia ; Afr. bor.

Subsp. : vulgaris.

(*U. angustifolia. Moench. — U. minor. Mill. — U. pumila.*

Pall. — U. suberosa. Ehrh.)

Subsp. : *amplifolia*.

(*U. sativa* et *U. hollandica* Mill. — *U. suberosa*. Moench. —
U. rugosa. Lodd. — *U. alba*. Waldst. et Kit.)

Var. : *pendula*.

" *purpurea*.

" *variegata* (foliis tricoloribus.)

U. scabra. Mill. — Eur. et Asia med.

(*U. montana*. With. — *U. hollandica*. Pall. — *U. excelsa*.
Borkh.)

Subsp. : *major*.

(*U. major*. Sm.)

Var. : *macrophylla*.

" *viminalis*.

" *pyramidalis* (Dampieri.)

" *lutescens*.

" *crispa* (urticæfolia.)

U. fulva. Mchx. — Amer. bor. (pars sept. et centr.)

(*U. americana*. Ait. — *U. pendula*. Willd. — *U. rubra*.
Mchx. fl.)

2. *Oreoptelea*. Spach.

U. americana. Lin. — Amer. bor.

(*U. floridana*. Chapm.)

3. *Microptelea*. Spach.

U. parvifolia. Jacq. — China ; Japon.

(*U. sinensis*. Pers. — *Planera sinensis*. Sweet. — *Microptelea*
parvifolia. Spach. — *Rhamnus carpinifolia*. Willd.)

PLANERA. GMEL. (1791)

P. aquatica. Gmel. — Amer. bor. (pars cent. et merid.).

(*P. Gmelini* et *P. ulmifolia*. Mchx. — *Anonymus aquaticus*.
Willd.)

Trib. 2. — CELTIDEÆ.

ZELKOWA. SPACH. (1841)

Z. crenata. Spach. — Reg. Caucas.

(*Planera Richardi*. Mchx. — *Planera carpinifolia*. Wats. —
Planera crenata. Desf. — *Ulmus polygama*. Rich. — *Rham-*
nus carpinifolius. Pall.)

Z. acuminata. Planch. — Japon mont.

(*Planera acuminata*. Lindl. — *Planera japonica*. Miq. —
Ulmus Keaki. Sieb.)

CELTIS. TOURN. ex LIN. (1753)

1. *Euceltis*. Planch.

C. australis. Lin. — Eur. merid. ; Africa bor. Oriens.

C. occidentalis. Lin. — Amer. bor.

Var. : *crassifolia*.

(*C. cordata*, Pers. — *C. cordifolia*, Duham. — *C. Audibertiana*, Spach.)

C. Tournefortii. Lamk. — Oriens.

(*C. orientalis*, Mill.)

Trib. 4. — MOREÆ.

BROUSSONETIA. VENT. (1794)

B. papyrifera. Vent. — China ; Japon ; Ins. Pacif.

(*Morus*, Lin. — *Papyrius japonica*, Poir.)

B. Kasinoki. Sieb. — Japon.

(*B. Sieboldii*, Blum. — *Morus Kœmpferi*, Ser.)

MACLURA. NUTT. (1817)

M. aurantiaca. Nutt. — Amer. bor. (pars merid.)

MORUS. (TOURN.) LIN. (1753)

M. nigra. Lin. — Asia media.

M. alba. Lin. — China.

Subsp. : *Constantinopolitana*, Loud.

(*M. byzantina*, Sieber.)

Trib. — 5. ARTOCARPEÆ.

FICUS. TOURN. EX LIN. (1753)

3. *Urostigma*. Benth. et Hook.

F. macrophylla. Desf. — Australia.

(*F. Huegeli*, Kth. et Bouché, — *F. macrocarpa*, Huegl. — *Urostigma macrophylla*, Miq.)

F. rubiginosa. Desf. — Austral. orient.

(*F. australis*, Willd. — *Urostigma rubiginosa*, Miq. — *Perula rubiginosa*, Raf.)

F. elastica. Roxb. — As. trop.

(*Urostigma*, Miq. — *Macrophtalmum*, Gasp.

4. *Synacea*. Miq.

F. punctata. Thunb. — Malaya.

(*F. falcata*, Thunb. — *F. stipulata*, Wall.)

5. *Sycidium*. King.

F. repens. Rottl. — Ind. or.

7. *Eusyce*. Benth. et Hook.**F. Carica**. Lin. — Eur.; Oriens; Afr. bor. et austr.*(F. communis*. Lamk. — *F. latifolius*. Salisb. — *F. Sycomorus*
et *F. leucocarpa*. Gasp. — *Caprificus insectæfera*. Gasp.)8. *Nemorphe* King.**F. Roxburgii**. Wall. — Reg. Himal; Burmah.*(F. macrophylla*. Roxb.)

CUDRANIA. TRECUL. (1847)

C. tricuspidata. Bur. — China.*(C. triloba*. Hance. — *Maclura tricuspidata*. Carr.)

Trib. 7. — URTICEÆ.

LAPORTEA. GAUD. (1826)

L. canadensis. Gaud. — Amer. bor.*(L. pustulata*. Wedd. — *Oblixitis canadensis* et *Ob. divaricatus*.
Raf.)

PILEA. LINDL. (1821)

P. serpyllifolia. Wedd. — Amer. trop.*(P. callitrichioides*. Kunth. — *Dubrucilia callitrichioides*. Gaud.)

BOEHMERIA. JACQ. (1760)

B. argentea. Linden. — Mexico.

CXXV. — PLATANACEÆ

PLATANUS (TOURN.) LIN. (1753)

P. orientalis. Lin. — Eur. austr.; Asia media; Reg. Himal.*(P. palmata*. Moench.)**P. racemosa**. Nutt. — California.*(P. occidentalis*. Hook. et Arn. — *P. californica*. Benth.)

CXXVI. — JUGLANDEÆ

CARYA. NUTT. (1817)

PRIOR : HICORIA. RAF. (1808)

1. *Euhicoria*. Dipp.**C. porcina**. Nutt. — Amer. bor.-or. (pars. centr. et merid.)

(*Juglans glabra*. Mill. — *Juglans porcina*. Mehx. — *Juglans obcordata*. Muhlbg. — *Hicoria glabra*. Britton.)

C. microcarpa. Nutt. — Amer. bor.-or. (pars. centr.).

(*Juglans alba odorata*. Marsh. — *Hicorius odoratus*. Sarg. — *Hicoria microcarpa*. Britton.)

C. tomentosa. Nutt. — Amer. bor.-or. (pars. centr.).

Juglans alba. Lin. — *Juglans tomentosa*. Lamk. — *Hicoria alba*. Britt.)

C. alba. Nutt. — Amer. bor.-or. (pars. centr. et merid.).

(*Juglans ovata*. Mill. — *Juglans ovalis*. Wangenh. — *Juglans compressa*. Gærtn. — *Juglans squamosa*. Lamk. — *Juglans alba*. Mehx. — *Hicoria ovata*. Britt.)

C. sulcata. Nutt. — Amer. bor.-or. (pars. centr.).

Juglans alba acuminata. Marsh. — *Juglans alba*. Wangenh. — *Juglans sulcata*. Willd. — *Juglans mucronata* et *Jug. laciniata*. Mehx. — *Hicoria sulcata*. Britt. — *Hicoria acuminata*. Dipp.)

2. *Apohicoria*. Dipp.**C. amara**. Nutt. — Amer. bor.-or. (pars. centr.).

(*Juglans alba minima*. Marsh. — *Juglans cordiformis*. Wangenh. — *Juglans amara*. Mehx. — *Hicorius amarus*. Raf. — *Hicoria minima*. Britt.)

3. *Pacania*. Rav.**C. olivæformis**. Nutt. — Amer. bor. (pars. centr.).

(*Juglans Pecan*. Marsh. — *Juglans illinoënsis*. Wangenh. — *Juglans angustifolia*. Ait. — *Juglans rubra*. Gærtn. — *Juglans cylindrica*. Lamk. — *Hicoria Pecan*. Britt.)

JUGLANS. LIN. (1753)

J. regia. Lin. — Europ. austr.-or.; As. occ.; Reg. Himal.**J. nigra**. Lin. — Amer. bor. (pars. centr. et merid.).

(*Wallia*. Alefeld.)

J. mandshurica. Maxim. — Mandch.; Reg. Amur.**J. Sieboldiana**. Maxim. — Japon.

(*J. nigra*. Thunb. — *J. coræensis*. Sieb. — *J. mandshurica*. Miq.)

PTEROCARYA. KUNTH. (1824)

- P. caucasica.** C. A. Mey. — Reg. Caucas.; Persia occid.
 (*P. fraxinifolia*. Spach. — *Juglans pterocarpa*. Mchx. —
Juglans fraxinifolia. Poir. — *Rhus obscurum*. Marsh-Bieb.)
- P. sorbifolia.** Sieb. et Zucc. — Japon.
 (*P. rhotifolia*. Sieb. et Zucc.)
- P. stenoptera.** C.D.C. — China bor.
-

CXXVII. — MYRICACEÆ

MYRICA. LIN. (1753)

1. *Gale. Benth. et Hook.*
- M. Gale.** Lin. — Europ. med. et austr.; Sibir.; Amer. bor.
 (pars cent. et sept.).
 (*M. palustris*. Lamk. — *M. brabantica*. S. F. Gray. — *Gale Belgica*. Dumrt.)
2. *Morella. Benth. et Hook.*
- M. cerifera.** Lin. — Amer. bor. (pars centr. et merid.).
 (*M. caroliniensis*. Mill. — *M. pensylvanica*. Lamk. — *Pimecarya odorata*. Raf. — *M. cerophora*. Raf.)
- M. Nagi.** Thunb. — Asia trop. et sub.
 (*M. rubra*. Sieb. et Zucc. — *M. Farquhariana*. Wall. — *M. integrifolia*. Roxb. — *M. missionis* et *M. sapida*. Wall. — *Morella rubra*. Lour. — *Nageia japonica*. Gærtn.)
3. *Comptonia. Engl.*
- M. Comptonia.** D.C. — Amer. bor.-orient (pars centr.).
 (*Comptonia asplenifolia*. Banks. — *Liquidambar asplenifolium*. Lin.)
-

CXXVIII. — CASUARINEÆ

CASUARINA { ADANS. (1763)
 { FORST. (1776)

1. *Cylindraceæ. Poiss.*
- C. stricta.** Dryand. — Australia.
 (*C. quadrivalvis*. Labill. — *C. cristata*. Miq. — *C. excelsa*. Salisb. — *C. macrocarpa*. A. Cunu.)

2. *Tetragoneæ*. Poiss.**C. equisetifolia**. Forst. — Malaya; Ins. Pacific.(C. *africana*. Lour. — C. *excelsa*. Dehnhardt. — C. *incana*.A. Cunn. — C. *lateriflora*. Poir. — C. *littoralis*. Salisb. —C. *Mertensiana*. Rupr. — C. *muricata*. Roxb.)**C. torulosa**. Dryand. — Australia.(C. *tenuissima*. Sieber. — C. *lugubris*. Salisb.)

CXXIX. — CUPULIFERÆ

Trib. 1. — BETULÆ.

BETULA. (TOURN.) LIN. (1753) PR. PART

B. pendula. Roth. — Eur. centr. et austr.; Oriens.(B. *verrucosa*. Ehrb. — B. *alba*. Bechst. — B. *ætnensis*. Presl.— B. *gummifera*. Bert. — B. *odorata*. Reichb.)Subsp. A : *Dalecarlica*.(B. *laciniata*. Wahl.)Subsp. C : *pyramidalis*.**B. fruticosa**. Pall. — Sibiria orient.; Mandsch.; Dahur.(B. *Gmelini*. Bge. — B. *divaricata*. Ledeb.)**B. populifolia**. Ait. — Amer. bor. (pars sept.).(B. *lenta*. Du Roi. — B. *acuminata*. Ehrb.)**B. alba**. Lin. — Europ. bor. et centr.; Asia bor. et occid.).Subsp. : *odorata*.(B. *glutinosa*. Wallr. — B. *macrostachya*. Schrad.)**B. humilis**. Schrank. — Europ. bor.-centr.; Asia; Amer. bor.B. *fruticosa*. Pall. — B. *sibirica*. Wats. — B. *myrsinoides*.Tausch. — B. *palustris*. Rupr.)**B. nana**. Lin. — Europ. bor. et alp.; Asia bor.**B. lenta**. Lin. — Amer. bor. (pars sept. et centr.).(B. *nigra*. Du Roi. — B. *carpinifolia*. Ehrb.)**B. nigra**. Lin. — Amer. bor. (pars sept. et centr.).(B. *lanulosa* et B. *rubra*. Mchx.)**B. Ermani**. Cham. — Sibiria orient.; Mandsch.

ALNUS. (TOURN.) GÆRTN. (1791)

1. *Alnobetula*. W. D. Koch.**A. firma**. Sieb. et Zucc. — Japon.2. *Gymnothyrsus*. Eller.**A. cordifolia**. Ten. — Italia; Reg. Caucas.(Betula *cordata*. Loisel.)

- A. japonica.** Sieb. et Zucc. — Japon ; Mandsch. merid.
(*A. Harinoki*. Sieb. — *Betula Alnus*. Thunb.)
- A. rubra.** Bong. — Amer. bor.-occid. (pars sept. et centr.).
(*A. oregona*. Nutt.)
- A. glutinosa.** Willd. — Europ. et Asia bor.-cent.; Afr. bor.
(*A. rotundifolia*. Mill. — *A. nigra*. Gilib. — *Betula Alnus glutinosa*. Lin.)
Var. : *laciniata* (Imperialis). Desfossé.
- A. barbata.** C. A. Mey. — Reg. Caucas.
- A. incana.** Willd. — Europ.; Asia bor.-occid.; Amer. bor.
(*A. lanuginosa*. Gilib. — *A. pubescens*. Sartorelli. — *A. alpina*. Borkh. — *Betula Alnus incana*. Lin.)
3. *Clethropsis*. Endl.
- A. nitida.** Endl. — Reg. Himal.
(*Clethropsis nitida*. Spach.)

Trib. 2. — CORYLEÆ.

CARPINUS. (TOURN.) LIN. (1753) PR. PART.

- C. Betulus.** Lin. — Europa ; Asia occid.
Var. : *variegata*.
- C. japonica.** Blum. — Japon.
(*Distegocarpus Carpinus*. Sieb. et Zucc.)
- OSTRYA. MICHELI. EX SCOP. (1772)
- O. carpinifolia.** Scop. — Europ. austr.; Oriens.
(*O. vulgaris*. Willd. — *O. italica*. Spach. — *Carpinus Ostrya*. Lin.)
- O. virginica.** Willd. — Amer. bor.-or. (pars cent. et merid.).
(*Carpinus virginiana*. Mill. — *Carpinus triflora*. Mœnch.)

CORYLUS. (TOURN.) LIN. (1753)

- C. Avellana.** Lin. — Eur. cent-austr.; Asia occid.; Afr. bor.
Var. : *aurea*.
et altræ hortens plurim.
- C. maxima.** Mill. — Europ. austr.
(*C. rubra*. Borkh. — *C. tubulosa*. Walld. — *C. Lamberti*. Lodd.)
Var. : *atropurpurea*.
- C. Colurna.** Lin. Europ. austr.-or.; Oriens ; Reg. Himal.
(*C. arborescens*. Münchh. — *C. lacera*. Wall. — *C. Jacquemontii*. Dene.)
- C. rostrata.** Ait. — Amer. bor. (pars sept. et centr.)

Trib. 3. — QUERCINEÆ.

QUERCUS. LIN. (1753)

1. *Lepidobalanus*. Endl.A. *Robur*. Endl.**Q. pedunculata**. Ehrh. — Europa; Oriens; Afric. bor.

(*Q. Robur*. Lin. — *Q. femina*. Mill. — *Q. racemosa*. Lamk. —
Q. fructipendula. Schrank. — *Q. longæva*. Salisb.)

Var. : *fastigiata*.

(*Q. fastigiata*. Lamk. — *Q. pyramidalis*. Gmel.)

Var. : *heterophylla* (*dissecta* Fennesseï.)

" *sanguinea*.

" *variegata* (*leucocarpa*.)

" " (*concordia aurea*.)

" *monstruosa*. (*cucullata*.)

Q. sessiliflora. Salisb. — Europa; Oriens; Afric. bor.

(*Q. Robur*. Mill., Willd. et Du Roi. — *Q. sessilis*. Ehrh.)

Var. : *Afghanistaniensis*.

" *purpurea* (*nigricans*) ?

Q. pubescens. Willd. — Europ.; centr.-austr.; Asia occid.

(*Q. Ægilops*. Mill. — *Q. Cerris*. Pall. — *Q. Collina*. Schleich.

— *Q. faginea*. Rohrer. — *Q. Robur lanuginosa*. Lamk.)

Var. : *apennina*.

(*Q. apennina*. Lamk. — *Q. amplifolia*.)

Q. macranthera. Fisch. et Mey. — Reg. Cauc.; Persia sept.**Q. conferta**. Kit. — Italia; Europ. austro-orient.

(*Q. Farnetto*. Ten. — *Q. apennina*. Loisel. — *Q. Esculus*.

Pollini. — *Q. pannonica*. Booth.

B. *Alba*. (*Elæobalanus*). Spach.

Q. alba. Lin. — Amer. bor.-orient.**Q. macrocarpa**. Mchx. — Amer. bor. (pars sept. et cent.).

Subgen. : *olivæformis*.

(*Q. olivæformis*. Mchx.)

Q. dentata. Thunb. — Japon; China bor.; Mandsch. orient.

(*Q. obovata*. Bge.)

Q. Prinos. Lin. — Amer. bor. (pars cent. et merid.).**Q. lanata**. Sm. — Reg. Himal.; Nepal. et Kamaon.

(*Q. incana*. Roxb. — *Q. lanuginosa*. D. Don. — *Q. dealbata*.
 Wall.)

C. *Ilex*. Oerst.

Q. Turneri. Willd. — Stirps hybrida.

(*Q. Ilex*. × *Q. pedunculata*.)

Q. Ilex. Lin. — Reg. medit.; Oriens.**Q. Suber**. Lin. — Reg. mediterr.

D. *Gallifera*. Spach.**Q. Mierbeckii**. Durieu. — Penins. Iber.; Afr. bor.(Q. *lusitanica*. Webb., *subsp.* Bætica.)E. *Cerris*. Dipp.**Q. Cerris**. Lin. — Europ. austro-orient; Asia minor.(Q. *frondosa*. Mill. — Q. *Ægilops*. Scop. — Q. *crinita*. Lamk.
— Q. *Esculus*. L. Mant.)**Q. Ægilops**. Lin. — Europ. austro-orient; Asia minor.(Q. *Pyrami*, Q. *Vallonea* et Q. *macrolepis*. Kotschy.)**Q. castanæfolia**. C. A. Mey. — Asia minor; Persia sept.**Q. serrata**. Thunb. — Japon; China.(Q. *chinensis*. Bnge.)2. *Erythrobalanus*. Oerst.A. *Phellos*.**Q. Phellos**. Lin. — Amer. bor. (pars centr.).B. *Nigra*.**Q. uliginosa**. Wangenh. — Amer. bor. (pars merid.).(Q. *aquatica*. Walt.)**Q. cuneata**. Wangenh. — Amer. bor.-or. (pars cent. et mer.)(Q. *triloba*. Mchx.)**Q. ilicifolia**. Wangenh. — Amer. bor.-orient (pars centr.)(Q. *Banisterii*. Mchx. — Q. *nigra pumila*. Marsh.)C. *Rubra*.**Q. palustris**. Du Roi. — Amer. bor.-orient. (pars centr.).(Q. *rubra dissecta*. Lamk. — Q. *rubra ramosissima*. Marsh.)**Q. rubra**. Lin. — Amer. bor. (pars centr.).(Q. *coccinea*. var. *rubra*. Spach.)**Q. coccinea**. Wangenh. — Amer. bor.-orient (pars cent.).**Q. ambigua**. Mchx. — Amer. bor. (pars cent. et bor.).(An *stirp. hybrid.* ?)**Q. tinctoria**. Bartr. — Amer. bor. (pars centr.)(Q. *velutina*. Lamk. — Q. *nigra*. Marsh. — Q. *discolor*. Ait.
— Q. *tinctoria sinuosa*. Mchx. — Q. *coccinea*. var. *tinctoria*.
As. Gray.)3. *Cyclobalanopsis*. Oerst.**Q. acuta**. Thunb. — Japon; Coræa.(Q. *Buengerii*. Blume.)**Q. glauca**. Thunb. — Japon.(Cyclobalanopsis *annulata*. Oerst.)4. *Pasania*. Miq.**Q. giabra**. Thunb. — Japon.

?

Q. sclerophylla. Lindl. — China bor.**Q. xalapensis**. H. B. et K. — Mexico.

CASTANOPSIS. SPACH. (1842)

- C. crysophylla.** A.D.C. — Oregon; California.
(*Castanea*. Dougl. — *Castanea sempervirens*. Kellog.)

CASTANEA. (TOURN.) MILL. (1759)

- C. sativa.** Mill. — Europ. austr.; Africa bor.; Oriens.
(*C. vulgaris*. Lamk. — *C. vesca*. Gært. — *Fagus Castanea*. L.)
- C. crenata.** Sieb. et Zucc. — Japon.
(*C. chinensis*. Hassk. — *C. pumila*. Hassk. — *C. stricta*. Sieb. et Zucc. — *C. japonica*. var. *quercina*. et var. *crenata*. Bl. — *C. vulgaris japonica*. D.C. — *Fagus Castanea*. Thunb.)
- C. americana.** Raf. — Amer. bor. (pars cent.).
(*C. vesca*. var. *americana*. Mehx. — *C. vulgaris*, var. *americana*. D.C.)

FAGUS. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Eufagus*. Bl.
- F. sylvatica.** Lin. — Europ.; Asia occid.
(*Fagus sylvestris*. Gært. — *Castanea Fagus*. Scop.)
Var. : *pendula*.
" *quercoides*.
" *purpurea*.
- F. ferruginea.** Ait. — Amer. bor.
F. americana latifolia. Wangenh. — *F. silvestris*. Mehx. —
F. sylvatica. var. *americana*. Pers. — *F. americana*. Sweet.
F. alba. Raf.)
2. *Nothofagus*. A.D.C.
- F. obliqua.** Mirb. — Amer. austr.
(*F. obliqua*. var. *Valdiviana*. A.D.C. — *F. Valdiviana*. Philip.)

CXXX. — SALICINEÆ

SALIX. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Chamitæa*. Kern.
- S. reticulata.** Lin. — Europ. alp. et bor.; Asia et Amer.
bor.-sept.
(*Chamitea reticulata*. Kern.)

2. *Fragiles*. Dipp.

S. pentandra. Lin. — Europ. bor. et med.; Asia bor.

(*S. hermaphrodita*. Lin. — *S. polyandra*. Geld. — *S. Meyeriana*. Borr. — *S. lucida*. Forb.)

S. lasiandra. Benth. — Amer. bor.-occid.

(*S. arguta*. Anders.)

3. *Albæ*. Dipp.

S. alba. Lin. — Europ.; Asia occid.-bor.; Africa bor.

Var. : *vitellina*.)

(*S. vitellina*. Lin. — *S. flexibilis*. Gilib.)

Var. : *splendens*. (*argentea*.)

S. babylonica. Lin. — Asia occid.; China; Japon

(*S. pendula*. Moench. — *S. perpendens*. Ser. — *S. japonica*. Bl.)

4. *Amygdalineæ*. Dipp.

S. amygdalina. Lin. — Eur.; Reg. Cauc.; Oriens; As. bor.

(*S. triandra*. Lin. — *S. Hoppeana*. Willd. — *S. villarsiana*. Flugge et Willd. — *S. Hoffmanniana*. Sm. — *S. spectabilis*. Host.)

S. undulata. Ehrh. — Europ. med.

(*S. lanceolata*. Sm. — *S. triandra*. var. *viminialis*. Wimm)

Var. : *hippophæfolia*.

6. *Purpureæ*. Dipp.

S. purpurea. Lin. — Europ.; Oriens; Sibiria.

(*S. monandra*. Hoffm. — *S. fissa*. Wahlbg. — *S. carniolica* et *S. mutabilis*. Host.)

Var. : *pendula*.

" *gracilis*.

9. *Capreæ*. Dipp.

S. cinerea. Lin. — Europ.; Asia bor.-cent.

(*S. acuminata*. Mill. — *S. lanata*. Vill. — *S. dumetorum*. Sut. — *S. oleifolia*. Sm. — *S. rufinervis*. D.C. — *S. Hoffmanniana*. Bl. et Fingerh. — *F. polymorpha*. Host. — *S. incanescens*. Forb.)

Var. : *tricolor*.

10. *Arenariæ*. Dipp.

S. myrtilloides. Lin. — Eur. cent.; Russia; As. bor.; Amer. bor.-occid.

(*S. elegans*. Bess.)

S. rosmarinifolia. Lin. — Eur. cent.

(*S. Frieseana*. Anders. — *S. tenuis*. Host.)

11. *Phylicifoliæ*. Dipp.

S. spadicea. Chaix. — Europ. centr.

(*S. hastata*. Hoppe. — *S. nigricans*. Sm. — *S. stylosa*. D.C. — *S. cratægifolia*. Bertol.)

- S. laurina.** Sm. — Eur. centr.; Russia bor.
(*S. bicolor*. Sm.)
12. *Hastatæ.* Dipp.
- S. glabra.** Scop. — Europ. alp.; Reg. Caucas.
(*S. phyllicifolia*. Wulf. — *S. Pontederæ.* Bellardi. — *S. Wulfeniana.* Willd.)
13. *Pruinosæ.* Dipp.
- S. acutifolia.** Willd. — Russia orient.; Sibiria.
(*S. violacea.* Andr. — *S. pruinosa.* Bess.)
- S. daphnoides.** Vill. — Europ. cent.; Sibiria.
(*S. cinerea* et *S. pomeranica.* Willd. — *S. bigemmis.* Hoffm. — *S. præcox.* Hoppe. — *S. pulchra.* Wimm.)
15. *Glaucæ.* Dipp.
- S. lanata.** Lin. — Europ. bor.; Sibiria.
(*S. lanuginosa.* Pall. — *S. chrysanthos.* Vahl.)
- S. Lapponum.** Lin. — Europ. bor.-cent. alpestr.
(*S. nitens.* Gilib. — *S. arenaria.* Willd. — *S. glauca.* Sm. — *S. leucophylla.* Willd. — *S. limosa.* Wahlbg.)

POPULUS. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Leuce.* Duby.
- P. alba.** Lin. — Europ. cent.-bor.; Asia bor.
(*P. major.* Mill. — *P. nivea.* Willd.)
Var. : *nivea.*
- P. tremula.** Lin. — Eur., As. centr.-bor.; Afr. bor.
(*P. australis.* Ten. — *P. cilica.* Kotsch.)
- P. tremuloides.** Mchx. — Amer. bor. (pars centr.-sept.)
(*P. atheniensis.* Ludw. — *P. græca.* Ait. — *P. trepida.* Muhlbg. — *P. benzotifera.* Tausch.)
Var. : *pendula.*
2. *Aigeiros.* Duby.
- P. nigra.** Lin. — Europ.; As. bor.-cent.; Amer. bor.
Var. : *pyramidalis.* Spach.
(*P. italica.* Ludw. — *P. pyramidalis.* Roz. — *P. fastigiata.* Desf. — *P. dilatata.* Ait.)
- P. canadensis.** Mönch. — Amer. bor. (pars sept.).
(*P. monilifera* et *P. lævigata.* Ait. — *P. caroliniensis.* Borkh. — *P. virginiana.* Dum. Cours. — *P. marylandica.* Bosc.)
- P. angulata.** Ait. — Amer. bor. (pars cent.-merid.).
(*P. balsamifera.* Mill. — *P. heterophylla.* Du Roy. — *P. macrophylla.* Lodd.)
3. *Tacamahaca.* Dipp.
- P. candicans.** Ait. — Amer. bor. (pars sept.).
(*P. canadensis* et *P. latifolia.* Mönch. — *P. ontariensis.* Desf. — *P. macrophylla.* Lindl. — *P. cordata.* Lodd.)

P. balsamifera. Lin. — Amer. bor. (pars sept.-centr.).

(*P. tacamahaca*. Mill.)

P. trichocarpa. Torr. et Gray. — California.

CXXX. — EMPETRACEÆ

EMPETRUM. LIN. (1753)

E. nigrum. Lin. — Eur.; Reg. Cauc.; Sibir.; Jap.; Am. bor

(*E. procumbens*. Lin. — *E. crassifolium*. Raf.)

Var. : *scotticum*. Hook.

" *tomentosum*.

E. rubrum. Vahl. — Amer. arct. et antarct.

(*E. medium*. Corn. — *E. purpureum*. Raf.)

MONOCOTYLEDONEÆ

CXXXI. — HYDROCHARIDEÆ

Trib. 2. — VALLISNERIEÆ.

VALLISNERIA. LIN. (1753)

V. spiralis. Lin. — Utrusque orb. reg. calid. et temp.

CXXXII. — ORCHIDEÆ

Trib. 1. — EPIDENDREÆ.

CALYPSO. SALISB. (1806)

C. borealis. Salisb. — Reg. bor.-temp.

(*C. bulbosa*. Reichb. — *C. americana*. R. Br. — *Cytheria borealis*. Salisb. — *Cypripedium bulbosum*. Lin. — *Norna borealis*. Wahlenb. — *Orchidium americanum*, *O. boreale* et *O. articum*. Sw.)

APLECTRUM. TORR. (1826)

A. hyemale. Torr. — Amer. bor.

(*Aplectra elatior*. Raf.)

TIPULARIA. NUTT.

T. discolor.

BLETIA. R. ET PAV. (1794)

1. *Eubletia*. Benth et Hook.

B. hyacinthina. R. Br. — China; Japon.

(*B. gebina*. Lindl. — *Gyas humilis*. Salisb. — *Jimensia nervosa*. Raf.)

Trib. 3. — NEOTTIEÆ.

LISTERA. R. BR. (1813)

L. ovata. R. Br. — Europa; As. bor.

(*Pollinirhiza*. Dulac. — *Ophrys bifolia*. Lamk. — *Ophrys ovata*.
Lin. — *Distomæa ovata*. Spenn. — *Epipactis ovalifolia*.
Stokes.)

SPIRANTHES. L. C. RICH. (1818)

1. *Euspiranthes*. Benth et Hook.**S. autumnalis.** L. C. Rich. — Europa.

(*Ophrys*. Balb. — *Ibidium*. Salisb. — *Gyrostachis*. Dmtr.)

GOODYERA. R. BR. (1813)

G. repens. R. Br. — Reg. bor.-temp.

(*G. marginata*. Lindl. — *Orchis repens*. Eystar. — *Elasmatum*
repens. Dulac. — *Gonogona repens*. Link. — *Epipactis repens*.
Crantz — *Peramum repens*. Salisb.)

CALOPOGON. R. BR. (1813)

C. pulchellus. R. Br. — Amer. bor.

(*Cathea pulchella*. Salisb.)

EPIPACTIS. ADANS. (1763)

E. latifolia. All. — Europ.; As. bor.

(*E. atropurpurea*. Raf. — *E. condensata* Boiss. — *E. consimi-*
lis. D. Don. — *E. Dalhousiae*. Wight. — *E. Hellebonne*. Crantz.
— *E. intrusa* et *E. macrostachya*. Lindl. — *E. purpurata*.
Sm. — *E. uliginosa*. Vest.)

Trib. 4. — OPHRYDEÆ.

ORCHIS. (TOURN.) LIN. (1753)

O. coriophora. Lin. — Europ.; Oriens.

(*O. cassidea*. Bieb. — *O. ciminia*. Crantz. — *O. coreosmus*.
S^t Lag. — *O. fragrans*. Pollini. — *O. Martrinii*. Timb. —
O. Polliniana. Spreng.)

O. militaris. Lin. — Europ.; Asia bor.

(*O. brachyata*. Gilib. — *O. cinerea*. Schrank. — *O. galeata*.
Poir. — *O. mimusops*. Thuil. — *O. nervata*. Marchand. —
O. Rivini. Gonau. — *O. signifera*. Vest.)

O. longibracteata. Bivona. — Europ. austr.

(*O. fragrans*. Ten. — *O. Robertiana*. Loisel. — *O. foliosa*. Masson. — *Barlia longibracteata*. Parlat. — *Aceras longibracteata*. Reichb.)

SERAPIAS. LIN. (1753)

S. Lingua. Lin — Europ. austr.

(*Orchis*. Scop. — *Ophrys limbata*. Link. — *Helleborine Lingua* et *Helleb. ocyglottis*. Pers.)

ACERAS. R. BR. (1813)

A. antropophora. R. Br. — Europa.

(*A. anthromorpha*. Steud. — *Ophrys antropophora*. Lin. — *Ophrys anthromorpha*. Willd. — *Loroglossum antropophorum* et *L. brachyglotte*. Rich. — *Himantoglossum antropophorum* Spreng.)

OPHRYS. LIN. (1753) PR. PART.

O. aranifera. Huds. — Europ.; Asia min.

(*O. araneola*. Reichb. — *O. crucigera*. Jacq. — *O. fucifera*. Sm. — *O. fuciflora*. Curt. — *O. mammosa*. Desf. — *O. pseudospeculum*. D.C. — *Myodium araniferum*. Salisb.)

O. bombilifera. Link. — Reg. mediter.

(*O. apiculata*. Rich. — *O. canaliculata*. Viv. — *O. labrofossa*. Brot. — *O. Pulla*. Ten. — *O. picta*. Salzm. — *O. tabanifera*. Willd. — *O. unilicata*. Desf.)

O. speculum. Link. — Reg. mediterr.

(*O. ciliata*. Bivona. — *O. Scolopax*. Willd. — *O. vernizia*. Brot.)

HABENARIA. WILLD. (1805)

3. *Leucorchis*. Benth et Hook.**H. albida.** R. Br. — Europa; Asia bor.

(*Orchis ecalcarata*. Coster et Vayr. — *Orchis parviflora*. Poir. — *Gymnadenia albida*. Rich. — *Entaticus albidus*. S. F. Gray. — *Bicchia albida*. Stokes. — *Blephariglotis albida*. Raf. — *Celoglossum albidum*. Hartm. — *Leucorchis albida* E. Mey. — *Platanthera albida*. Lindl. — *Peristylus albidus*. Lindl.)

SATYRIUM. SW. (1829)

S. carneum. Sims. —

(*Orchis foliacea*. Burm. — *Orchis carnea*. Ait.)

Trib. 5. — CYPRIPEDIEÆ.

CYPRIPEDIUM. LIN.

C. Calceolus. Lin. — Europa.

(*C. cruciatus*. Dulac. — *Calceolus alternifolius*. S^t Lag. —
Calceolus marianus. Crantz.

CXXXIII. — ZINGIBERACEÆ

Trib. 1. — ZINGIBEREÆ.

HEDYCHIUM. KOEN. (1783)

H. Gardnerianum. Rosc. — Reg. Himal.

(*Gamochelus speciosus*. Lestib.)

AMOMUM. LIN. (1753)

2. *Euamomum*. Benth. et Hook.

A. Granum Paradisi. Lin. — Afr. trop.

(*A. Afzelii*. Rosc. — *A. elatum*. Salisb. — *A. exscapum*. Sims.
— *A. grandiflorum*. Sm.)

ZINGIBER. ADANS. (1763)

2. *Lampuzium*. Horan.

Z. officinale. Rosc. — India orient.

Trib. 2. — MARANTEÆ.

MARANTA. PLUM. EX LIN. (1753)

M. arundinacea. Lin. — Amer. austr.

CALATHEA. G. F. W. MEY. (1818)

C. Mackoyana. Ed. Morre. — Brazil.

(*Maranta*. Ed. Morr.)

Trib. 3. — CANNEÆ.

CANNA. LIN. (1753)

C. indica. Lin. — Cosmop. trop.

(*C. nepalensis*. Wall. — *C. speciosa*. Rosc.)

Variet. hort. et hybrid. plur.

C. paniculata. R. et Pav. — Peruvia.

C. iridiflora. R. et Pav. — Peruvia.

C. limbata. Rosc. — Brazil.

(*C. patens*, Hook.)

CXXXIV. — MUSACEÆ

MUSA. LIN. (1753)

M. sapientum. Lin. — As. trop.

(*M. alphurica* et *M. mindanensis*. Miq. — *M. Balbisiana*. Colla.
— *M. Clifortiana*. Lin. — *M. odorata*. Lour. — *M. odoracea*.
Keil. — *M. seminiifera*. Lour. — *M. sikkimensis*. Kug. —
M. Trochlocladytarum. Lin. — *Karkandila malabarica*. Raf.)

M. Ensete. J.-F. Gmel. — Afric. trop.

(*Ensete edule*. Bruce. — *Nasium Theophrasti*. Pritz.)

M. chinensis. Sweet. — China.

(*M. Cavendishii*. Lamb.)

STRELITZIA. BANKS. (1788)

S. Reginae. Ait. — Afr. austr.

(*Heliconia Bihai*. G. Mill. — *Helic. Strelitzia*. J. F. Gmel.)

S. augusta. Thunb. — Afr. subtrop.

(*Heliconia alba* et *Hel. Bihai*. Lin. f. — *Hel. augusta*. Salisb.)

CXXXV. — BROMELIACEÆ

Trib. 2. — PITCAIRNIEÆ.

ENCHOLIRION. MART. (1830)

E. Saundersii. Ed. André. — Brazil?

(*Tillandsia Saundersii*. Ind. Kew.)

DYCKIA. SCHULT. (1830)

D. rariflora. Schult. — Brazil.

(*D. montevidensis*. C. Koch. — *D. remotiflora*. Otto. — *D. tuberosa*. Beer.)

D. floribunda. Grieseb. — Reg. argent.

HECHTIA. KLOTZSCH. (1835)

H. texensis. S. Wats. — Texas.

CXXXVI. — HÆMODORACEÆ

Trib. 2. — CONOSTYLEÆ.

ALETRIS. LIN. (1753)

A. farinosa. Lin. — Amer. bor.

(A. alba. Mchx.)

Trib. 3. — OPHIOPOGONEÆ.

OPHIOPOGON. KER. GAWL. (1807)

O. japonicus. Ker. Gawl. — Japon. .(O. umbraticola. Hance. — Chloopsis acaulis et C. caulescens.
Bl. — Flueggia japonica. Rich. — Flueggia anceps. Raf. —
Flueggia Wallichiana. Kirk. — Polygonastrum compressum.
Mœnch.)**O. Jaburan.** Lodd. — Japon.

(Flueggia. Kunth.).

Var. : foliis variegatis.

CXXXVII. — IRIDEÆ

Trib. 1. — MORÆEÆ.

IRIS. TOURN. ex LIN. (1753)

2. *Diaphane.* Benth. et Hook.**I. xyphioides.** Ehrh. — Europ. austr.

(I. xiphium. Jacq.)

3. *Juno.* Benth. et Hook.**I. foetidissima.** Lin. — Reg. medit.; Oriens.

(I. foetida. Thunbg. — I. spuria. Bertol.)

MARICA. KER. GAWL. (1803)

M. gracilis. Herb. — Amer. trop.

(M. humilis et Cypella gracilis. Klatt.)

TIGRIDIA. KER. GAWL. (1803)

T. Pavonia. Red. — Mexico.

(Ferraria Pavonia. Lin. fil. — Ferraria Tigridia. Sims.)

Var. : grandiflora.

T. conchiflora. Sweet. — Mexico.

FERRARIA. LIN. (1763)

F. undulata. Lin. — Afric. austr.

(*F. punctata*. Pers. — *Gladiolus indicus*. Mill. — *Moræa undulata*. Thunb.)

Trib. 2. — SISYRINCHIEÆ.

DIPLARRHENA. LABILL. (1798)

D. Moræa. Labill. — Australia.

BELAMCANDA. ADANS. (1763)

B. punctata. Moench. — China.

(*B. sinensis*. Red. — *Pardanthus sinensis*. Ker. Gawl. — *Pardanthus nepalensis*. Sweet. — *Ferraria crocea*. Salisb.)

WITSENIA. THUNB. (1782)

W. corymbosa. Thunb. — Africa austr.

Trib. 3. — IXIEÆ.

SCHIZOSTYLIS. BACK. ET HARV.

S. coccinea. Back. et Haw. — Afric. austr.

WATSONIA. MILL. (1759)

W. rosea. Ker. Gawl. — Afric. austr.

(*Neuberia*. Eckl. — *Gladiolus glumaceus*. Thunb. — *Gladiolus pyramidatus*. Andr. — *Gladiolus striatus*. Banks.)

W. iridiflora. Ait. — Afric. austr.

(*Gladiolus pyramydatis*. Lamk. — *Glad. iridifolius*. Jacq. — *Glad. marginatus*. Thunb. — *Antholyza fulgens*. Andr.)

Var. : *fulgens*.

W. coccinea. Herb. — Afr. austr.

CROCOSMIA. PLANCH. (1851)

C. aurea. Planch. — Afric. austr. et trop.

(*Crocanthus mosambicensis*. Klotzsch.)

TRITONIA. KER. GAWL.

T. crocosmiæflora. Hort. —

(*Montbretia crocosmiiflora*. Hort.)

GLADIOLUS. (TOURN.) LIN. (1753)

G. Lemoinei. — Stirps hybrid.

(*G. purpureo-auratus*. Hook. × *G. gandavensis*. Hort.)
Variet. *hortens. plurimæ*.

ANTHOLYZA. LIN. (1753)

A. æthiopica. Lin. — Africa austr.

(*A. præcilla*. Del. — *A. ringens*. Andr. — *Gladiolus pyramidalis*. Burm. — *Gladiolus stoloniferus*. Salisb.)

CXXXVIII. — AMARYLLIDÆ

Trib. 2. — AMARYLLÆ.

HESSEA. HERB. (1837)

H. crispa. Kunth. — Afric. austr.

(*Amaryllis cinnamomea*. L'Herit. — *Amar. crispa*. Jacq. — *Amar. pulchella*. Spreng. — *Imhofia unnamomea*. M. Rœm. — *Imhofia crispa*. Herb. — *Periphanes crispa*. Salisb.)

ZEPHYRANTHES. HERB.

Z. Atamasco. Herb. — Amer. boreal. (pars merid.).

(*Amaryllis Atamasco*. Lin. — *Amaryllis Atanasia*. Crantz. — *Amaryllis pulchella* et *Amaryllis verecunda*. Salisb.)

Z. sulphurea. Herb. — Amer. subtrop.

(*Amaryllis flava*. Pav.)

HIPPEASTRUM. HERB. (1821)

1. *Habranthus. Benth. et Hook.*

H. advenum. Herb. — Chili.

(*Habranthus advenus* et *Habr. hesperius*. Herb. — *Habr. mendocinus*. Phil. — *Habr. miniatus*. D. Don. — *Myostemma advena*. Salisb. — *Amaryllis advena*. Ker. Gawl.)

H. roseum. Baker. — Chili; Peruvia.

(*Habranthus pumilus*. Lodd. — *Habranthus roseus*. Sweet.)

CRINUM. LIN. (1753)

3. *Codocrinum. Baker.*

C. longifolium. Thunb. — Afr. austr.

(*C. Capense*. Herb. — *C. insigne*. Sweet. — *C. riparium* et *C. spofforthianum*. Herb. — *Amaryllis bulbisperma*. Burm. — *Amaryllis capensis*. Mill. — *Amaryllis longifolia*. Lin. — *Amaryllis riparia*. Burch. — *Erigone longiflora*. Salisb.)

C. variabile. Herb. — Afric. austr.

(*C. crassifolium*. Herb.)

C. Moorei. Hook. fil. — Afric. austr.

AMARYLLIS. LIN. (1753) PR. PART.

A. Belladonna. Lin. — Afric. austr.

(*A. blanda*, Ker. Gawl. — *A. pallida*, Dill. — *A. pudica*, Ker. Gawl. — *A. rosea*, Lamk. — *Imhofia rosea*, Salisb. — *Belladonna blanda* et *Bell. pudica*, Sweet. — *Callicore rosea*, Link.)

NERINE. HERB. (1820)

2. *Gatlatea*. Pax.**N. sarniensis.** Herb. — Afric. austr.

(*N. corusca*, *N. rosea* et *N. venusta*, Herb. — *N. cochinchinensis* et *N. Jacquini*, M. Roem. — *Galatea rosea* et *G. sarniensis*, Herb.)

CLIVIA. LINDL. (1828)

2. *Imatophyllum*. Pax.**C. miniata.** Rgl. — Africa austr.

(*Imatophyllum miniatum*, Hook.)

PHÆDRANASSA. HERB. (1845)

P. chloracra. Herb. — Péruvia.

(*P. obtusa*, Herb. — *P. multiflora*, Kunth. — *Crinum quitoense*, Spreng. — *Phycella obtusa*, Lindl.)

Trib. 3. — ALSTRÆMERIEÆ.

ALSTRÆMERIA. LIN. (1762) PR. PART.

A. aurantiaca. D. Don. — Chili.

(*A. aurea*, Meyen. — *A. concolor*, Steud. — *A. mutabilis*, Kunze.)

A. versicolor. R. et Pav. — Chili.

(*A. citrina*, *A. Kingii*, *A. tigrina* et *A. xantina*, Phil. — *A. nivalis*, Meyen. — *A. Cummingiana* et *A. tenuifolia*, Herb.)

A. pulchella. Lin. — Amer. austr.

(*A. psittacina*, Lehm. — *A. Banksiana*, M. Roem. — *Lilavia psittacina*, Raf.)

A. Errebaulti. Hort. — Stirps hybrida.

(*A. pellegrina*, Lin. × *A. pulchra*, Sims.)

BOMAREA. MIRB. (1804)

B. Kalbreyeri. Bak. — Nov. Granat.

Trib. 4. — AGAVEÆ.

POLIANTHES. LIN. (1753)

P. tuberosa. Lin. — Mexico.

(*P. gracilis*. Link. — *P. mexicana*. Zucc. — *Tuberosa*.
Heist.)

BRAVOA. LEX. (1824)

B. geminiflora. Lex. — Mexico.

(*B. Cætocapnia*. M. Rœm. — *Cætocapnia geminiflora*. Link.
et Otto.)

BESCHORNERIA. KUNTH. (1850)

B. yuccoides. C. Koch. — Mexico.

(*Fourcroya tubiflora*. Kunth et Bouché.)

B. argyrophylla. Hort. — ?

AGAVE. LIN. (1753)

Subg. 1. Aplagave. Terrace.

1. Singulifloræ. Pax.

A. maculata. Regl. — Texas.

(*A. maculosa*. Hook.)

2. Geminifloræ. Engelm.

A. filifera. Salm-Dyck. — Mexico.

(*A. filamentosa*. Salm-Dyck. — *Bonaparteia filamentosa*.
Boucen)

A. Kerchovei. Lem. — Mexico.

(*A. Beaucarnei*. Lem.)

A. heteracantha. Zucc. — Mexico.

(*A. lecheguilla*. Torr. — *A. Poselgerii*. Salm-Dyck.)

Var. : caulescens.

A. Henriquezii. Bak. — Mexico.

(*Littæa*. Brignoli.)

A. Victoriae Reginae. T. Moore. — California ; Mexico.

(*A. Consideranti*. Carr.)

A. univitatta. Haw. — Mexico.

(*A. ensifera*. Jacobi.)

A. xylonacantha. — Salm-Dyck. — Mexico.

(*A. amurensis* et *A. Kochii*. Jacobi. — *A. hybrida*. Versch.)

Var. : pumila.

A. dasyliroides. Jacobi et Bouché. — Guatemala.

(*A. dealbata*. Lem.)

A. striata. Zucc. — Mexico.

(*A. echinoides*. Jacobi. — *A. recurva*. Zucc. — *A. stricta*. Salm-
Dyck. — *Bonaparteia hystrix*. Hort. (Willd.)

- A. geminiflora.** Ker. Gawl. — Peruvia.
(*Bonapartea flagelliformis*. Henck. — *Bonapartea juncea*. Haw.
— *Littæa geminiflora*. Tagliabue.)
- A. albicans.** Jacobi. — Mexico.
(*A. Ouselghemiana*. Jacobi.)
- A. Celsii.** Hook. — Mexico.
(*A. Celsiana*. Jacobi.)
- A. attenuata.** Salm-Dyck. — Mexico.
(*A. glaucescens*. Hook.)
- A. yuccæfolia.** D.C. — Mexico.
(*A. Cohniana*. Jacobi. — *A. Hookeri*. C. Koch. — *A. spicata*. Guss.)
- Subg. 2. *Cladagave*. Terrace.
3. *Americanceæ*. Pax.
- A. americana.** Lin. — Amer. trop.
(*A. altissima*. Zumag. — *A. expansa*, *A. Furstenbergii* et
A. ornata. Jacobi. — *A. Milleri*. Haw. — *A. picta*. Salm-Dyck. — *A. ramosa*. Mœnch. — *A. spectabilis*. Salisb. —
A. virginica. Mill. — *Aloë americana* et *Aloë fœtida*. Crantz.)
Var. : foliis aureo marginatis.
- A. densiflora.** Hook. — Mexico.
- A. rigida.** Mill. — Mexico.
(*A. candelabrum*. Tod. — *A. elongata*. Jacobi. — *A. Ixlii*. Karw. — *A. Karwinskii*. Zucc. — *A. sisalana*. Perrine. —
A. angustifolia. Haw. — *Fourcroya rigida*. Haw.)
- A. Franzosini.** Bak. — ?
- A. Scolymus.** Karw. — Mexico.
(*A. amœna*. Lem. — *A. crenata* et *A. Schnittspahnii*. Jacobi.
— *A. Mescal*. Ellem. — *A. Saundersii*. Hook.)
4. *Submarginatæ*. Bak.
- A. ferox.** C. Koch. — Mexico.
(*A. Bonnetiana*. Peacock.)
- A. Shawii.** Engelm. California.
- A. atrovirens.** Karw. — Mexico.
(*A. Canartiana*, *A. coarctata*, *A. deflexispina*, *A. gracilis*,
A. latissima, *A. Lehmani*, *A. mitræformis*, *A. Ottonis* et
A. Schlechendatii. Jacobi. — *A. Salmiana*. Otto. — *A. thua-*
canensis. Karw.)
- A. applanata.** Lem. — Mexico.
(*A. cinerascens*. Jacobi.)
- A. Deserti.** Engelm. — California.

FOURCROYA. SPRENG. (1817)

PRIOR : FURCRÆA. VENT. (1793)

F. Lindeni. Jacobi. — Nova Granat.

F. Bedinghausii. C. Koch. — Amer. austr.
(*F. Ræzii*. Hort. — *Ræzia regia*. Hort.)

F. Demouliniana. Jacobi. — Mexico.
(*F. rigida*. Laudry. — *F. sobolifera*. Cels.)

DORYANTHES. CORR. (1802)

D. excelsa. Corr. — Australia.
(*Fourcroya australis*. Haw.)

D. Palmieri. W. Hill. — Austral.

CXXXIX. — DIOSCOREACEÆ

TESTUDINARIA. SALISB.

T. elephantipes. Burch. — Afr. austral.
(*Tamus*. L'Herit. — *Dioscorea*. Spreng.)

CXL. — LILIACEÆ

Trib. 1. — SMILACEÆ.

SMILAX. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Coprosmanthus*. Torr.

S. rotundifolia. Lin. — Amer. bor. (pars centr.).
(*S. caduca*. Lin. — *S. virginiana*. Mill. — *S. quadrangularis*.
Muhlbg.)

S. excelsa. Lin. — Eur. austr.; Oriens; Reg. Caucas.
(*S. Alpini*. Willd.)

S. aspera. Lin. — Eur. austr.; Oriens; Afr. bor.
(*S. mauritanica*. Poir. — *S. nigra*. Willd.)

S. sagittæfolia. ? —

Trib. 2. — ASPARAGEÆ.

RUSCUS. LIN. (1735)

R. aculeatus. Lin. — Eur. med. et austr.; Afr. bor.; Asia
minor; Reg. Caucas.
(*R. laxus*. Sm.)

R. Hypoglossum. Lin. — Eur. austr.; Asia minor.
(*R. microglossus*. Bertol.)

SEMELE. KUNTH (1850)

S. androgyna. Kunth. — Ins. Canar.

(Danaë androgyna et Dan. Gayæ. Webb. et Berth.)

DANAË. MEDIK. (1787)

D. Laurus. Medik. — Græcia ; Asia minor. ; Persia.

(D. racemosa. Mönch. — Danaïda racemosa. Link. — Ruseus racemosus. Lin.)

ASPARAGUS. TOURN. EX LIN. (1753)

3. *Myrsiphyllum*. Bak.**A. plumosus.** Bak. — Afr. austral. ?

(Myrsiphyllum asparagoides. Willd.)

A. medeolides. Thunb. — Afr. austr.

(Medeola asparagoides. Lin. — Medeola latifolia. Salisb. — Dræcæna medeolides. Lin. fl.)

Trib. 3. — LUZURIAGEÆ.

LAPAGERIA. R. ET PAV. (1802)

L. rosea. R. et Pav. — Chili.

(L. alba. Dcne. — L. Hookeri. Bridges. — Philesia rosea. D. Dietr.)

PHILESIA. COMM. EX JUSS. (1789)

P. Magellanica. S.-F. Gmel. — Chili austr. ; Reg. magellan.

(P. buxifolia. Lamk.)

EUSTREPHUS. R. BR. (1810)

E. latifolius. R. Br. — Australia.

(E. Brownii. F. Muell. — E. leucanthus. Hassk. — E. Watsonianus. Miq.)

Var. : angustifolius.

Trib. 4. — POLYGONATEÆ.

SMILACINA. DESF.

S. racemosa. Desf. — Amer. bor. (pars merid.).

(Convallaria. Lin. — Polygonastrum. Mönch.)

Trib. — 5. CONVALLARIEÆ.

CONVALLARIA. LIN. (1753)

C. majalis. Lin. — Reg. bor. temp.

Var. : grandiflora.

REINECKEA. KUNTH. (1810)

R. carnea. Kunth. — China : Japon.
(*Liriope*. Salisb.)

Trib. 6. — ASPIDISTREÆ.

ASPIDISTRA. KER. GAWL. (1823)

A. elatior. Blum. — Japon.
(*Plectogyne variegata*. Link.)
Var. : foliis variegatis.

ROHDEA. ROTH.

R. crinita. Roth. — Japonia.

Trib. 7. — HEMEROCALLÆ.

HEMEROCALLIS. LIN. (1753) PR. PART.

H. fulva. Lin. — Europ. et Asia temp.
(*H. crocea*. Lamk. — *H. disticha*. Don. — *H. flava*. Sutter. —
H. longituba. Miq.)

PHORMIUM. FORST. (1776)

P. tenax. Forst. — Nova Zeland.
(*P. ramosum*. Bilb. — *Chlamydia tenacissima*. Gærtn.)
P. Cookianum. Le Jolis. — Nova Zeland.
(*P. Colensoi* et *P. Forsterianum*. Hook.)

BLANDFORDIA. SM. (1804)

B. flammea. Lindl. — Austral.
(*B. princeps*. W. G. Smith.)
B. nobilis. Sm. — Austral.
(*B. grandiflora*. Lindl.)

FUNKIA. SPRENG. (1817)

PRIOR : HOSTA. TRATT. (1812)

1. *Niobe. Benth. et Hook.*
F. subcordata. Spreng. — Japon.
(*F. alba*. Sweet. — *F. grandiflora*. Sieb. et Zucc. — *Niobe cordifolia*. Salisb. — *Hemerocallis alba*. Andr. — *Hemeroc. japonica*. Thunb. — *Hemeroc. cordata*. Cav. — *Hemeroc. plantaginea*. Lamk. — *Hosta japonica*. Tratt. — *Hosta plantaginea*. Asschers.)

F. lancifolia. Spreng. — Japon.

(*F. albo-marginata*. Hook. — *F. undulata*. Otto et Dietr. — *Hemerocallis lancifolia*. Thunb. — *Hemerocallis undulata*. Sieb.)

2. **Bryocles.** Benth. et Hook.**F. ovata.** Spreng. — Japon.

(*F. cœrulea*. Sweet. — *F. lanceolata*, *F. marginata* et *F. spatulata*. Sieb. — *Hosta cœrulea*. Tratt. — *Bryocles ventricosa*. Salisb. — *Hemerocallis cœrulea*. Andr. — *Niobe japonica*. Salisb.)

F. Sieboldiana. Hook. — Japon.

(*F. cordata*. Sieb. — *F. maculata*, *F. sinensis*, *F. viridis* et *F. univittata*. Siebold. — *F. Sieboldii*. Lindl. — *Hemerocallis Sieboldiana*. Lodd.)

KNIPHOFIA. MCENCH. (1794)

K. aloïdes. Moench. — Afr. austr.

(*K. Uvaria*. Hook. — *Aletris Uvaria*. L. Mant. — *Tritoma Uvaria*. Willd. — *Aloë Uvaria*. Lin. — *Aloë rigida*. Salisb.)

K. Burchellii. Kunth. — Afr. austr.

(*K. laxiflora*. Kunth.)

K. caulescens. Bak. — Afr. austr.

Trib. 8. — ALOINEÆ.

GASTERIA. DUVAL. (1809)

G. verrucosa. Duval. — Africa austr.

(*G. intermedia*. Haw. — *Aloë acuminata* et *Aloë racemosa*. Lamk. — *Aloë carinata*. D C. — *Aloë disticha*. Thunb. — *Aloë intermedia*. Haw. — *Aloë Lingua*. Ker. Gawl. — *Aloë scaberrima*. Salm-Dyck. — *Aloë verrucosa*. Mill.)

G. nigricans. Duval. — Africa austr.

(*G. crassifolia*, *G. fasciata* et *G. subnigricans*. Haw. — *G. platyphylla*. Bak. — *Aloë guttata* et *Aloë pseudo-nigricans*. Salm-Dyck. — *Aloë nigricans*. Haw. — *Aloë subnigricans*. Spreng. — *Aloë crassifolia*. Schult.)

G. carinata. Duval. — Africa austr.

(*G. strigata*. Haw.)

G. disticha. Haw. — Africa austr.

(*G. angulata* et *G. longifolia*. Duval. — *G. angustifolia*, *G. denticulata* et *G. conspurcata*. Haw. — *Aloë angulata*. Willd. — *Aloë angustifolia* et *Aloë conspurcata*. Salm-Dyck. — *Aloë Lingua*. Thunb. — *Aloë linguiformis*. Mill. — *Aloë longifolia*. Haw.)

- G. pulchra.** Haw. — Africa austr.
(*Aloë pulchra*. Ker. Gawl. et *Aloë pulchra*. Jacq.)
- G. acinacifolia.** Haw. — Afric. austr.
(*G. ensifolia*, *G. pluripunctata* et *G. venusta*. Haw. — *Aloë acinacifolia*. Jacq. — *Aloë ensifolia* et *Aloë nitens*. Schult.)
- G. picta.** Haw. — Afric. austr.
(*G. formosa*. Haw. — *Aloë Boureana*. Schult.)
- G. candicans.** Haw. — Afric. austr.
(*G. linita*. Haw. — *Aloë candicans*. Schult.)

ALOË. TOURN. EX LIN. (1753)

1. *Eualoë*. Bak.

- A. arborescens.** Mill. — Afr. austr.
(*A. frutescens*. Salm-Dyck. — *A. fruticosa*. Lamk. — *A. perfoliata*. Meyen.)
- A. striata.** Haw. — Afr. austr.
(*A. albo-cincta*. Haw. — *A. paniculata*. Jacq. — *A. Hanburyana*. Naudin)
- A. aristata.** Schult. — Afric. austr.
(*A. longiaristata*. Schult.)
- A. saponaria.** Haw. — Afric. austr.
(*A. maculosa*. Lamk. — *A. trichotoma*. Colla. — *A. umbellata*. Salm-Dyck. — *A. disticha*. Mill.)
- A. virens.** Haw. — Afric. austr.
- A. brevifolia.** Mill. — Afric. austr.
- A. grandidentata.** Salm-Dyck.
- A. ciliaris.** Haw. — Afric. austr.
- A. zebrina.** Bak. — Afric. trop.
- A. Hildebrandtii.** Bak. — Afric. subtrop.
- A. abyssinica.** Lamk. — Abyssinia.
(*A. Peacockii*. Bak. — *A. percrassa*. Tod.)
- A. spicata.** Lin. fl. — Afric. austr.
- A. vera.** Lin. — Reg. Mediterr.
(*A. barbadensis*. Mill. — *A. ellongata*. Murr. — *A. flava*. Pers. — *A. indica*. Royle. — *A. officinalis*. Forsk. — *A. littoralis*. Koen. — *A. vulgaris*. Lamk.)

2. *Gonialoë*. Bak.

- A. variegata.** Lin. — Afric. austr.
(*A. punctata*. Haw.)

3. *Pachydendron*. Bak.

- A. africana.** Mill. — Afric. austr.
(*A. pseudo-africana*. Salm-Dyck.)
- A. succotrina.** Lamk. — Afric. trop. et austr.
(*A. sinuata*. Thunb. — *A. vera*. Mill.)

A. ferox. Mill. — Afric. austr.

(*A. horrida* et *A. muricata*. Haw. — *Pachydendron ferox*. Haw.
— *Busipho ferox*. Salisb.)

A. macrocarpa. Tod. — Abyssinia.

APICRA. WILLD. (1811)

A. spiralis. Bak. — Afric. austr.

(*A. imbricata*. Willd. — *Aloë imbricata*. Haw. — *Aloë spiralis*.
Lin. — *Haworthia imbricata*. Haw. — *Haworthia spiralis*.
Duval.)

HAWORTHIA. DUVAL. (1809)

H. attenuata. Haw. — Afric. austr.

(*H. clariperla*. Haw. — *Apicra attenuata*. Willd. — *Aloë*
attenuata. Haw. — *Aloë clariperla*. Schult.)

H. margaritifera. Haw. — Afric. austr.

(*H. brevis*, *H. erecta*, *H. granata* et *H. semi-margaritifera*.
Haw. — *H. major*, *H. maxima* et *H. minor*. Duval. —
H. multiperlata. Steud. — *Aloë obliqua*. Haw. — *Aloë erecta*,
Aloë granata, *Aloë subalbicans* et *Aloë semi-margaritifera*.
Salm-Dyck. — *Aloë margaritifera*. Burm. — *Aloë minor*.
Schult. — *Apicra marginata* et *Apicra granata*. Willd. —
Apicra maxima et *Apicra minor*. Steud.)

H. retusa. Duval. — Afric. austr.

(*H. mutica*. Haw. — *Aloë retusa*. Lin. — *Apicra retusa*. Willd.)

H. tessellata. Haw.

(*H. parva*. Haw. — *Aloë parva* et *Aloë tessellata*. Schult.)

H. altilinea. Haw. — Afric. austr.

(*H. aristata*, *H. limpida* et *H. mucronata*. Haw. — *Aloë alti-*
linea. Schult.)

H. atrovirens. Haw. — Afric. austr.

(*Aloë*. D.C.)

H. lætevirens. Haw. — Afric. austr.

(*Aloë*. Link)

H. Radula. Haw. — Afric. austr.

(*Aloë*. Jacq. — *Apicra*. Willd.)

H. mirabilis. Haw. — Afric. austr.

(*Apicra*. Willd.)

H. tortuosa. Haw. — Afric. austr.

(*H. tortella*. Haw.)

H. turgida. Haw. — Afric. austr.

(*Aloë*. Schult.)

Trib. 10. — LOMANDREÆ.

XANTHORRHÆA. SM. (1804)

X. hastilis. R. Br. — Austr. orientalis.

Trib. 12. — DRACÆNEÆ.

YUCCA. LIN. (1753)

Y. aloëfolia. Lin. — Mexico et Amer. bor. (pars merid.)Var. : quadricolor.
draconis.

(Y. draconis. Lin.)

Y. guatemalensis. Bak. — Guatemala.

(Y. Lenneana.)

Y. Desmettiana. Bak. — Mexico.

Var. : rubra.

Y. gloriosa. Lin. — Amer. bor. (pars merid.)

Var. : recurvifolia.

(Y. pendula. Sieber.)

Var. : obliqua.

(Y. obliqua. Haw.)

Var. : flava striata.

" plicata (Carr.).

Y. filamentosa. Lin. — Amer. bor. (pars merid.).

Var. : flaccida.

Y. canaliculata. As. Gray. — Texas.

Y. Treculeana. Carr.)

Y. Whipplei. Torr. — California.

DRACÆNA. VAND. (1762) ET L. MANT. (1767)

D. Draco. Lin. — Ins. Canar.

(D. Boerhavi. Ten. — D. Clusii, D. dragonalis et Edera dragonalis. Crantz. — D. resinifera. Salisb. — D. yucciformis. Vand.)

CORDYLINE. ROYEN. EX ADANS. (1763)

C. stricta. Endl. — Australia.

(C. angustifolia. Kunth. — C. congesta. Endl. — Draco congesta. Sweet.)

C. indivisa. Steud. — Nova Zelandia.

(Dracæna. Forst. — Charlwoodia. G. Don. — Dracænopsis. Planch.)

Var. : lineata.

C. rubra. Hueg. ex. Cunn. — Nova. Zeland.

(Charlwoodia. Planch.)

C. terminalis. Kunth. — As. trop.; Austr.

(C. cannæfolia. R. Br. — C. Eschscholziana. Mart. — C. gloriosa. Lind. et André. — C. hedychioides et C. Manners-Suttoniæ. F. Muell. — C. Jacquini. Kunth. — C. Regina. Veitch. — C. Sieberii. Kunth. — C. Ti. Scholl. — Calodraccon terminalis. Planch. — Dracæna ferrea et D. terminalis. Lin. — D. Guiltfoley. Veitch. — D. Sepiaria. Seem.)

NOLINA. MCHX. (1803)

N. recurvata. Hemsl. — Mexico.

(*Beaucarnea recurvata* et *Beaucarnea stricta*. Lem. — *Roulinia recurvata*. Brong.)

N. longifolia. Hemsl. — Mexico.

(*Dasyllirion longifolium*. Zucc. — *Beaucarnea longifolia*. Bak.)

DASYLIRION. ZUCC. (1838)

D. acrotrichum. Zucc. — Mexico.

(*D. gracile*. Zucc. — *D. graminifolia*. S. Wats. — *Bonaparteia gracilis*. Sweet.)

D. quadrangulatum. S. Wats. — Mexico.

D. Wheeleri. S. Wats. — Amer. bor.-occ.

D. Vidarum. Hort. Winter. (Species nova). — ?

ASTELIA. BANKS ET SOLAND (1788)

A. Banksii. A. Cunn. — Nova Zelandia.

(*A. Riccardi*. Kunth.)

Trib. 13. — ASPHODELEÆ.

ASPHODELINE. RCHB. (1830)

A. lutea. Rchb. — Reg. medit. et caucas.; As. min.

(*Asphodelus*. Lin. — *Dorydium*. Salisb.)

BULBINE. LIN. (1753)

B. frutescens. Willd. — Afric. austr.

(*B. caulescens*. Lin.)

BOWIEA. HARV. (1867)

B. volubilis. Harv. — Afr. austr.

EREMURUS. MARSC. BIEB. (1818)

E. Bungei. Bak. — Peruvia.

(*E. aurantiacus*. Bak. — *Ammolirium stenophyllum*. Boiss. et Buhse.)

CHLOROPHYTUM. KER. GAWL. (1808)

C. elatum. R. Br. — Afric. austr.

(*Asphadelus capensis*. Lin.)

PASITHEA. D. DON. (1832)

P. cærulea. D. Don. — Chili.

Trib. 15. — ALLIEÆ.

AGAPANTHUS. L'HERIT. (1788)

A. umbellatus. L'Herit. — Afric. austr.

(*A. africanus*. Hoffms. — *A. tuberosus*. Lin. — *A. umbelliferus*. Poir. — *A. præcox*. Willd. — *A. medius* et *A. minor*. Lodd. — *Mauhlia africana*. Dahl. — *Mauhlia linearis*. Thunb.)

Var. : minor (Mooreanus.)

" flore albo pleno.

BESSERA. SCHULT. (1829)

B. elegans. Schult. — Mexico.

(*B. fistulosa*. Pritz. — *B. herberti*. G. Don. — *B. multiflora*. Mart. et Gal. — *Pharium elegans*. Steud.)

Trib. 16. — SCILLEÆ.

LACHENALIA. JACQ. (1787)

1. *Eulachenia*. Bak.**L. pendula.** Soland. — Afric. austr.

(*L. linguæformis*. Lamk.)

GALTONIA. DCNE. (1880)

G. candicans. Dcne. — Afr. austr.

(*Hyacinthus*. Bak.)

ALBUCA. LIN. (1762)

2. *Falconera*. Bak.**A. fastigiata.** Dryand. — Afr. austr.

(*Falconera*. Salisb. — *Nemaulax*. Rav.)

URGINEA. STEINHEIL. ()

U. Scilla. Steinh. — Reg. medit.

(*Scilla maritima*. Lin. — *Ornithogalum Squilla*. Bot. Mag.)

HYANCINTHUS. (TOURN.) LIN. (1753)

H. amethystinus. Lin. — Hispan.; Pyren.; Croat.

(*H. angustifolius*. Medik. — *H. hispanicus*. Lamk. — *H. curvifolius*. Gord. et Fourr.)

EUCOMIS. L'HERIT. (1788)

E. punctata. L'Herit. — Afr. austr.

(*E. striata*. Don. — *Eucomea elata*. Salisb. — *Asphodelus commosus*. Houtt. — *Basileia punctata*. Mierb.)

Trib. 17. — TULIPEÆ.

LILIUM. TOURN. EX LIN. (1753)

2. *Eulirion*. Rchb.**L. japonicum**. Thunb. — Japon.(L. *Brownii*. Poit. — L. *odorum*. Planch.)**L. candidum**. Lin. — Eur. austr.; Oriens.(L. *byzanthinum*. Steud. — L. *peregrinum*. Mill. — L. *striatum*. Bak.)Var. : *striatum*.3. *Archelirion*. Bak.**L. tigrinum**. Ker. Gawl. — China; Japon.(L. *Lishanni*. T. Moore. — L. *pomponium*. Lour. — L. *speciosum*. Andr. — L. *splendens*. Bak.)Var. : *Fortunei*.(L. *Fortunei*. Lindl.)**L. auratum**. Lindl. — Japon.(L. *Dexteri*. Hovey. — L. *Wittei*. Suring.)4. *Isolirion*. Bak.**L. lancifolium**. Thunb. — Japon.(L. *bulbiferum*. Thunb.)Var. : *album*." *rubrum*.**L. elegans**. Thunb. — Japon.(L. *Thunbergianum*. Schult. — L. *alternans*. Sieb. — L. *Kamtshatkense*. Lour. — L. *philadelphicum*. Thunb.)Var. : *elegans*.**L. Catesbæi**. Walt. — Amer. bor.(L. *carolinianum*. Bosc. — L. *spectabile*. Salisb.)5. *Martagon*. Bah.**L. pardalinum**. Kellog. — California.(L. *californicum* et L. *Washingtonianum*. Donbrainn. — L. *Ræzlii*. Rgl.)**L. monadelphum**. Marsc. Bieb. — Reg. Caucas.(L. *Szowitsianum*. Fisch et Avé-Lall. — L. *Ledebourii*. Boiss. — L. *Loddigesianum*. Schult.)**L. Pomponium**. Lin. — Sibir.(L. *angustifolium*. Mill. — L. *rubrum*. Lamk.)Var. : *rubrum*.

Trib. 18. — COLCHICACEÆ.

COLCHICUM. LIN. (1753)

C. autumnale. Lin. — Europa.

Trib. 21. — NOULARIÆ.

GLORIOSA. LIN. (1753)

G. simplex. Lin. — Afr. trop.

(*G. Plantii*, Loud. — *G. cœrulea*, Mill. — *G. virescens*, Lindl.
— *Methonica Gloriosa*, Salisb. — *Methonica grandiflora*,
Hook. — *Methonica Pettersiana*, Klotzsch. — *Methonica*
Leopoldi, Van Hout.)

TRICYRTIS. WALL. (18..)

T. hirta. Hook. — Japon.

Var. : flore nigro.

CXLI. — COMMELINACEÆ

Trib. 2. — COMMELINÆ.

COMMELINA. PLUM. ex LIN.

1. *Eucommelina*. Clarke.

C. cœlestis. Willd. — Mexico.

(*C. tuberosa*, D.C.)

Trib. 3. — TRADESCANTIÆ.

TRADESCANTIA. LIN. (1753)

1. *Eutradescantia*. Clarke.

T. virginica. Lin. — Amer. bor. (pars merid.).

(*Ephemerum congestum*, Mönch.)

Var. : alba.

T. discolor. Sm. — Mexico.

CXLII. — JUNCACEÆ

JUNCUS. (TOURN.) LIN. (1753)

3. *Genuini*. Buchen.

J. effusus. Lin. — Amphig.

(*J. communis*, E. Mey. — *J. conglomeratus*, Lin. — *J. diffu-*
sus, Hoppe. — *J. fistulosus*, Gnos. — *J. glomeratus*, Thunb.)

CXLIII. — PALMÆ

Trib. 1. — ARECEÆ.

RHOPALOSTYLIS. WENDL. ET DRUDE (187...)

R. sapida. Wendl. — Nova Zeland.*(Areca. Soland. — Kentia. Mart.)***R. Baueri.** Hook. — Ins. Norfolk.*(Areca. Hook. — Kentia. Seem.)*

PTYCHOSPERMA. LABILL. (17...)

P. elegans. Wendl. — Austr. orient.*(Sæforthia. R. Br.)*

HOWEA. BECC. (1877)

H. Forsteriana. Becc. — Ins. Dom. Howe.*(Grisebachia. Wendl. et Drude. — Kentia. F. Muell.)*

Trib. 2. — PHŒNICEÆ.

PHŒNIX. LIN. (1753)

P. canariensis. Hort. — Ins. Canar.*(P. Jubæ. Webb)***P. reclinata.** Jacq. — Afr. trop. et austr.*(P. echinoxialis. Boj. — P. leonensis. Lodd. — P. spinosa. Schum. et Thonn.)*

Trib. 3. — CORYPHEÆ.

SABAL. ADANS. (1763)

S. Blackburniana. Kirk. — Ind. occid.*(S. umbraculifera. Mart. — Corypha umbraculifera. Jacq.)***S. longipedunculata.** — Amer. subtrop.**S. Adansonii.** Guerns. — Amer. bor. (pars merid.).*(Chamærops acaulis. Mchx. — Chamærops glabra. Mill. — Corypha minor. Jacq. — Corypha pumila. Walt. — Brahea minima. H. Wendl.)*

CHAMÆROPS. LIN. (1753)

C. humilis. Lin. — Reg. mediter.-occid.

BRAHEA. MART. (1830)

B. Rezii. Linden. — Arizona.

PRITCHARDIA. SEEM. ET WENDL. (1861)

2. *Washingtonia. Drude.*

P. filifera. Lind. — California.

P. robusta. Hort. — ?

(*Washingtonia robusta.* Wendl.)

LIVISTONA. R. BR. (1810)

L. australis. Mart. — Australia.

(*Corypha.* R. Br.)

L. sinensis. R. Br. — China.

TRACHYCARPUS. WENDL. (187...)

T. excelsa. Wendl. — China.

(*Chamærops.* Thunb.)

T. martiana. Wendl. — Nepal.

(*Chamærops.* Wall. — *Chamærops nepalensis.* Lodd.)

RHAPIS. LIN. (1753)

P. flabelliformis. Ait. — China.

Trib. 5. — LEPIDOCARYEÆ.

CALAMUS. (1753)

?

C. quadrangulatus ?

Trib. 6. — COCOINEÆ.

DIPLOTEMIUM. MART. (1824)

D. campestre. Mart. — Braz. austr.

(*Cocos.* Drude.)

COCOS. LIN. (1753)

2. *Syagrus. Drude.*

C. flexuosa. Mart. — Brazil.

4. *Glaziova. Drude.*

C. Weddelliana. H. Wendl. — Brazil.

(*Glaziova Martiana.* Glaz. — *Glaz. elegantissima.* Mart.)

C. Bonneti. Lind. — Brazil austral.

JUBÆA. H. B. ET K. (1815)

J. spectabilis. H. B. et K. — Chili.

(*Cocos chilensis*. Molin. — *Micrococos chilensis*. Phil. — *Molinæa microcos*. Bert.)

CXLIV. — AROIDEÆ

Trib. 2. — MONSTEROIDEÆ.

MONSTERA. ADANS. (1763)

M. deliciosa. Liebm. — Amer. trop.

(*Monstera Lennea*. C. Koch. — *Philodendron pertusum*. Kunth. et Bouché.)

Trib. 5. — PHILODENDROIDEÆ.

PHILODENDRON. SCHOTT. (1829)

P. giganteum. Schott. — Amer. trop.

ZANTEDESCHIA. SPRENG.

Z. æthiopica. Spreng. — Afr. austr.

(*Calla æthiopica*. Lin. — *Richardia*. Schott. — *Richardia africana*. Kunth.)

Var. : albo-maculata.

Trib. 6. — COLOCASIOIDEÆ.

COLOCASIA. SCHOTT. (1832)

1. *Tuberosæ.* Engl.

C. antiquorum. Schott. — As. trop.

(*C. esculenta*. Schott.)

Trib. 7. — AROIDEÆ.

ARUM. (TOURN.) LIN. (1753)

A. discolor. Voigt. — Hab. ?

CXLV. — CYPERACEÆ

Trib. 1. — SCIRPEÆ.

CYPERUS. (MICHELI.) LIN. (1753)

3. *Eucyperus*. Benth.

C. alternifolius. L. Mant. — Ins. Madagascar.

FICINIA. SCHRAD. (1832)

F. Poirerii. Kunth. — Afric. austr.

(*Isolepis gracilis*. Nees. — *Isolepis Poirerii*. Steud.)

Trib. 6. — CARICEÆ.

CAREX. (DILL.) LIN. (1753)

1. *Monoiceæ*. Fries.

C. scaposa. Clarke. — China.

10. *Cyrtostomeæ*. Nyman.

C. riparia. Curt. — Reg. bor. et austral.

(*C. acuta*. All. — *C. crassa*. Ehrb.)

Var. : foliis variegatis.

CXLVI. — GRAMINEÆ

Trib. 2. — ANDROPOGONEÆ.

MISCHANTUS. ANDERSS. (1855)

M. sinensis. Anderss. — China ; Japon.

(*Eulalia japonica*. Trin.)

Var. : zebrina.

Trib. 5. — PANICEÆ.

PENNISETUM. RICH. IN PERS. (1805)

3. *Gymnothrix*. Benth.

P. latifolium. Spreng. — Reg. Argentina.

(*Gymnothrix latifolia*. Schult)

STENOTAPHRUM. TRIN.

S. dimidiatum. Durand. — Amphig. trop.

(*S. glabrum*. Trin. — *S. americanum* ?)

Trib. 7. — PHALARIDEÆ.

PHALARIS. LIN. (1735)

P. arundinacea. Lin. — Reg. bor. temp.

(*P. americana*. Fourn. — *Baldingera colorata*. Gært. — *Baldingera arundinacea*. Dmtr. — *Digraphis arundinacea*. Trin. — *Arundo colorata*. Ait.)
 Var. : *picta*.

ANTHOXANTHUM. LIN. (1753)

A. odoratum. Lin. — Reg. bor. temp.

(*A. alpinum*. Schur. — *A. villosum*. Dmtr.)

Trib. 8. — AGROSTIDEÆ.

STIPA. LIN. (1753)

S. pinnata. Lin. — Europa.

AGROSTIS. LIN. (1753)

A. vulgaris. With. — Reg. temp.

(*A. dubia*. D.C. — *A. pumila*. L. Mant.)

A. stolonifera. Lin. — Europa.

CALAMAGROSTIS. ROTH. (1763)

2. *Deyeuxia*. Hack.

C. elegans. Hack. — Bolivia.

(*Deyeuxia elegans*. Wedd.)

Var. : *variegata*.

Trib. 9. — AVENEÆ.

DESCHAMPSIA. P. BEAUV. (1812)

3. *Avenella*. Hack.

D. flexuosa. Trin. — Reg. bor. temp.

(*Aira*. Lin. — *Avenella*. Parl. — *Avenella cuprina*. Schur. — *Avenella rubra*. Sord. — *Lerchenfeldia cuprina, flexuosa et uliginosa*. Schur.)

Trib. 11. — FESTUCEÆ.

GYNERIUM. HUMB. ET BONPL. (1809)

G. argenteum. Nees. — Brazil.

Var. : *Violaceum* (foliis aureo lineatis.)

(*Arundo dioica*. Spreng.)

ARUNDO. TOURN. EX LIN. (1753)

A. Donax. Lin. — Reg. medit.; Oriens.

(*A. latifolia*. Salisb. — *A. sativa*. Lamk. — *A. scriptoria*. Lin.
— *Donax arundinaceus*. Bauv. — *Donax sativus*. Presl.)
Var. : foliis albolineatis.

CYNOSURUS. LIN. (1753)

1. *Cynosurus. Benth.***C. cristatus.** Lin. — Euröp. et Reg. Caucas.

POA. LIN. (1753)

2. *Eupoa. Hack.***P. pratensis.** Lin. — Reg. bor. temp.

(*P. angustifolia*. Lin. — *P. cinerea*. Vill. — *P. humilis* et
P. glabra. Ehrh. — *P. depressa*. Presl. — *P. subcærulea*. Sm.)

P. nemoralis. Lin. — Reg. bor. temp.

FESTUCA. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Eufestuca. Hack.***F. ovina.** Lin. —

(*F. tenuifolia*. Sm. — *F. capillata*. Lamk. — *F. amethystina*.
Host. — *F. duriuscula*. Lin. — *F. heterophylla*. Wahlb.)

BROMUS. DILL. EX LIN. (1753)

1. *Festucoïdes. Coss. et Dur.***B. erectus.** Huds. — Eur. et Asia minor.

(*B. perennis*. Vill. — *B. agrestis*. All.)

Trib. 12. — HORDEÆ.

LOLIUM. LIN. (1753)

L. perenne. Lin. — Eur. et Asia temp.

(*L. strictum*. Presl. — *L. tenue*. Lin. — *L. asperum*. Roth. —
L. complanatum. Schrad. — *L. cristatum*. Pers. — *L. gracile*.
Dumrtr.)

Trib. 13. — BAMBUSEÆ.

ARUNDINARIA. MCHX. (1803)

A. Falconeri. Benth. et Hook. — Reg. Himal.

(*Thamnocalamus*. Munro. — *Bambusa floribunda*. Munro.)

- A. Khasiana.** Munro. — Reg. Himal.
A. falcata. Nees. — Reg. Himal.
 (*A. interrupta*. Trin. — *Bambusa gracilis*. Hort.)
A. Simoni. Rivière. — China.
 (*A. Maximowiczii*. Hort. — *A. Fortunei*. Fenzl. — *Bambusa Simonica*. Carr.)
A. japonica. Sieb. et Zucc. — Japon.
 (*Bambusa Metake*. Sieb.)
A. Hindsii. Munro. — China austr. (Hong-Kong).
 (*Bambusa erecta*. Hort.)
A. Fortunei. A. et C. Riv. — Japon.
 (*Bambusa Fortunei*. Van Hout. — *Bambusa picta*. Sieb. et Zucc.)
 Var. : *argentea variegata*.
A. Veitchii. N. E. Br. — Japon.
 (*A. Kurilensis*, var. *paniculata*. Sm. — *Bambusa Veitchii*. Carr.)

PHYLLOSTACHYS. SIEB. ET ZUCC. (1843)

- P. nigra.** Munro. — China ; Japon.
 (*P. puberula*. Munro. — *Bambusa nigra*. Lodd. — *Bambusa dichotoma*. Don. — *Bambusa puberula*. Miq.)
P. viridi-glaucescens. A. et C. Riv. — China bor.
P. violascens. A. et C. Riv. — Hab. ?
P. aurea. A. et C. Riv. — Japon ; China.
P. mitis. A. et C. Riv. — China.
 (*P. edulis*. A. et C. Riv. — *Bambusa mitis*. Poir.)
P. Quillioi. A. et C. Riv. — Japon.
 (*Bambusa*. Carr. — *Bambusa Mazeli*. Hort.)

BAMBUSA. SCHREB. (1789)

1. *Eubambrisa*. Hack.
B. tessellata. Munro. — China.
 (*B. Ragamowskii*. Hort.)
B. nana. Hort. — Hab. ?

MELOCANNA. TRIN. (1821)

- M. bambusoides.** Trin. — Ind. or.
 (*M. Rheedii*. Steud. — *Bambusa baccifera*. Roxb.)
-

GYMNOSPERMEÆ

CXLVII. — GNETACEÆ.

EPHEDRA. TOURN. EX LIN. (1753)

E. altissima. Desf. — Afr. bor.

(*E. fragilis*. Lowe. — *Chaetocladius altissima*. Senilis. (Nelson.)

E. monosperma. S. F. Gmel. — Asia bor.; China.

(*E. monostachya*. Turcz. — *E. polygonoides*. Siev.)

CXLVIII. — CONIFERÆ

Trib. 1. — CUPRESSINEÆ.

CALLITRIS. VENT. (1808)

2. *Tetraclinis*. Benth. et Hook.

C. quadrivalvis. Vent. — Afr. bor.

(*Frenela Fontanesii*. Mirb. — *Cupressus articulata*. Forbes.)

3. *Hexaclinis*. Benth. et Hook.

C. oblonga. Rich. — Tasmania.

(*Frenela Gunnii*. Endl. — *Frenela macrostachya*. Knight. —
Frenela australis. R. Br.)

C. Hugelli. Knight. — Austr. occid.

(*Frenela*. Hort.)

FITZ. ROYA. HOOK. FIL. (1851)

F. patagonica. Hook. fl. — Reg. Magellan.; Chili austr.

LIBOCEDRUS. ENDL. (1847)

L. Doniana. Endl. — Nova Zelandia.

(*Dacrydium plumosum*. D. Don.)

L. chilensis. Endl. — Chili.

THUYA. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Euthuya*. Benth. et Hook.

T. occidentalis. Lin. — Am. bor. (pars. sept. et centr.).

(*T. obtusa*. Mœnch.)

Var. : Ellwangeriana.

" Wareana.

(*T. occid. robusta*. Carr.)

Var. : Vervaneanea.

" lutea.

" recurva nana.

2. *Macrothuya*. Benth. et Hook.

T. gigantea. Nutt. — Amer. bor.-occid.

(*T. plicata*. Lamb. — *T. Menziesi*. Dougl. — *T. Douglasi*. Nutt.
— *Libocedrus Craigiana*. Low.)

Var. : atrovirens.

THUYOPSIS. SIEB. ET ZUCC. (1804)

T. dolabrata. Sieb et Zucc. — Japon.

(*Thuya*. Lin. — *Platycladus*. Spach.)

Var. : nana.

(*Thuyopsis laetevirens*. Lindl.)

BIOTA. { ENDL. (1847)
D. DON. (1828)

B. orientalis. Endl. — China bor. ; Japon mont.

(*Th. orientalis*. Lin. — *Th. acuta*. Mœnch. — *Cupressus Thuya*.
Targ. — *Platycladus stricta*.)

Var. : compacta.

(*B. orientalis nana*. Carr. — *B. japonica* et *B. Zuccariniana*.
Sieb. — *B. orientalis Sieboldi*. Endl.)

Var. : elegantissima (Gord.)

" filiformis (Henk. et Höchst.)

(*B. pendula*. Endl. — *B. pendula recurvata*. Gord. — *Thuya*
pendula. Lamk. — *Thuya filiformis*. Lodd. — *Cupressus*
pendula. Thunb. — *Cupressus patula*. Pers.)

CHAMÆCYPARIS. SPACH. (1842)

C. sphæroïdea. Spach. — Amer. bor.-or. (p. sept. et centr.).

(*Cupressus thuyoides*. Lin. — *Thuya sphæroïdalis*. Rich.)

Var. : Ericoides (Beissn. et Höchst.)

(*C. ericoides*. Carr. — *Retinospora ericoides*. Zucc. — *Widdring-*
tonia ericoides. Knight.)

C. Lawsoniana. Parl. — California; Orégon.(C. *Boursieri*. Carr. — *Cupressus Lawsoniana*. Murr.)

Var. : Erecta viridis.

" Alumi.

" Fraseri.

" glauca.

" intertexta.

" Nana albo-spicata.

C. Nutkaënsis. Spach. — Amer. bor.-occid. (pars sept.).(Thuya *excelsa*, Bong. — *Cupressus Nutkaënsis*. Hook. — *Cupressus americana*. Trautv.)

Var. : glauca.

C. pisifera. Sieb. et Zucc. — Japon.(Retinospora. Sieb. et Zucc. — Thuya. Benth. et Hook. — *Cupressus*. C. Koch.)

Var. : Squarrosa.

(C. *squarrosa*. Sieb. et Zucc. — C. *squarrosa leptoclada*. Endl. — *Cupressus squarrosa*. Laws. — Retinospora *squarrosa*. Sieb. et Zucc. — Retinospora *leptoclada*. Zucc.)

Var. : Plumosa.

(Retinospora *plumosa*. Veitch.)

Var. : Plumosa argentea.

" Plumosa aurea.

" Aurea.

C. obtusa. Sieb et Zucc. — Japon.(Retinospora. Sieb. et Zucc. — Thuya. Benth. et Hook. — *Cupressus*. C. Koch.)

Var. : compacta.

" Flava spicata.

CUPRESSUS. (TOURN.) LIN. (1753)

C. Mac-Nabiana. Murr. — California.(C. *glandulosa*. Hook. — Juniperus *Mac-Nabiana*. Alws.)**C. macrocarpa.** Hartw. — California.(C. *longbertiana* et C. *Hartwegi*. Carr.)**C. sempervirens.** Lin. — Reg. med.; Asia occ.; Reg. Himal.

Subspec. : Fastigiata. D.C.

(C. *femina*. Cæsalp. — C. *pyramidalis*. Targ. — C. *australis*. Low. — C. *connoidea*. Spad. — C. *elongata*. Salisb.)**C. torulosa.** D. Don. — Reg. Himal.(C. *pendula*. Griv. — C. *nepalensis*. Loud. — C. *Tournefortii*. Ten. — Juniperus *nepalensis*. Loud.)

Var. : majestica.

(C. *majestica* et C. *flagelliformis*. Knight.)**C. Corneyana.** Knight. — China.(C. *gracilis*. Gord. — C. *torulosa*, var. *Corneyana*. Carr.)

C. glauca. Lamk. — Ind. or.

(*C. Lusitanica*. Mill. — *C. pendula*. L'Herit.)

JUNIPERUS. TOURN. EX LIN. (1753)

1. *Sabina*. Spach.

J. recurva. Buch.-Hamilt. — Reg. Himal.

Var. : *squamata* (Parl.)

(*J. squamata*. Buch-Ham. — *J. dumosa* et *J. Lambertiana*. Wall.
— *Sabina squamata*. Ant. Cupr.)

J. sabina. Lin. — Eur. mont.; As. minor.; reg. Caucas; Sibir.

(*J. foetida Sabina*. Spach. — *J. lusitanica*. Mill. — *Sabina officinalis*. Garcke.)

Var. : *Tamariscifolia* (Ait.)

" *humilis* (Endl.)

J. phœnicea. Lin. — Reg. mediter.; Ins. Canar.

(*J. Lycia*. Lin. — *J. tetragona*. Mönch. — *Sabina phœnicea*.
Ant. Cupr.)

J. thurifera. Lin. — Penins. Hispan.; Alger.

(*J. hispanica*. Lamk. — *J. foetida thurifera*. Spach. — *J. sabinoides*. Endl. — *J. cinærea*. Carr.)

J. sinensis. L. Mant. — China et Japonia.

(*J. barbadensis* et *J. virginiana*. Thunb. — *J. dimorpha*. Roxb.
— *J. Thunbergi*. Hook. et Arn. — *Sabina chinensis*.
Ant. Cupr.)

Var. : *mascula*.

" *aurea*.

" *Jacobiana*.

" *procumbens* (Endl.)

(*J. procumbens*. Sieb. — *J. japonica*. Carr.)

Var. : *procumbens albo-variegata*.

J. virginiana. Lin. — Amer. bor. orient.

(*J. foetida var. virginiana*. Spach. — *J. arborescens*. Mönch. —
J. caroliniana. Du Roy.)

Var. : *Schotti*.

" *glauca*.

" *albo-spica*.

2. *Oxycedrus*. Spach.

J. rigida. Sieb. et Zucc. — Japon.

(*J. communis*. Thunb.)

J. communis. Lin. — Eur.; Asia; Afr. et Americ. bor.

Var. : *hibernica* (Gord.)

(*J. communis stricta*. Carr. — *J. hibernica*. Lodd.)

3. *Caryocedrus*. Endl.

J. drupacea. Labill. — Asia minor et Syria.

(*J. oxycedrus*, var. γ). Lamk. — *Arceuthos drupacea* Ant. et
Kotsch.)

Trib. 2. — TAXODIÆ.

CRYPTOMERIA. D. DON. (1841)

C. japonica. D. Don. — Japon merid.

(*C. Fortunei*. Hooibrenk. — *Cupressus japonica*. Lin. fl. — *Taxodium japonicum*. Brong.)

Var. : *elegans*.

" *Lobbi*.

TAXODIUM. RICH. (1826)

T. distichum. Rich. — Amer. bor. (pars merid.).

(*Schubertia disticha*. Mirb. — *Cupressus virginiana*. Pluk. — *Cupressus americana*. Catesb. — *Cupressus disticha*. Lin.)

Var. : *pendulum novum*.

T. heterophyllum. Brongn. — China merid.

(*Thuya lineata*. Poir. — *Thuya pensilis*. Staunt. — *T. japonicum*, var. *heterophyllum*. Brongn. — *T. sinense*. Forb. — *Schubertia japonica*. Spach. — *Schubertia nucifera*. Denh. — *Glyptostrobus heterophyllus*. Endl.)

SEQUOIA. ENDL. (1847)

S. sempervirens. Endl. — California.

(*Schubertia sempervirens*, Spach. — *Taxodium sempervirens*. Lamk.)

S. gigantea. Torr. — California (Sierra-Nevada).

(*S. Wellingtonia*. Seem. — *Wellingtonia gigantea*. Lindl. — *Washingtonia californica* et *Taxodium Washingtonianum* Winsl.)

ATHROTAXIS. D. DON. (1839)

A. selaginoides. D. Don. — Tasmania.

(*A. alpina*. Van Houth.)

A. cupressoides. D. Don. — Tasmania.

(*A. imbricata*. Maule.)

Trib. 3. — TAXÆ.

TAXUS. (TOURN.) LIN. (1753)

T. baccata. Lin. — Eur. oriens.; reg. Himal; China; Japon; Afr. bor.; Amer. bor.-occid.

(*T. nucifera* et *T. virgata*. Wall. — *T. nepalensis*. Jacqem. — *T. Wallichiana*. Zucc.)

- Var. : *fastigiata* (Loud.)
 (*T. fastigiata*. Lindl. et Gord. — *T. hibernica*. Hook.)
 Var. : *Dovastoni* (Carr.)
 (*Cephalotaxus umbraculifera*. Sieb.)
 Var. : *Cuspidata* (Carr.)
 (*T. cuspidata*. Sieb. et Zucc.)
 Var. : *adpressa* (Carr.)
 (*T. adpressa* (Gord. — *T. sinensis tardiva*. Knight.)
 Var. : *elegantissima*.

CEPHALOTAXUS. SIEB. ET ZUCC. (1842)

- C. pedunculata**. Sieb. et Zucc. — Japon; China.
 (*Taxus Harringtonia* Forb. — *Taxus Inukaja*. Knight.)
 Var. : *fastigiata* (Carr.)
 (*Podocarpus Koraiana*. Sieb. — *C. Bürgeri*. Miq. — *Taxus japonica*. Lodd.)
C. Fortunei. Hook. — China bor.
C. drupacea. Sieb. et Zucc. — Japon.
 (*Taxus baccata*. Thunb. — *Taxus corriacea* et *Cephalotaxus corriacea*. Knight. — *Taxus japonica*. Hook.)

TORREYA. ARN. ()

- T. grandis**. Fort. — China bor.
 (*Caryotaxus*. Henk. et Höchst.)
T. nucifera. Sieb. et Zucc. — Japon.
 (*Taxus*. Kämpf. — *Caryotaxus*. Zucc.)
T. californica. Torr. — California (Sierra-Nevada).
 (*T. Myristica*. Hook. fl. — *Caryotaxus Myristica*. Henk. et Höchst.)

GINGKO. KÆMPF. (17)

L. MANT. (1771)

- G. biloba**. L. Mant. — China; Japon.
 (*Salisburia adiantifolia*. Salisb.)

PHYLLOCLADUS. RICH. (1826)

- P. rhomboidalis**. Rich. — Tasmania.
 (*P. asplenifolia*. Hook. fl. — *P. Billardieri*. Mirb. — *P. ceratifolia*. Nois. — *Podocarpus asplenifolia*. Labill.)
P. trichomanoides. D. Don. — Nova Zeland.
 (*P. alpinus*. Hook. fl. — *P. rhomboidalis*. A. Rich.)

Trib. 4. — **PODOCARPEÆ.**

DACRYDIUM. SOLAND. (1786)

- D. cupressinum**. Soland. — Nova Zeland.

- D. elatum.** Wall. — Malaya.
D. Franklinii. Hook. fl. — Tasmania.

SAXE GOTHÆA. LINDL. (1851)

- S. G. conspicua.** Lindl. — Chili austral.; Patagon. Andin;
 Ins. Chiloë.

PODOCARPUS. (L'HERIT.) PERS. (1807)

2. *Eupodocarpus.* Endl.

- P. corriacea.** Rich. — Nova Granat.; Ind. occid.
 (*P. Antillarum.* R. Br. — *P. Yucca.* G. Don. — *Nageia corriacea.* F. Muell.)
P. nubigena. Lindl. — Chili andina.
 (*Nageia.* F. Muell.)
P. Totara. D. Don. — Nova Zeland. sept.
 (*P. Biduilli.* Hooibrenk. — *Nageia Totara.* F. Muell.)
P. elata. R. Br. — Austr. orient.
 (*P. ensifolia.* R. Br. — *P. falcata.* A. Cunn. — *Nageia elata.* F. Muell.)
P. alpina. R. Br. — Austr. merid.; Tasmania.
 (*P. cæspitosa.* Panch. — *P. Laurencii.* Hook. — *Nageia alpina.* F. Muell.)
P. sinensis. Wall. — China.
 (*P. Maki.* Sieb. et Zucc. — *Taxus sinensis* et *Juniperus sinensis.* Roxb.)
P. neriifolia. D. Don. — Regio Himal.
 (*P. Endlicheriana.* Carr. — *P. macrophylla.* Wall. — *Nageia macrophylla.* F. Muell.)
P. elongata. L'Herit. — Afr. austr.
 (*Taxus capensis.* Lamk.)
 3. *Stachycarpus.* Endl.
P. andina. Pœp. — Chili austr.
 (*P. spicata.* Pœp. — *Prumnopitis elegans.* Philippi. — *Taxus spicata.* Domb.)

Trib. 5. — ARAUCARIEÆ.

CUNNINGHAMIA. R. BR. (1826)

- C. sinensis.** R. Br. — China merid.
 (*Abies major sinensis.* Pluk. — *Pinus Abies.* Lour. — *Pinus lanceolata.* Lamk. — *Abies lanceolata.* Desf. — *Cunninghamia lanceolata.* Lamk. — *Belis jaculifolia.* Salisb. — *Belis lanceolata.* Sweet.)

AGATHIS. SALISB. (1807)

PRIOR : DAMMARA. RUMPH. (1786)

A. australis. Steud. — Nova Zeland.(Dammara. Lamb. — *Podocarpus samiaefolia*. A. Rich.)**A. loranthifolia.** Salisb. — Archip. Malay.(A. Dammara. Rich. — *Dammara alba*. Lamk. — *Dammara crassifolia*. Knight. — *Dammara loranthifolia*. Link. — *Dammara orientalis*. Lamb. — *Dammara rubricaulis*. Carr. — *Dammara Rumphii*. Presl. — *Podocarpus Philippineana*. Benth.)

ARAUCARIA. JUSS. (1789)

1. *Columbea*. Endl.**A. imbricata.** Pav. — Chili.(Pinus Araucana. Molin. — *Dombeya chilensis*. Lamk. — *Dombeya Araucana*. Rausch. — *Abies Araucana*. Poir. — *Abies Columbaria*. Desf. — *Columbea quadrifaria*. Salisb. — *Araucaria chilensis*. Mirb. — *Araucaria Dombeyi*. Rich. — *Quadrifaria imbricata*. Manett. — *Columbea imbricata*. Carr.)2. *Eutacta*. Eichl.**A. Bidwillii.** Hook. — Austr. orient.

(Columbea. Carr.)

A. Cunninghamii. Sweet. — Australia.(A. glauca. Antoine. — *Altingia Cunninghamii*. G. Don. — *Eutacta Cunninghamii*. Link.)**A. excelsa.** R. Br. — Austral. orient.; Ins. Norfolk.(Altingia. G. Don. — *Columbea*. Spreng. — *Columbea angustifolia*. Berthol. — *Eutacta excelsa*. Link. — *Eutassa heterophylla*. Salisb.)**A. Cookii.** R. Br. — Nova Caledon.(A. columnaris. Hook. — *Eutacta Cookii*, *Eutacta humilis*, *Eutacta subulata* et *Eutacta Paucherii*. Carr.)

SCIADOPITYS. SIEB. ET ZUCC. (183)

S. verticillata. Sieb. et Zucc. — Japon merid.(Taxus. Thunb. — Pinus. Sieb. — *Podocarpus*. Wall.)

Trib. 6. — ABIETINEÆ.

PINUS. (TOURN.) LIN. (1753)

1. *Pinaster*. Endl.**P. Pinea.** Lin. — Reg. medit.; Afr. bor.; Penins. Hispan.; Ins. Canar.

(P. maderensis. Ten.)

- P. Pinaster.** Soland. — Reg. medit.; Eur. austr.
 (*P. maritima altera*. C. Bauh. — *P. sylvestris*, var. *B.* Lin. —
P. sylvestris. Mill. — *P. maritima*. Poir. — *P. Laricio*. Savi.)
- P. sylvestris.** Lin. — Eur.; Asia minor.; Sibiria.
 (*P. rubra*. Mill. — *P. rigensis*. Desf.)
- P. montana.** Mill. — Europ. centr.
 Subgen. *C.* : *Mughus*. Scop.
- P. Laricio.** Poir. — Europ. austr. et orient.; Asia occid.
 (*P. sylvestris maritima* et *P. maritima*. Ait. — *P. Pinaster*.
 Mor. — *P. Laricio Poiretiana*. Antoine.)
 Var. : *Austriaca*. Endl.
 (*P. Laricio*, var. *nigricans*. Parl. — *P. nigricans*. Host. —
P. nigra. Arn. et Link. — *P. Pinaster*. Bess. — *P. maritima*. Koch. — *P. dalmatica*. Vis.)
- P. Massoniana.** Lamb. — China merid.
 (*P. sinensis*. Lamb.)
 2. *Tæda*. Endl.
- P. monophylla.** Torr. et Frémont. — Amer. bor. occid.
 (*P. Fremontiana*. Endl.)
- P. Sabiniana.** Dougl. — Amer. bor. occid. (pars merid.).
- P. Coulteri.** D. Don. — California.
 (*P. macrocarpa*. Lindl.)
- P. ponderosa.** Dougl. — Amer. bor. occid.
 (*P. Benthamiana*. Hartw. — *P. Beardleyi*. Murr.)
- P. Jeffreyi.** Murr. — California et Oregon.
- P. rigida.** Mill. — Amer. bor. orient. (pars cent.).
 (*P. Tæda rigida*. Ait. — *P. Fraseri*. Lodd. — *P. Loddigesi*.
 Loud.)
- P. insignis.** Dougl. — California merid.
 (*P. californica*. Loisll. — *P. adunca*. Bosc.)
 3. *Cembra*. Spach.
- P. Cembra.** Lin. — Eur. cent. mont.; Russia sept.; Sibir.
 (*P. montana*. Lamk.)
- P. parviflora.** Sieb. et Zucc. — Japon sept.
 (*P. Cembra*. Thunb.)
 4. *Strobus*. Spach.
- P. excelsa.** Wall. — Reg. Himal.
P. strobus. Buch.-Ham. — *P. pendula*. Griff. — *P. Chylla*.
 Lodd. — *P. nepalensis*. De Chambr.)
 Var. : *Peuce* Griseb. — Eur. austro-or. (Penins. Balkan.)
 (*P. Peuce* et *P. Cembra*. var. *fruticosa*. Griseb.)
- P. Strobus.** Lin. — Amer. bor.-orient. (pars sept. et cent.).
- P. Lambertiana.** Dougl. — Amer. bor. occid.

CEDRUS. (TOURN.) MILL. (1757)

C. Libani. Barr. — Anatolia; Syria.

(*Pinus Cedrus*. Lin. — *Larix Cedrus*. Mill. — *Larix patula*.
Salisb. — *Abies Cedrus*. Poir.)

C. Deodara. Loud. — Reg. Himal.

(*Pinus*. Roxb. — *Abies*. Lindl. — *Cedrus indica*. De Chambr.
— *Cedrus Libani*, var. *Deodara*. Hook. fl.)

PSEUDOLARIX. GORD. (1858)

P. Kämpferi. Gord. — China bor. orient.

(*Larix*. Fortune. — *Pinus*. Lamb. — *Abies*. Lindl.)

LARIX. { TOURN. EX ADANS. (1763)
 { LINK. ()

L. leptolepis. Murr. — Japonica.

(*L. japonica*. Carr. — *L. Sieboldi*. Zucc. — *Abies leptolepis*. Sieb.
et Zucc. — *Pinus leptolepis*. Endl. — *Pinus larix*. Thunb.)

L. europea. D.C. — Eur. bor. et centr. mont.

(*Pinus larix*. Lin. — *Pinus larix*, var. *communis*. Endl. —
Larix decidua. Mill. — *Larix vulgaris*. Fisch. — *Larix*
excelsa. Link. — *Larix pyramidalis*. Salisb. — *Larix europea*
communis. Laws.)

PICEA. LINK. (1827)

1. *Eupicea*. Willk.**P. nigra.** Link. — Amer. bor.-orient. (pars. sept. et centr.).

(*Abies Mariana*. Mill. — *Abies nigra*. Mchx. fl. — *Abies denti-*
culata. Poir. — *Pinus nigra*. Ait. — *Pinus Mariana*. Du Roi.)
Var. : Doumetti. Carr.

P. alba. Link. — Amer. bor.-orient. (pars sept. et centr.).

(*Abies canadensis*. Mill. — *Pinus canadensis*. Du Roi. — *Pinus*
laxa. Ehrh. — *Pinus glauca* et *Pinus tetragona*. Mönch. —
Abies alba. Mchx. — *Pinus alba*. Ait.)
Var. : cærulea.

(*P. cærulea*. Link.)

P. Engelmanni. Engelm. — Amer. bor. occid.

(*Abies nigra*. Engelm. — *Abies Engelmanni*. Parry. — *Pinus*
commutata. Parl.)

Var. : Glauca.

P. pungens. Engelm. — Amer. bor. occid.

(*P. Parryana*. Barr.)

P. excelsa. Link. — Eur. borealis et sept. mont.

(*Abies rubra*. C. Bauh. — *Pinus abies*. Lin. — *Pinus Picea*.
Du Roi. — *Pinus excelsa*. Lamk. — *Abies Picea*. Mill. —
Pinus cinerea. Röhl. — *Abies excelsa*. D.C. — *Picea vul-*
garis. Link.)

Var. : inversa.

- " Clanbrasiliانا. Carr.
- " Remonti.
- " echinæformis.
- " pumila.
- " Nana.

P. Morinda. Link. — Reg. Himal.

(*Pinus Smithiana*. Lamk. — *Pinus Khutrow*. Loud. — *Abies Smithiana*. Forb. — *Abies Khutrow*. Loud. — *Abies spinulosa* et *Abies pendula*. Griff.)

P. orientalis. Link. et Carr. — Asia minor. et Reg. Caucas.

(*Pinus*. Lin. — *Abies*. Poir. — *P. Wittmanniana*. Carr.)

P. Alcockiana. Carr. — Japon.

(*Abies*. Veitch. — *Abies bicolor*. Maxim.)

P. polita. Carr. — Japon sept. et centr.

(*Pinus abies*. Thunb. — *Pinus polita*. Antoine. — *Abies Torano*. Sieb.)

2. *Omorica*. Willk.

P. ajanensis. Fisch. — Sibiria orient.; Japon.

(*Abies*. Lindl. et Gord. — *Tsuga*. Regl. — *Pinus Menziesi*. Parl.)

TSUGA. CARR. (1864)

1. *Eutsuga*. Engelm.

T. canadensis. Carr. — Amer. bor. (pars sept.)

(*Pinus*. Lin. — *Abies*. Mchx. — *Picea*. Link. — *Pinus americana*. Du Roi. — *Pinus abies americana*. Marsh.)

Var. : pendula.

2. *Hesperopeuce*. Engelm.

T. Pattoniana. Engelm. — Amer. bor. occ. (Sierra Nevada.)

(*Abies*. Jeffer. — *Abies Hookeriana*. Murr. — *Abies Williamsoni*. Newb. — *Tsuga Hookeriana*. Carr.)

PSEUDOTSUGA. CARR. (1864)

P. Douglassi. Carr. — Amer. bor. occid. (pars sept.)

(*Abies*. Lindl. — *Picea*. Link. — *Tsuga*. Carr. — *Pinus*. Sab. *Pinus taxifolia*. Lamb.)

Var. : Pallida.

KETELEERIA. CARR. (1864)

K. Fortunei. Carr. — China austro-orient.

Abies. Murr. — *Picea*. Murr. — *Pinus*. Parl. — *Abies Jezoënsis*. Lindl. — *Picea Jezoënsis*. Carr.)

ABIES. LINK. (1827)

- A. pectinata.** D.C. — Europ. montana.
Pinus Picea. Lin. — *Pinus Abies.* Du Roi. — *Pinus pectinata.* Lamk. — *Abies alba.* Mill. — *Abies vulgaris.* Poir. — *Abies taxifolia.* Desf. — *Abies Picea.* Lindl. — *Abies excelsa* Link. — *Picea pectinata.* Loud.)
- A. Nordmanniana.** Link. — Reg. Caucas.
 (*Pinus.* Stev. — *Picea.* Loud.)
- A. Pinsapo.** Boiss. — Hispania merid.
 (*Pinus.* Boiss. — *Picea.* Loud. — *Abies hispanica.* De Chambr.)
- A. firma.** Sieb. et Zucc. — Japon.
 (*Abies Momi.* Sieb. — *Abies bifida* et *Abies homolepis* Sieb. et Zucc. — *Picea firma.* Gord. — *Pinus bifida* et *P. homilepis.* Antoine. — *Abies Eschonoshiana.* Hort. Petropol.)
- A. brachyphylla.** Maxim. — Japon.
 (*Pinus.* Parl. — *Picea.* Gord.)
- A. Veitchii.** Carr. — Japonia.
 (*Picea.* Lindl. — *Pinus.* Mac-Nab. — *Pinus solenolepis.* Parl. — *Abies Eichleri.* Lauche.)
- A. amabilis.** Forb. — Amer. bor. occid. (pars sept.).
Pinus. Dougl. — *Picea.* Loud. — *Pinus grandis.* Lamb.)
- A. subalpina.** Engelm. — Amer. bor. occid. (pars sept.).
 (*A. lasiocarpa.* Nutt. — *A. bifolia.* Murr. — *Pinus amabilis.* Parl. — *Picea bifolia.* Murr.)
- A. concolor.** Lindl. et Gord. — Amer. bor. occ. (p. cent.).
 (*Pinus.* Engelm. — *Picea.* Gord. — *Abies Lowiana.* Murr.)
 Var. : violacea.
- A. grandis.** Lindl. — Amer. bor. occid. (pars sept.).
 (*Pinus.* Dougl. — *Picea.* Loud. — *Abies gordoniana.* Carr. — *Abies grandis de Vancouver.* Bridg. — *Abies amabilis.* Murr.)
- A. Webbiana.** Lindl. — Reg. Himal; Afghanist. septent.; Karifistan.
 (*Pinus.* Wall. — *Pinus spectabilis.* Lamb. — *Pinus tinctoria.* Webb. — *Picea Webbiana.* Loud. — *Abies spectabilis.* Spach. — *Abies densa.* Griff. — *Pinus striata.* Buch-Ham.)
- A. magnifica.** Murr. — California; Oregon.
 (*A. campylocarpa.* Murr. — *A. nobilis robusta.* Carr. — *Picea amabilis.* Lodd. — *Pinus amabilis.* Parl. — *Abies nobilis* var. *magnifica.* Mast. — *Pseudotsuga magnifica.* Mac. Nab.)
- A. nobilis.** Lindl. — Oregon.
Pinus. Dougl. — *Picea.* Loud. — *Pseudotsuga.* Bertrand.)
- A. bracteata.** Hook. et Arn. — California aust. (Mont. Santa Lucia.)
 (*Pinus venusta.* Dougl. — *Pinus bracteata.* Don. — *Picea bracteata.* Loud. — *Abies venusta.* C. Koch.)

CXLIX. — CYCADACEÆ

Trib. 1. — CYCADEÆ.

CYCAS. LIN. (1753)

C. revoluta. Thunb. — Japon.

(*C. inermis*. Oudem.)

C. circinnalis. Lin. — Ins. Molucc.

(*C. Madagascariensis*. Miq. — *C. spherica*. Roxb. — *C. squamosa*. Lodd. — *C. Thouarsii*. R. Br. — *Toda-Panna*. Adans.)

Trib. 2. — ZAMIEÆ.

DIOON. LINDL. (1843)

D. edule. Lindl. — Mexico.

(*D. aculeatum*. Lem. — *D. angustifolium* et *D. imbricatum*. Miq. — *Macrozamia littoralis* et *M. pectinata*. Sieb. — *Platyzamia rigida*. Zucc.)

ENCEPHALARTOS. LEHM. (1834)

E. villosus. Lehm. — Afric. austr.

E. Lehmani. Lehm. — Afric. austr.

(*E. spinulosus* Lehm. — *E. mauritanus*. Miq. — *Zamia Lehmani*. Eckl. et Zey.)

E. horridus. Lehm. — Afric. trop.

(*E. nanus*. Liebm. — *E. Vanhallii*. de Vrieze. — *Zamia horrida*. Jacq.)

MACROZAMIA. MIQ. (1841)

M. neo-Caledonensis?

CERATOZAMIA. BRONG. (1846)

C. mexicana. Brogn. — Mexico.

(*C. brevifrons*, *C. intermedia*, *C. longifolia* et *C. robusta*. Miq. — *C. fusco-veridis*. D. Moore. — *Dipsacozamia mexicana*. Liebm.)

ZAMIA. LIN. (1753)

Z. integrifolia. Ait. — Ind. occid.

CRYPTOGAMÆ VASCULARES

CL. — SELAGINACEÆ

SELAGINELLA. SPRENG. (1838)

2. *Stachygynandrum*. Beauv.

S. Kraussiana. Kunze. — Afric. trop. et austr.

(*S. hortensis*. Mett. — *Lycopodium Kraussianum*. Kunze.)

S. Willdenowii. Bak. — Asia trop.; Malaya; Reg. Himal.

(*Lycopodium plumosum*. Lin. — *Lycopodium Willdenowii*. Desv.)

CLI. — FILICES

Subord. 2. — POLYPODIACEÆ.

Trib. 1. — CYATHEÆ.

CYATHEA. SM. (1791)

C. dealbata. Swartz. — Nov. Zeland.

(*Polypodium dealbatum*. Forst.)

C. Dregei. Kze. — Afric. orient. subtrop.

(*C. Burkei*. Hook.)

ALSOPHILA. R. BR. (1810)

A. australis. R. Br. — Austral. merid.; Tasmania.

Trib. 2. — DICKSONIÆ.

ONOCLEA. LIN. (1751)

2. *Struthiopteris*. Willd.

O. germanica. Hoff. — Europa; Sibiria; Amer. bor.

(*Onoclea Struthiopteris*. Swartz. — *Osmunda Struthiopteris*.

Lin. — *Struthiopteris germanica*. Willd.)

DICKSONIA. L'HERIT. (1788)

1. *Cibotium*. Kaulf.
- D. regale**. Bak. — Mexico.
(*Cibotium*. Lind.)
2. *Eudicksonia*. Bak.
- D. antartica**. Labill. — Austral. orient.; Tasmania.
(*D. Billardieri*. F. Muell. — *Balantium antarticum*. Presl. —
Cibotium Billardieri. Kaulf.)

Trib. 4. — DAVALLIEÆ.

DAVALLIA. SM. (1791)

4. *Eudavallia*. Bak.
- D. canariensis**. Sm. — Penins. Hisp.; Afric. bor.; Ins.
Canar. et Madeir.
(*Trichomanes*. Lin. — *Hymenophyllum*. Poir. — *Cænopteris*.
Willd.)

Trib. 6. — PTERIDEÆ.

ADIANTUM. LIN. (1737)

1. *Euadiantum*. Bak.
- A. pedatum**. Lin. — Amer. bor. (pars. centr.); Reg. Himal;
Japon.
(*A. boreale*. Presl. — *A. aleuticum*. Rupr.)
- A. Capillus Veneris**. Lin. — Eur.; Asia; Afric.; Amer. bor.;
Polynes.
(*A. fontanum*. Salisb. — *A. repandum*. Tausch. — *A. tenerum*.
Roxb.)
- A. glaucophyllum**. Hook. et Bak. — Mexico; Guatemala.
(*A. mexicanum*. Presl. — *A. amabile* et *A. andicolum*. Liebm.)

ONYCHIUM. KAULF. (1820)

- O. japonicum**. Kuntze. — China; Japon; India.
(*O. lucidum*. Spreng. — *Pteris japonica*. Mett. — *Trichomanes japonicum*. Rhbg. — *Cryptogramme japonica*. Prantl.)

PTERIS. LIN. (1737)

2. *Paësia*. St-Hill.
- P. Aquilina**. Lin. — Eur.; Asia; Afr. bor. et aust.; Am. bor.
(*P. arachnoidea*. Kaulf. — *Pteridium*. Kuhm. — *Allosorus aquilinus*. Presl.)

LOMARIA. WILLD. (1809)

1. *Eulomaria*. Bak.**L. dura**. Moore. — Ins. Chatam.(*Lomaria rigida*. J. Sm. — *Blechnum durum*. Moore.)**L. Gibba**. Labill. — Ins. Pacif.(*Blechnum Gibbum*. R. Br.)**L. Spicant**. Desv. — Eur. ; Reg. Caucas. ; Japon ; Am. bor.(*Osmunda*. Lin. — *Blechnum*. Roth. — *Blechnum boreale*. Sw.)

Trib. 8. — ASPLENIEÆ.

ASPLENIUM. LIN. (1739)

2. *Euasplenium*. Bak.**A. Ruta muraria**. Lin. — Europ. ; Sibir. ; Amer. bor.(*Acrostichum*. Lin. — *Scolopendrium*. Roth.)4. *Athyrium*. Roth.**A. Filix-Fœmina**. Bernh. — Eur. ; Asia ; Afr. ; Am. b. ; Aust.(*Athyrium* Roth. — *Polypodium*. Lin. — *Aspidium*. Sw.)

Var. : Craigii.

" gracile. (Moore.)

" Longridgense.

" Thyssanotum nanum.

5. *Diplazium*. Presl.**A. japonicum**. Thunb. — Japon ; China ; Reg. Himal.(*A. Schkurii*. Hook. — *Diplazium Schkurii*. J. Sm.)

Trib. 9. — SCOLOPENDRIEÆ.

SCOLOPENDRIUM. SWARTZ. (1793)

1. *Euscolopendrium*. Bak.**S. vulgare**. Sm. — Europa ; Asia ; Afric. ; Amer. bor.(*S. officinale*. Smith. — *S. officinarum*. Sw. — *Asplenium Scolopendrium*. Lin)

Trib. 10. — ASPIDIEÆ.

ASPIDIUM. SWARTZ. (1800)

1. *Polystichum*. Roth.**A. aculeatum**. Sw. — Europ. ; Oriens ; Africa.(*Polypodium*. Sw. — *Polystichum*. Roth.)

2. *Cyrtomium*. Presl.**A. falcatum**. Sw. — China; Reg. Himal; Afric. merid.

(Cyrtomium. Presl. — Polypodium. Thbg.)

Var. : Fortunei (J. Smith.)

NEPHRODIUM. RICH. (1803)

1. *Lastræa*. Presl.**N. Filix. Mas.** Rich. — Europ.; Asia; Afric. austr.(Aspidium. Sw. — Polypodium. Lin. — Lastræa. Presl. —
Arthrobotrys. Wall. — Dryopteris. Scott.)

Var. : furcans.

N. dilatatum. Desv. — Eur.; Asia; Ins. Canar.; Amer. bor.

(N. spinulosum. var. B. Desv. — Aspidium. Sw. — Polypodium. Hoff. — Lastræa. Presl. — Dryopteris. A. Gray.)

Trib. 11. — POLYPODIEÆ.

POLYPODIUM. LIN. (1737)

5. *Eupolypodium*. Bak.**P. vulgare**. Lin. — Europ.; Asia; Amer. bor.; Afr. austr.9. *Phymatodes*. Presl.**P. crassifolium**. Lin. — Amer. austr.; Ind. occid.; Mexico

(Phymatodes. Presl. — Anaxetum. Scott. — Drynaria. Sm.)

Subord. 3. — OSMUNDACEÆ.

OSMUNDA. LIN. (1737)

O. regalis. Lin. — Europ.; Asia; Afric.; Amer.

(O. palustris. Sturn. — Struthiopteris regalis. Bhd.)

TODÆA. WILLD. (1802)

2. *Leptopteris*. Presl.**T. superba**. Col. — Nov. Zeland.

(Leptopteris. Hook.)

~~~~~

CONSPECTUS SYNOPTICUS

NUMERI SUNT, SECUNDUM DIVISIONES :

A. *Phanerogamarum*,

|                                 | ORDINES. | GENERA. | SPECIES. |
|---------------------------------|----------|---------|----------|
| Dicotyledon. Polypetal. . . . . | 69       | 432     | 1263     |
| "      Gamopetal. . . . .       | 38       | 320     | 730      |
| "      Monochlamyd. . . . .     | 23       | 102     | 300      |
| Monocotyledon. . . . .          | 16       | 153     | 300      |
| Gymnosperm. . . . .             | 3        | 41      | 131      |

B. *Cryptogamarum*,

|                   |     |      |      |
|-------------------|-----|------|------|
| Vascular. . . . . | 2   | 17   | 29   |
| SUMMA. . . . .    | 151 | 1055 | 2753 |

~~~~~  
Bruxelles. — Imprimerie typographique et lithographique V. Monnom, 32, rue de l'Industrie
~~~~~













